



# Notice

Buch.. Antoine  
Anatomiste Allemand  
né vers 1669 mourut en  
1740. Il vint à La Haye &  
obtint la Chaire d'Anatomie  
et de Chirurgie à Leyde.  
Il est le premier qui ait aper-  
çu la manière dont on  
répare la perte de l'humeur  
aqueuse de l'oeil. Dissecteur  
infatigable il a encore décou-  
vert quelques glandes sali-  
vaires inconnues jusqu'alors.  
On lui doit aussi l'invention  
d'une machine pour redres-  
ser le cou, placé de travers  
par la rétraction des  
muscles.

38948/A

S  
20/6/06  
767



37.C. 15668

NUCK



ANTONII NUCK  
OPERA OMNIA  
ANATOMICA.  
ET  
CHIRURGICA.

3. voll.

ANTONII NUCK

OPERA OMNIA

ANATOMICA

ET

CHIRURGICA



A. NUCK  
OPERATIONES  
&  
EXPERIMENTA  
CHIRURGICA



LUGDUNI BATAVORUM  
Apud SAMUELEM LUCHTMANS 1733



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



OPERATIONES  
ET  
EXPERIMENTA  
CHIRURGICA  
ANTONII NUCK,

Med. Doct.

*In Academia Lugduno Batava, Medicinæ  
Anatomicæ Professoris, nec non  
Collegii Chirurgici Præsidis.*

Editio Novissima.



LUGDUNI BATAVORUM,  
Apud **SAMUELEM LUCHTMANS,**  
Academiæ Typographum. 1733.



OPERATIONS

ET

EXPERIMENTA

CHIRURGICA

ANTONII NUCK

15668



LIBRARY OF THE

SAMUEL LUCHTMANS

Academy of Medicine



# OPERATIONUM & EXPERIMENTORUM CHIRURGICORUM

brevi & facili methodo propo-  
sitorum.

## PRIMUM.

### *De Fonticulo in Sutura Coronali.*



Arias pertractaturi Operationes Chirurgicas, à *Fonticulo in Sutura Coronali* excitando initium capere, animum induximus. Hæc Operatio Italis magis, quam Nostratibus familiaris est, eamque in Oculorum affectibus, Ophthalmia, Gutta Serena, Catharris, Asthmate, Insultibus Epilepticis, aliisque frequenter instituunt: certo sibi perluadentes, noxios humores in Capite collectos, ad inferiores corporis partes

## 2 EXPERIMENTA

descensum minitantes, hac via commodè expurgari posse.

Verum enim vero, pace illorum, statuimus humores noxios, Fonticuli beneficio è corpore eliminandos, non speciatim in Capite colligi, ibidemque solummodo hospitari, sed universæ sanguineæ massæ permixtos, ope circularis ejusdem motus per totum corpus oberrare, ac ubicumque obicem inveniunt pedem figere, variasque morborum species producere. Si itaque in itinere suo circulatorio ad Fonticulum appellant, ibidemque poros figuræ suæ proportionatos inveniunt, eos subingrediendo à reliqua sanguinis massa separantur. Quam separationem prolixius explicatam videre licet apud *J.*

*Vide*  
*Dec. I.*  
*Observ.*  
*2.*

*Muys in praxi Chirurg. Rat. De usu Fonticuli, ejusque operandi ratione.*

Sequenti autem modo locum Fonticulo huic convenientem certo inveniri posse Veteres contendunt : Abrasis nimirum verticis capil-

capillis filum ducunt à naribus ad verticem , deinde aliud à media aure ad mediam oppositi lateris aurem extendunt. Ubi vero hæc fila se mutuo interfecant , ibi foramen cuti inurendum volunt.

Ast per fila tali modo ducta verus sæpe locus non assignatur. Coronalis siquidem Sutura non in omnibus craniis in uno eodemque semper reperitur loco , sed in aliis versus verticem elatior , in aliis versus frontem declivior , non raro conspicitur , quemadmodum diverforum craniorum frequens inspectio ad oculum demonstrabit.

Verum locus iste digito melius , quam ullo instrumento explorari poterit : In quovis enim fere subjecto Coronalis Sutura inæqualitate quadam & protuberantia leviori se prodit ; In nonnullis vero depressa quodammodo persentitur. Unicum proinde filum à naso ad verticem ducendum , quod digito pressum Suturæ Coronalis oram , qua Sagittalem



# 4 EXPERIMENTA

tangit, manifestissime notabit.

Quoniam autem materia, quam Fonticulus hic plorat non ex cerebro, nostro quidem iudicio, sed ex partibus cranium ambientibus proficiscitur, uno eodemque recidet, siue supra, siue infra Suturam Coronalem, siue in eadem cauterium applicetur.

Facili itaque negotio Operatio hæc sequenti instituitur modo: Inuratur, loco modo notato, profundum satis foramen cauterio quodam actuali, ab *Aquapendente* invento, à *Sculteto*, aliisque, præprimis à *Jobo van Mekerem* in Observationibus Chirurgicis distincte admodum delineato. Postea escharæ separatio promoveatur *Ung. Basil. Butyr. recent. & similib. vel*

Vid.  
Schulter.  
append.  
Tab.

XVIII.

Vid. J.  
van Me-  
keren

cap. v.

℞. Unguent. Popul. ʒj.

Sapon. Nigr. ʒij.

M.

℞. Axung. Porc.

Butyr. Insuls.

Sapon. Nigr. aa ʒijss.

M.

Re-

## C H I R U R G I C A. 5

Remota tandem Unguenti beneficio eschara, quod ut plurimum tertio quartove die observari solet, pisum, globulusve ex *Hedera arbore-scenti*, *Corio bovino*, *Aristol. Gen-tian. Irid. Flor.* &c. confectus cavitati indatur, ut locus apertus fervetur, porique ulcusculi patentes maneant. Denique (superimposito jam Empla-stro) fascia quadam *Cancer* dicta, vel strophiole deligatio instituatur.

Si cui majori cum apparatu Ope-rationem hanc instituere volupe fue-rit, inspiciat *Cornelii Solingen. O-perat. Manual.* Vide Soling. cap. I. de Fonti-culo.

## E X P E R I M E N T. II.

### *De Setaceo.*

**P**ræter Fonticulum in Sutura Co-ronali excitatum, occurrit aliud Fonticuli genus, *Setaceum* dictum (quia per foramina nuchæ inflicta filum ex fetis contortis olim ducebatur) evacuationis gratia à Veteribus institutum. Hinc in non-

## 6. EXPERIMENTA

nullis Capitis morbis, quibusdam Oculorum affectibus, dolore Dentium, Obstructionibus, Asthmate &c. magnæ utilitatis fuit habitum.

Et licet inter Neotericos non deficiant, qui Fonticulum etiam hunc ut minoris momenti ex Medicina eliminandum volunt: multiplici tamen constat experientia magnum (præter expectationem post alia incassum tentata remedia) exinde ægros percepisse levamen.

Est autem *Setaceum* nihil aliud præter ulculculum, in nucha inter primam & secundam, secundam & tertiam, vel ut alii volunt inter tertiam & quartam vertebra[m] excitatum, ex quo indies materia quædam purulenta excernitur.

Vide

Schulzet.

Ann.

Tab VII.

& Tab.

XXXIV.

Hanc Operationem instituendi modus occurrit varius. Veteres magno cum apparatu stringebant cutim Forcipe alata, ab utraque parte foramen habente, per quod *acus*, interdum ignita, interdum non ignita, pro vario Medici scopo transmittetur,



tur, una cum funiculo è fetis equinis parato.

Nos vero simpliciori, commodiori, & patienti minus dolorifica methodo utentes, sequenti modo procedendum censemus. Capite dorsum versus paulisper reflexo, abradisque (si opus sit) capillis, locus postea pertundendus atramento tali modo notetur, ut puncta notata non ultra pollicis latitudinem à se invicem distent; mox cutis duplicata altera Ministri, altera Chirurghi, manu eleve-  
tur, & cuspide acûs ab anteriori parte parum incurvatæ, à posteriori rotundæ ligulaque, linea, vel serico non contorto (*Belgice Vlos syde*) instructæ perforetur, filumque ea parte, quæ sub cute latere debet, *Oleo Rosaceo, Ung. Basil.* aliove digestivo inungatur, ac sæpius horsum vorsum trahendo moveatur.

Alii *Lanceola* cuspide robustiori donata cutim elevatam pertundunt.

Hiscæ ita peractis plumaceolum planum utrique foramini applicetur:

## 8 EXPERIMENTA

dein *Emplastrum glutinosum*, duobus foraminibus pro fili extremitatibus transmittendis donatum, imponatur, filumque laxè ibidem constructum linguatur, vel circa collum ducatur, ne ulceris latera dilacerentur, quæ denique compressa impostæ fasciæ ope alligentur.

Vid.  
Schultet.  
Append.  
Tab. xv.  
& van  
Mekeren  
cap.  
xxviii.

Si vero, uti non raro contingit, hocce Fonticuli genus patienti nimis sit molestum, simplex tantum hac in parte excitetur Fonticulus, sola cutis incisione, globuli cerei aliorumque applicatione; quemadmodum Operatione sequenti sumus demonstraturi.

### EXPERIMENT. III.

*De Fonticulis in Artubus excitandis.*

**P**ropositis Suture Coronalis & Nuchæ Fonticulis, examinandi veniunt illi, qui in frequentiori usu sunt & in artubus excitantur, quique ad varios capitis morbos tam internos, quam externos, infantum & pue-

puerorum motus Convulsivos ,  
 Ophthalmiam, Tumores strumosos,  
 Cephalalgias , Affectus Soporoso-  
 sos , Vertiginosos & Spasmodicos  
 sæpius & cum successu in usum vo-  
 cantur.

Excitantur istiusmodi Fonticuli in  
*Brachio* inter musculum Deltoidem  
 & Bicipitem. In *Femore* interius su-  
 pra genu ad trium quatuorve circiter  
 digitorum transversorum distantiam  
 ( si à genu ipso mensurare incipias )  
 inter Vastum internum & Sartorium  
 musculum. In *Pedis parte superiori*  
 ad digitorum trium quatuorve latitu-  
 dinem infra genu circa marginem So-  
 lei, vel inter Soleum & Gastrocne-  
 mium.

Parantur autem vel *Cauterio po-  
 tentiali*, vel *Incisione*: Cauteriorum  
 potentialium descriptiones passim  
 extant apud Authores Chirurgos. Si  
 cui vero simplex aliquod arrideat,  
 quod tamen profundè satis & minori  
 quidem cum molestia, quam quæ  
 magno cum apparatu proponuntur,



## IO EXPERIMENTA

partes corrodit, utatur Cauterio ex  
*Calce viva & Smegmate Hollandico*  
parato..

*Vide Chirurg. Barbetti.* Admirandum etiam *Cauterium Barbettianum*, quod sequitur, præstat usum.

℞. *Sulph. crud.*

*Arsen. alb.*

*Antimon. crud. aa ʒij.*

Sulphuri lento igne separatim liquefacto, & spatula agitato, adde Arsenicum, & Antimonium pulverisatum, quæ tamdiu agitando misceantur, donec cum Sulphure uniantur & rubescant. Dein

℞. *Hujus Mixtur. ʒj.*

*Cap. mort. Vitriol. ʒss.*

M. *F. Pulv.* aliquoties Sp. Vin. lavandus & siccandus.

Hoc medicamentum non tantum ad Fonticulos excitandos, sed & in mali moris ulceribus, imo Cancrosis, carnisque excrescentiis singularem sæpius habet utilitatem.

Cui itaque *Cauterium potentiale* applicare placet, Emplastrum in medio

## CHIRURGICA. II

dio foramine donatum, parti apponatur, foramini dein partem caustici admoveat, eamque pulvillo, aliove Emplastro tegat, tum tribus, quatuor aut quinque horis effloxis emplastra removeat, & escharæ, *Emplastrum Diapalm.* singulis diebus bis, donec separatio peracta fuerit, applicet.

Nos vero incisionem, cutim videlicet manu elevando, & forcice vel phlebotomo diffecando præferimus.

Eschara interim separata, vel facta per incisionem Fonticulo, globuli ex plumaceolo formati, medicamentisque detergentibus inuncti, ulceri sunt apponendi, usque dum satis excavatum fuerit. Cavitate itaque satis magna existente, *Globulus cereus*, *ligneus* aut *argenteus*, vel *pisum* eidem imponendum, quod sæpius, novo substituto, auferendum: Hocque tamdiu continuandum, usque dum vel morbus curatus, vel virium debilitas ulterius pergere prohibuerint.

Notandum interim dari patientes,  
qui

## 12 EXPERIMENTA

qui à Fonticulis excusari possunt ac debent: Illi nimirum in quibus hi Fonticulorum rivuli aut nimis aut minus quam par est excludunt, & quibus intolerabiles dolores excitant.

Quomodo inflammationes, vicinarum partium exesiones, ulcuscula, excrescentiæ carnosæ, aliaque Fonticulis nonnunquam supervenientia mala, tractari debeant, de iis inter alios præprimis consule *Willisum*.

*Vid.*  
*Willis.*  
*Phar-*  
*mac Ra-*  
*tional.*  
*part. 2.*  
*cap. de*  
*Fonticu-*  
*lis.*

Quæritur denique *an Fonticuli ad sterilitatem disponant?* Resp. si gravidæ nihil à Fonticulis levaminis sentiunt atque emaciantur, omittendos eos censemus. Si vero materia vitiosa quotidie excernitur, concipere non possumus, cur Fontanellæ in his nocerent, quum tamen experientia nonnunquam contrarium monstraverit.



## EXPERIMENT. IV.

*De Vesicatoriis.*

**A**d Fonticulos commodè referuntur *Vesicatoria*, medicamenta seu Epithemata ex particulis acribus & volatilibus composita, quibus, necessitate ita suadente, in quadam corporis parte vasorum cutaneorum extremitates ita irritantur, ut variæ indolis humores serofos copiose evomant, & per aliquot temporis intervallum, in aliis tamen longius, in aliis vero brevius, eosdem evacuare continent.

Usitatiores æque ac commodiores eorum compositiones ut plurimum ingrediuntur *Cantharides*. En formulam.

℞. *Pulv. Canthar. cum alis*

*℥ pedibus ʒj.*

*Euphorb. ʒss.*

*Empl. de Melilot. q. s.*

Incorporentur hæc manu calida, sumendo tantum pulveris, quantum

Em.

# 14 E X P E R I M E N T A

Emplastri massa capere potest.

Hujus portio super alutam extensa (ita tamen ut margines ejus non attingantur, quo eo melius parti impositæ adhærere possit) applicetur per horas 7. 8. 9. 12. 15.

Si cui Hildani Vesicatorium magis arrideat.

*Vid. Opera Chirurg.  
Hildani.*

*Rx. Fermenti acris ʒß.*

*Canthar. pulv. N°.vj.*

*Aq. beton. q. s. F. Massa.*

*Vel Rx. Canthar. N°.ij.*

*Ung. Basil. q. s.*

*Incorporentur hæc manu & F. Massa.*

Vesiculis satis magnis excitatis massa illa est removenda, vesiculæque leviter saltem, vel forfice aperiendæ, vel acu hinc inde perforandæ, ut materia intus collecta exprimi possit: Cave autem cuticulam vesiculæ in modum elevatam nimis cito à cute divellas: Hæc enim epidermide sua destituta, aëris subjecta injuriis, intolerabiles patienti dolores excitare posset. Si igitur Emplastrum

solummodo aliquod huic parti superimponatur, cuticula successu temporis sua sponte decidet.

Horum Vesicatoriorum particulæ causticæ volatiles, cuticulam absque læsione penetrantes, vasculosam cutis & musculorum substantiam profunde satis subingrediuntur, ubi si particulas crassiores viscidioresque inveniunt, eas attenuant, falsas & acidas diffringunt atque involvunt, sicque multis morbis Catharticis & Diaphoreticis frustra impugnatis, imo exquisitissimis quibusvis elidentibus eludentibusque remediis, finem feliciter imponunt. Particulæ vero illorum crassiores, & acriores, circa cutim subsistentes, vasculorum quasdam fibrillas diffringendo, humores ibidem circulantes ex parte impediunt, qui in superficie cutis collecti, cuticulam in vesicæ formam attollunt. Quapropter in intemperie sanguinis acida & salina Vesicatoria hæc maximam asserunt utilitatem. Hinc in Scorbuto, Leucophlegmatia & qua-

vis



## 16 E X P E R I M E N T A

vis cacochoymia cum fructu applicantur. Præsertim vero in Doloribus capitis pertinacibus, Vertigine, Affectibus Soporosis, Catharris, Apoplexia, Epilepsia, imo doloribus quibuscunque magnæ sæpius sunt efficaciae.

Non tamen omnibus, prædictis morbis laborantibus, Vesicatoria conveniunt. Nephritici enim, Stranguria laborantes, gravidæ & puerperæ vix eadem ferunt.

*Vid.  
Willis.  
Pharm.  
Ration.  
part. 2.  
cap. de  
Vesicatoriis.*

Quibus denique summum pariunt dolorem, Inflammationem, Ulcuscula serpentina, Mictum cruentum, & præsertim ubi ex vasculis tanta humorum serolorum copia profluit, ut virium inde sequatur debilitas, Vesicatoria ut intermittant, Autor ero.

### EXPERIMENT. V.

#### *De Trepani applicatione*

Quamvis caput graviore vulnere læsum fuerit, non tamen semper Trepani applicationem requirit: Verum

rum ubi lapidibus, ligno, ferro, casu ab alto &c. cranium ita læditur, ut fracturam patiatur, & symptomata quædam urgentia superveniant, v. g. Subitaneus in terram prolapsus, oculorum tenebriosa Vertigo, vehemens Vomitus, Narium Auriumque Hæmorrhagia, Aphonia, uti & sæpius subsequentes Convulsiones, Delirium, Febris, Sopor, Paralysis: Illis in casibus festinandum, ut per foramen arte factum tum sanguis extravasatus, tum sanies aliique vitiosi humores intra Cranium & duram matrem, vel duram inter & piam matrem hærentes excerni, atque evacuari, possint.

Abraso itaque capillitio, Cranii *Novacula* integumenta *Novacula* sunt incidenda (ni forte à vulnere divisio jam facta fuerit) per lineam simplicem aut duplicem, in crucis aut trianguli figuram, cavendo, quantum fieri poterit, Temporalem musculum, & Suturas.

Quibus peractis vulneris labia di-

*Novacula delin. vid. apud Soling. Tab. 1. Fig 3.*

## 18 EXPERIMENTA

De Se-  
parator.  
vid. So-  
ling.  
Tab. I.  
Fig. 2.

ducenda, pericraniumque à subjecto Cranio instrumento *Separatorio* exacte abradendum. Ne vero labia quodammodo obsint, impositis plumaceolis diducta sunt servanda, illisque, si sanguinem fundant, stuppæ, styptico medicamento imbutæ, admovendæ: Si autem cruoris profusio modum excefferit, *Cauteriolo* (quod ad manus esse debet) sedanda erit.

Dein labiis plumaceolis ita diductis applicandum *Emplastrum de Betonita*, incisuris aliquot ita accommodatum, ut vulneri melius adaptari possit; Huic superimponendum *Emplastrum Defensivum* cum compressa ex linteo quadruplicato facta: Denique fascia, *Cancer* dicta, deligatio instituenda.

Omniis hisce absolutis quieti se componat æger: cui interim Spirituosum aliquod viresque instaurans medicamentum offerendum, ne durante operatione animi deliquium patiatur.

Sequenti die (nisi periculum sit



in mora) deligatione soluta, ægro-  
 que decenter situato, ministrorum  
 quidam caput firmiter teneat, pa-  
 tientisque aures bombace obturen-  
 tur, ne ingratus Trepani strepitus  
 ipsi sit molestus. Tum prudenter &  
 circumspēcte *Modiolus mas*, dein  
*fœmina* adhibenda, cavendumque  
 ne quid festinanter agatur. Quem in  
 finem modiolus sæpe ab osse auferen-  
 dus, & si ob continuatam circumdu-  
 ctionem nimium incalescat, lacti  
 vel aquæ subinde immittendus: Ubi  
 vero scobs modioli crenis adhæret,  
*scopula* auferenda erit.

*Trepani*  
*Formam*  
*vid. ap.*  
*Soling.*  
*Tab. II.*  
*Fig. 4.*

*Vid.*  
*Schult.*  
*Arma-*  
*ment.*  
*Tab. II.*  
*F. 3. 4.*  
*& 5.*

Signum autem ad diploën seu me-  
 ditullum nos pervenisse sanguis præ-  
 bet, ex ejusdem arteriolis læsis e-  
 rumpens; Hinc circumspēctius pro-  
 cedendum, brachiumque in altum  
 elevando suspenſa quasi manu perfo-  
 ratio est instituenda, ne modiolus ni-  
 mis pressus male afficiatur dura me-  
 ninx.

*Vid.*  
*Soling.*  
*Tab. II.*  
*F. 9.*

Notandum interim, non semper  
 dignosci posse utrum ad cranii medi-

## 20 EXPERIMENTA

tullium pervenerimus , quia subinde, ejus lamellis firmissime concretis unicumque os mentientibus, nihil plane sanguinis prorumpit. Præterea in infantibus & pueris illa diploë ut plurimum non observatur.

*Vestim  
monstrat*

*Schult.*

*Tab. II.*

*Fig. 7.*

*& Tab.*

Hinc summa in quavis ætate circa Trepani applicationem requiritur cautela.

*III. F. 2.*

*Vid.*

*Schult.*

*Arm.*

*Tab. IV.*

*Fig. I.*

*Soling.*

*Tab II.*

*Fig. 8.*

*V. Soling.*

*Tab.*

*Fig. 9.*

*Schult.*

*Arm*

*Tab. II.*

*F. 8.*

*Serrulam*

*vide apud*

*Soling.*

*Tab. II.*

*Fig. 9.*

Ubi vacillare incipit officulum, & undiquaque æqualiter modiolum penetrasse *specillo* lato cognovimus, tentandum an blanda vi illud *Vecti* aut *Volsella* auterre, vel *Elevatorio tripede* extrahere, possimus. Quo facto foraminis in ambitu asperitas læviganda est *Lenticulari* instrumento. Dum operatio peragitur, non inconvenienter *Sartago* ignita super patientis caput suspenditur, ad aeris injurias temperandas.

Si *isthmus* aliquis fracturam inter & partem perforatam observatur, *Serrulla* tollendus erit.

Partis denique cujusdam *depressio Elevatorio Biploide Solingii* aut *Triploi-*

*Soling.*

*Tab. I.*

*Fig. 8.*

ploide *Schulteti* elevatur.

*Schult.*

Sponte si non exeat sanguis fa-  
 nielve, *decussorio* instrumento de  
 primenda erit dura mater, utque ma-  
 teria in cranii cavitate collecta eo fa-  
 cilius exitum inveniat, clausis naribus  
 & ore spiritum contineat patiens,  
 sic pressio cerebro profundius con-  
 tenta prorumpent.

*Arm.*  
*Tab. III.*

F. 3.

*Schult.*

*Arm.*  
*Tab. II.*

F. 10.

Ad duræ matris mundificationem  
 immittendum foramini *Mel Rosac.*  
 cum *tantillo Vini Spiritu*, cui mem-  
 branæ, Sindonis chremesino colore  
 tincti portiuncula superimponen-  
 da: &, ne particula dicta locum mu-  
 taret, filum ei adalligandum. Qui-  
 buscum tamdiu continuandum, donec  
 humores extravasati non amplius  
 prodeant, & Symptomata evanes-  
 cant.

Interim ut os exsiccetur *pulveres*  
*Cephalici* ipsi adspargendi. Vulneris  
 insuper cutanei curatio medicamen-  
 tis *digestivis*, ut sunt *Balsam. Pe-*  
*ruvian. Copayv. Hispanic. Aqua-*  
*pend.* perficienda. Caput denique ro-



to curationis tempore pannis, ne ab aëre frigido lædatur, bene coope-riendum.

Si vero ex ipsa dura matre caro molliuscula & fungosa (cerebri fungus dicta) propullulat, ea quantocyus auferenda & absumenda, non acribus, non corrosivis medicamentis, sed exsiccantibus, (ut vocant) aspersione videlicet *pulveris Sabinae*, vel pulv. *Marchetti* sequentis,

*Vid.*

*Marchet.*

*Ob. Chi-*

*rurg.*

*VIII.*

℞. *Schænanthi* & *Spicae Nard.*

*aa. q. s.*

Nonnunquam vero *fungus* iste tantum sumit incrementum, ut necesse habeamus filo serico eundem arctius circa radicem tamdiu ligare, donec succo nutritio destitutus emarcescat, tandemque decidat. Alias in principio operculum ex *lamina aurea* vel *argentea* ita apponitur duræ matri, ut carnis fungosæ proventus compressione ista impediatur.

Contingit aliquando, ut superior cranii tabula punctim lædatur: Quo in casu *Trepano Exfoliativo* utendum,

dum , ac eousque os abradendum, *Vid. Soling. Tab. 11. F. 1. 3.*  
donec punctura dispareat , ejusque  
vestigium non amplius conspiciatur.

Os Frontale notabiles habet cavitates; quapropter fracturam passum multis imposuit cerebrum graviter vulneratum credentibus , quum tamen non nisi superior ejus tabula, longe satis ab inferiori remota, læsa fuerit.

Dantur casus , in quibus fracturæ cranii suspicio quidem adest , ubi tamen sola cutis incisio sufficit , sanguine enim extravasato , pericraniumque male afficiente , facta via, exeunte, symptomata remittunt.

Sic etiam *fissura* satis hianti cranio inflicta, ut pus per eam exire possit, perforatio ejus minimè est necessaria.

Necessitate urgente cranium sub Temporali musculo fracturam aut fissuram agens perterebrare licebit, dummodo secundum carnosarum fibrarum longitudinem incisio instituat.

## 24 E X P E R I M E N T A

*Depressio cranii* præprimis in pueris non semper requirit Trepani applicationem : Nullo enim urgente symptomate notabili , capilli tantum circa locum depressum sunt abradendi , & pars affecta *fomentis cephalicis* calide fovenda. Cranium namque depressum quamvis maneat , raro tamen patienti periculum portendit.

*Cucurbit.*  
*vide apud* Cranii in pueris depressi restitutio-  
*Soling.*  
*Tab. 1.*  
*Fig. 10.* nem , quam ope *Cucurbitulae stan-*  
*neæ* nonnulli intendunt , improba-  
mus , quoniam hoc modo , integu-  
menta à subjecto osse facilè separan-  
tur , cranio remanente depresso.

Quæritur an Duram matrem secare liceat ? Respondetur : Ubi certo constat materiam inter meninges hære-  
re , incidendam eam (licet non sine periculo) censemus. Medicus inter-  
rim & Chirurgus suæ quoque famæ consulant , oportet.



## EXPERIMENT. VI.

*De Strabismo.*

**O**culorum musculis paralyfi seu convulsione laborantibus, vel nimium relaxatis, vel mala consuetudine contortis, antagonistæ magis contrahuntur vel extenduntur, oculusque versus unum aut alterum latus deflectit. Si enim musculus oculum adducens affectus, tum nasum seu canthum majorem, si abducens canthum minorem respicit.

Primum nati infantes præ reliquis hoc malo afficiuntur, quod illorum musculi admodum tenelli à leviori causa affici possint; Imo in cunis jacentes sola lucis pertinaci aspectione (potissimum visio oblique si fiat versus candelam ardentem vel lucidas fenestras) Strabismum incurrere experientia constat. Non raro ab inopinato terrore, fulgure, frequentius autem à convulsionibus Epileptici-  
cis infantibus supervenientibus, hoc

malum ortum duxisse , compertum est.

Summe itaque necessarium erit , matres ita componant cunas , ut candelam ardentem , aliamve lucem oblique aspicere infantes non possint; Si vero oculus quodammodo jam distortus sit , contrarium priori situm componere convenit , ut oculus affectus sensim motui naturali iterum assuescat.

Ubi distortio versus nares observatur , nonnulli floccos chremesino colore tinctos angulo externo apponunt , ut hos continuo respicientes oculi pristino statui restituantur.

His vero incassum tentatis , *larva* duobus foraminibus oculorum regioni oppositis prædita , faciei superimponenda , ut ita infans per dicta foramina lucem intueri necesse habens , oculos in linea recta objecta aspicere iterum erudiat. Cujus larvæ delineationem Vid. apud *Schultetum*.

*Schult.*

*Append.*

*Tab. IX.*

*F. 6.*

Si vero Oculi distortio ab humore acriori alterum ex musculis vellican-

te

te & contrahente ortum duxerit, *Cataplasma ex Lacte dulci cum pane bis cocto & tantillo Croci paratum* calide oculo applicandum. quod acrimoniam temperando, sæpius levamen attulit.

Si ex paralyfi malum oriatur, *Antiparalytica* conducunt, sic *Fotus*, quos *Salv. Aneth. Beton. Hyperic. Rut. &c.* ingrediuntur magnæ sæpius sunt efficacix.

Hæc autem speciatim locum habent in primum natis, infantibus & pueris: In adultis enim partium tubulis durioribus, fibrillisque crassis, rigidis & inflexilibus gaudentibus, inemendabile fere malum Strabismus esse solet.

## EXPERIMENT. VII.

### *De Cataractæ Depositione.*

**C**irca oculos elegans & subtilissima occurrit Operatio, quam *Cataractæ depositionem* vocant. Contingit enim non raro membranulam



lam quandam five pelliculam adhærere internæ uveæ parti, ubi foramen pupilla dictum conspicitur, qua interveniente radii ab externis objectis procedentes, ad retinam usque nervumque Opticum penetrare nequeunt.

Non tamen ubique eodem modo sese habet: Aliquando enim pupillam ex parte tantum pellicula tegit, subinde ad medietatem usque eam obumbrat, imo nonnunquam totam obscurat.

Quandoque malum in ipso humore crystallino hæret, cujus antica superficies opaca reddita colorem mutat, salvo manente humore aqueo.

Affectus hic pro Cataracta ab imperitis habitus, Cataracta proprie non est, sed Crystallini humoris obstructio à particulis terrestribus, nulla arte tollendis, ortum trahens.

Membranæ istius colores multum inter se variare solent: aliquando enim albicanti, nonnunquam gryseo,  
sub.

subinde vitreo, quandoque flavo, mox viridi, colore prædita conspici-tur; sæpe chalybis aut castaneæ co-lorem æmulatur, & non raro nigri-cat. Melioris autem notæ membranæ sunt quæ lividæ, & perlarum instar coloratæ videntur.

Notandum interim hoc loco ve-nit, quod Iris in Cataracta laboran-tibus aliquando, veluti in sanis, con-trahatur & dilatetur. Subinde vero aut contracta aut dilatata, firmissime cum ipsa Cataracta conjuncta immo-bilis maneat, unicumque quasi cor-pus efformet. Id quod facile explo-ratur, si palpebræ clausæ leni frictio-ne agitentur, iisque apertis oculus subito inspiciatur.

Antequam Cura instituatur, exa-minandum, an Cataracta sit inci-piens, an vero confirmata.

In incipienti, externe singularem usum habet Infusum Croci Metallo-rum, ut & sanguis columbinus cali-de adhibitus. Vel

℞. *Succ. express. Chelidon.*

*Fæ-*

*Fœnicul. aa. ʒiʒ.**Vin. alb. Gallic. ʒiij.**Fol. Majoran.**Euphrag.**Rutæ.**Flor. Rosar. rubr. aa. p.j.**Fel bovin. ʒʒ.**Aloës.**Myrrh. aa. ʒj.**Caphur. ʒʒ.**F. S. a Destillatio ex MB.*

Sequens etiam mixtura laudem meretur.

*℞. Aq. Fœnicul. ʒx.**Regin. Hungar. ʒjʒ.**Sp. Sal. Armon. gutt. vij. M.*

Practici nonnulli hoc in casu Mercurialibus utuntur, quibus ejusmodi concretiones membranaceas dissipatas se vidisse asserunt.

In confirmata vero Cataracta talia medicamenta perperam adhibentur, nihilque plane efficiunt. Hinc ad Chirurgiam unice tanquam ad sacram anchoram confugiendum. Quæ tamen non semper locum invenit:



I. Videlicet cum æger de dolore Capitis pertinaci diu conquestus, eodem adhuc laborat.

II. Ubi febricitat, aut in alium morbum, vel notabilem sanguinis intemperiem aut Cacochymiam incidit.

III. Quando Cataracta ad nigredinem aut flavedinem vergit, vel plumbei coloris conspicitur.

IV. Dum facta palpebræ frictione, Iris neque dilatatur, neque contrahitur, sed in suo situ permanet immobilis.

V. Denique, si humore aqueo & Iride bene constitutis, malum hæreat in humore crystallino.

Præterea utrum Cataracta matura sit nec ne examinandum.

Cataracta nondum ad maturitatem perducta cognoscitur.

I. Si post factam palpebræ frictionem, pellicula in partes divisa & mobilis conspiciatur.

II. Si radios candelæ, phialam aqua repletam transeuntes, percipiat, colo-

## 32 E X P E R I M E N T A

coloresque quodammodo adhuc distinguat. Quibus in casibus Operatio non est instituenda, sed in aliud magis opportunum tempus differenda.

Ubi Cataracta jam matura, (quod in aliis citius, in aliis tardius accidit) sequenti methodo procedendum.

Corpore purgato, die sereno & lucido, horis matutinis, deponatur æger in sedili lumine adverso, hinc oculus sanus obligetur, mox Chirurghi hypochondria brachiis suis amplectatur, totoque Operationis tempore quietum se teneat. Caput interim patientis ministrorum unus à posteriori parte immobile contineat.

Nonnullis in more positum est oculum affectum prius masticati fœniculi halitu irrorare, palpebrasque nonnihil fricare, quod tamen nos summopere necessarium non putamus.

*Acum  
delinea-  
tum vide  
apud  
Schult.  
in Ar-  
mam.  
Tab. VIII.  
F. 2. 3.*

*Acus* itaque per pannum laneum aliquoties transmittatur, ut parum incalescat, aptiorque operationi evadat: Mox Chirurgus palpebram aperiat,

riat, ægroque ad angulum majorem oculum ut convertat, injungat. Tum dextra manu si sinister, sinistra si dexter oculus laboraverit, unico ictu, ac pressione aliqua tunicæ Corneæ, straminis distantia ab Iride acum imponat, quæ sensim quasi trebrando per Corneam adigatur; Ubi jam nullam sentit Chirurgus renitentiam, signum est intra oculi bulbum acus cuspide perventum; tunc ad ipsam pelliculam inclinanda acus, cujus cuspide paulatim illa separanda ab Uveæ margine, ejusque parte superiore versus inferiorem; dein leniter vertendo intra oculi bulbum ad angulum oculi externum paulo vehementius deprimenda, donec ibidem hæserit.

Quod si inter operandum refractarie ad superiora iterum ascendat, vel in minimas partes abeat, tunc Cataracta tota, aut partes ejus humiliori loco ad aliquot momenta detinendæ sunt, ne finita Operatione pupillam oculi rursus petant.



Operatio dum peragitur, sedulo cavendum, ne CrySTALLINUS humor & sanguinea tunicarum vascula duriori attractu lædantur, iis namque læsis aqueus humor sanguineus, malumque immedicabile reddi posset.

Hiscæ peractis acus prudenter retrahenda & extrahenda, oculoque læso *Collyrium ex Aq. Rosar. Album. ov. conquassat. & tantill. Alum.* cum linteo duplicato admovendum, & sanus æque ac affectus oculus devinciendus erit. Postea capite elevato quieti se componat, sobrie & abstinenter per aliquot dies vivat, cibisque liquidis utatur.

Duæ vero in hac Operatione occurrunt difficultates. I. Quod acutior acus facillime quidem per Corneam trajiciatur, sed ad Cataractam deprimendam minus conveniat propter cuspidis tenuitatem, quæ facile aut pelliculam in partes dividit, aut vasa sanguinea lædit. II. Quod acutius cuspis, si obtusior fuerit non ita facile Corneam perforet, præprimis



36 E X P E R I M E N T A  
dum. Facta incisione *Collyrium* ex  
cicatrifiantibus & leniter astringenti-  
bus adhibendum: Externe videlicet  
*ex Album. ovi Alum. & Aq. Rosar.*  
Intra palpebras autem *Collyr. ex Aq.*  
*Plant. cum Tut. præparat.*

Coalescente vero palpebræ inte-  
riori superficie cum ipso oculi bulbo,  
videndum, an illa cohæsiō late se ex-  
tendat. Quod si tanta non sit, Em-  
plastro glutinoso palpebra aperta te-  
nenda, & *forfice tenuiori vel lanceo-*  
*la subtiliori* prudenter separanda e-  
rit.

Post separationem *Collyrium*  
præscriptum convenit, cicatrixque  
introducenda; quod tamen non sem-  
per succedit, sed nova nonnunquam  
subsequitur adhæsiō; Tum vero præ-  
stat *laminam* ex pergamena cum *Tin-*  
*ctura astringenti* vel *Vino Tint* cocta,  
ad convexam oculi superficiem effor-  
matam, parti separatæ interponere.  
Singulis vero diebus hæc interposita  
lamina renovanda, novaque in pri-  
oris locum substituenda, donec tan-  
dem



dem ad cicatricem vulnus perducatur, admoto externè leniter astringenti collyrio.

## EXPERIMENT. IX.

### *De Oculi Cicatrice albicante.*

**C**ornea Oculi tunica pellucida, non raro deformis redditur macula quadam albicante, ingratum ipsi colorem inducenti. Hæc Iridem sæpius tegit sine notabili tamen incommodo. Aliquando ipsam pupillam adeo obnubilat, ut radiis ab objectis versus oculum tendentibus ingressus denegetur, patiensque magnum ita patiatur visus impedimentum.

Malum si altas nondum egerit radices, conveniunt Collyria de acedine parumper participantia, v. g.

℞. *Aq. Fœnic.*

*Euphrag. aa. ʒiv.*

*Tut. præpar. ʒj.*

*Vitriol. alb. ʒij.*

M. & leni ignis calore coquantur parum, Colaturæ gutta una aut al-

tera bis terve de die oculus irroretur. Si vero adfuerit inflammatio, Colaturæ possunt addi *Caph. gr. xv.*

Cæterum egregius est pulvis aliquis scaber, quo non raro maculæ hujus superficies abraditur atque consumitur. e. g.

*R. Bol. Armen. (vel potius Tut. ppar.) ʒj.*

*Pulv. Off. Sepiæ. ʒß.*

*Sach. Cant. alb ʒj.*

M. F. Pulv. subtilissimus ter de die oculo inflandus.

## EXPERIMENT. X.

### *De Oculo Artificiali.*

**V**ariolæ, Morbilli, Inflammationes, Vulnera, Ulcera &c. aliquando adeo malè afficiunt oculum, ut vel visum destruant, vel oculum exedant atque consumant, vel turpi cicatrice deformem reddant.

Quoniam verò irreparabile hoc malum est, artis Chirurgicæ Cultores Artificialem Oculum sibi fabricari cu-

ra-

rarunt, qui nihil aliud est, præter <sup>Oculos</sup> Hæmisphærium aliquod ex vitro <sup>Artifi-</sup> confectum, atque ita coloratum, ut <sup>ciales de-</sup> cum oculi facie externa plane con- <sup>lineatos</sup> <sup>v. apud</sup> <sup>Schult.</sup> <sup>in Ap-</sup> <sup>pend.</sup> <sup>Tab. IX.</sup> <sup>Fig. I. 2.</sup> <sup>3. &c.</sup> <sup>veniat.</sup>

Ex lamina quoque argentea aurea- <sup>ve</sup> excavata, & vitrea crusta (quam <sup>Nostrates</sup> *amilieersel* vocant) obdu- <sup>cta</sup>, oculi colorem superficiemque æ- <sup>mulante</sup>, componitur, atque infra <sup>palpebras</sup> oculo læso adaptatur; ita <sup>enim</sup> motu oculi affecti capsula illa <sup>artificialis</sup>, ac si oculus sanus esset, <sup>movetur.</sup>

Longe tamen præferimus Hæmi- <sup>sphæria</sup> illa ex vitro confecta, quod <sup>splendorem</sup> suum rectius servant, <sup>quam</sup> hæ capsulæ vitro obductæ, faci- <sup>le</sup> colorem suum, ab humore, oculum <sup>irrorante</sup>, mutant.

Hoc autem ut felicius peragatur, <sup>ante</sup> applicationem Oculi Artificialis, <sup>applicetur</sup> prius lamina quædam <sup>plumbea</sup>, eodem modo excavata, <sup>quam</sup> per biduum aut triduum gestat <sup>patiens</sup>, ut ita male constitutus ocu-



lus ejusmodi capsulæ vel vitreæ, vel aureæ, deinceps applicandæ, sensim assuescat.

## EXPERIMENT. XI.

### *De Polypo Narium.*

**N**arium cavitatem internam tumor quandoque occupat, *Polypus* dictus, modo carnosus, modo pituitosus, colore aliquando rubicundus, lividus vel obscurus, subinde molliusculus, vel cartilagineus, pedunculo suo nunquam pendulus, vel multis in locis narium tunicæ internæ annexus, quo nares non tantum clauduntur, sed respiratio & loquela, præsertim ubi post Uvulam sese extendit, notabiliter præpediuntur.

Præter intemperiem in ipsa massa sanguinea quærendam, non raro Ulcera, Hæmorrhagia narium, Coryza, Catharri, Casus, hunc affectum præcedunt. Licet autem ut plurimum sanguinem non fundant Polypi, aliquando

do tamen sanguinem fundentes, aut etiam cum Lunæ phasibus incrementum & decrementum sumentes, conspiciuntur.

Si illorum color lividus, plumbeus, aut situmor canerosus conspicitur, difficillime restituuntur. Nec ita facilem curam admittunt, qui carnosissimi & duriores; faciliorem vero, qui albicantes, molliusculi & unico pedunculo penduli apparent.

Curatio absolvitur vel medicamentis, vel filo, vel ferro. Filum tamen non ubique convenit, quod satis alte Polypo ligatura injici nequeat. Si cui tamen hac methodo Polypum exstirpandi animus, procedat uti *Hildanus* in Trago Scirrroso, ex aure propullulante, *Observ. 1. Cent. 3.* ubi instrumenti & fili usum distincte proponit.

Quidam ex amicis Chirurgis utitur eadem instrumenti forma, sed minori, quali Uvula refecatur.

Alii fili usum declinantes, medicamentis utuntur primò mitioribus,

42    E X P E R I M E N T A  
dein fortioribus corrosivis.

Observandum interim ut Narium interior tunica sana adhuc muniatur, & obducatur, Unguento albo Caphurato, Populeo, Refrigerante Galeni, aut Nutrito, ne particulæ medicamentorum applicandorum nimis acres partes lædant sanas.

Polypo itaque tollendo sequentia inserviunt.

℞. *Succ. Granator. coct. inspiss. q. pl. quo Polyp. obliniatur.*

℞. *Cortic. Granator. & Sabin. F Pulv. Polypo admovendus.*

℞. *Cap. Mort. Vitriol.*

℞. *Vitriol. Alb. pulver.*

℞. *Cap. Mort. Vitriol. subtil. pulv.*

*Ung. Ægypt liquidior. q. pl.*

℞. *Alum. cum Bolo Armen.*

℞. *Spir. Vitriol. cum Aq. Plantag.*

℞. *Aq. Fort. cum Aq. Solan.*

Subinde radicitus extirpantur aqua cum Mercur. Sublimat. cocta. vel

℞.



℞. *Vitriol.**Ærugin.**Alum.**Mellis aa. q. s.**M. F. cum Aceto Unguentum molle.*

Notandum autem, tenuiora medicamenta penicillo, majoris vero consistentiæ linteis carptis esse admovenda.

Verum hæc aliquando nihil juvant, sed instrumento, *Forfex can-*  
*nulata* dicto, Polypus auferendus venit; Cujus instrumenti effigies exstat  
 apud *Severinum* lib. 1. de Efficaci  
 Chirurgia p. 115.

Præstantius autem illud instrumentum foret, si in concava parte superiore duobus aut tribus dentibus quadratis & acutis esset præditum, qui firmitus dictum tumorem apprehendere possent.

Extracto Polypo reliquiæ inurantur ferro ignito per Cannulam naribus immisso, ut ita Polypus radicitus extirpetur; alias enim facile recrudescens malum difficulter per medica-

ca-

*Instru-*  
*menti*  
*delineat.*  
*v. apud*  
*Aqua-*  
*pend. &*  
*Schult.*  
*in Arma-*  
*ment.*  
*Tab.*

XXXIII.  
 Fig. VII.

44 E X P E R I M E N T A  
camenta Caustica & Astringentia restitui posset.

Non tamen ubique ferro ignito untur. Extracto enim Polypo admoveatur Spiritus Vini cum melle rosaceo mistus, eoque solo post extractionem patientes curant.

Solus etiam Sp. Vini, vel Tinctura Cinamom. cum melle Rosaceo, cum successu admoventur.

Dexterrimus quidam Chirurgus, experientia aliquoties edoctus, Extractionem dissuadet, & aqua solummodo Calcis utitur, qua sæpius Polypum tangit, quaque nuper adhuc Polypum, ad labii superioris oram pendulum, felicissime sustulit.

## EXPERIMENT. XII.

### *De Hordeolo & Grandine.*

**I**n palpebra superiori concrescit aliquando tuberculum rotundum & pellucidum, mobile simul, atque digiti pressuræ cedens. Græcis χαλᾶσι vocatur; Latinis *Grando*.

Aliud ejusdem fere naturæ tuberculum in palpebrarum margine piloso occurrit, *Hordeolum*, ob hordei grani similitudinem, nuncupatum.

Sæpe in Abscessum abeunt, & sponte rumpuntur. Quod si non contingat, acus beneficio capitulum albicans aperiendum, & materia intus collecta expressa, Emplastrum Cicatricans imponendum.

Ubi ex pedunculo pendulum conspicitur tuber, ligatura ipsi erit injicienda, quæ quotidie arctius contracta tuberculum tandem separare valet.

Durius quandoque occurrens tuberculum, pulticula sequenti ad maturationem perducendum.

℞. *Medull. pan. alb.* ʒiʒ.

*Croc.* ʒʒ.

*Vitell. Ovi N. j.*

*Lact. Vaccin. q. s.*

M. F. Cataplasma, quod duobus linteaminibus Cambricenis impostum applicetur.



Facta suppuratione procedendum ut supra.

Si acrior fuerit materia, ab eaque palpebræ superficies cartilaginea corrosa appareat, abraſa prius superficie læſa, imponatur *Alb. Ov.* cum *Melle Roſac.* permixtum.

Tractionem fili, in modum ſeta-  
cei, utpote nimis moleſtam & even-  
tus dubii, quicquid alii contradicant,  
non approbamus.

Si in interna palpebræ parte, ocu-  
lum tangente, Hydatides exiguæ, a-  
liæve tubercula conſpiciantur, illa  
mature aperienda, iisque *Alb. Ov.*  
*conquassat.* cum *Aq. Roſar.* appli-  
candum, cavendumque, ne palpebra  
cum oculi tunica concreſcat.

### EXPERIMENT. XIII.

*De Hypopyo, ſive Oculo purulento.*

**A**fficitur aliquando Oculus,  
quamvis rarius, affectu quodam  
quem Græci ὑπόπιον, Latini *Saniem*  
*in Oculo* vocant. Eſt autem nihil aliud

liud, quam collectio materiæ purulentæ mobilis, in ipso oculi bulbo conspicuæ; quæ subinde pupillam occupando, lucis radios excludit visumque destruit.

Causam agnoscit vel Externam, vel Internam.

Externe oriri potest à Casu, Ictu, Contusione, Vociferatione, Vehementioribusque quibusvis exercitiis, quibus vasculum aliquod sanguineum, tunicæ Uvæ læsum, sanguinem sub forma sanguinis effundit, qui brevi temporis intervallo materiæ purulentæ faciem assumens, huic malo viam sternit.

Cui quoque obstetricari possunt Ductus nostri Aquosi solito patentiores redditi, varias una cum aqueo humore particulas crassiores, à reliquo sanguine divortium facientes transmittendo, quæ in oculi bulbo coeuntes, materiam purulentam repræsentare videntur.

Interne vero non semel Hypopyum portendit, gravis Dolor capitis  
diu

diu perdurans, continuoque excrucians, à corrosivo & acri sanguine ortum trahens, qui dicta vascula lædendo, materiamque ejusdem indolis in oculi bulbum exspuendo, fores ipsi pandit.

Inter medicamenta externa commendamus sequens, vel huic simile Collyrium:

*Rx. Aq. Rosar.*

*Fænic. aa. ʒij.*

*Tut. præpar. ʒß.*

*Antimon. Diaph. ʒj.*

*Tinctur. Croc. ʒß.*

*Aq. Regin. Hungar. ʒß.*

M. F. Collyrium ter quaterve de die calide adhibendum.

Eo namque aliquando, materia purulenta incisa & attenuata, pristinus oculis vigor iterum conciliatur.

Materia vero in oculi bulbo hærente nimis crassa, nullisque medicamentis tam externis quam internis auscultante, sunt qui patientis caput tamdiu motitare solent, donec ipsa materia loco mota, in varias abeat parti-



particulas, externis deinceps medicamentis discutiendas.

Verum enim vero Methodum illam patienti nimis moleſtam plane improbamus, cum tam arcte inter ſe cohærentes particulæ hoc modo à vinculis ſuis liberari nequeant.

Præſtat itaque instrumento, huic *Inſtru-*  
uſui convenienti, tunicam Corneam *ment. v.*  
ſecundum fibrarum ductum extra Iri- *apud van*  
dem, ſimul & ſemel pertundere, ut *Mekeren*  
materiæ ibidem collectæ pateat exi- *Cap. IX.*  
tus. Si vero non ſufficienter prodeat, *& Scult.*  
oculi bulbus parumper comprimen- *in Ap-*  
dus, mox fibris ſeſe jam contrahen- *pend.*  
tibus ſequens Collyrium admoven- *Tab*  
dum: *XIII.*

℞. *Aq. Plantag.*

*Rosar. aa. ʒvj.*

*Sief albi ʒj.*

*Sem. Cydon. ʒij.*

*M. F. Collyrium.*

Quo ſolo poſt factam incifionem curatio nonnunquam abſolvitur.

Quod ſi vulnuſculum inſlictum difficilius conſolidetur, *Aqua Plan-*

D

*tag.*

# 50 EXPERIMENTA

*tag. cum Album. Ov. conquass. & tantillo Croc. applicandum.*

Si vero cicatrix oculi superficiem deformem reddat.

*Rx. Aq. Plantag. ℥ij.*

*Tut. prepar. ℥ij.*

*Lap. Calam. ℥j.*

*Sach. Cant. alb. ziss*

M. F. Collyrium bis terve quotidie adhibendum.

## EXPERIMENT. XIV.

*De Aurium Chirurgia, Ceruminibus &c. extrahendis.*

**C**erumen, auriumque fordes meatui auditorio inhærentes, eum aliquando ita obturant, ut surdaster reddatur patiens, imo ipsam sæpius incurrat surditatem.

*Auri.*

*scalp.*

*apud So-*

*ling. Tab.*

*III. Fig.*

*IO. &*

*II.*

Quo in casu (si molliuscula fuerint cerumina) *Auriscalpio* extrahenda erunt. probe cavendo, ne inter extrahendum Tympani membrana, cutisve meatus auditorii glandulosa, lædatur.

Si quædam Ceruminis portio membranæ firmiter annexa maneat, dictoque instrumento ab eadem avelli nequeat,

℞. *Hydromell. Calid. q. s.* quo ope Syphonis aliquoties auris eluatur, ita enim de duritie sua remittit, feliciusque extrahitur. Eodem quoque auriscalpio vel ferramento, si linteam carptum ei affixum, eruitur.

Ad Lapillum, Nucleum ceraforum, simileve durum corpus, meatum auditorium obstruens, extrahendum, variæ formæ Auriscalpia requiruntur.

Ut vero eo facilius Operatio peragatur, olei alicujus guttæ aliquot auri prius instillandæ.

Piso eundem meatum obturante, & in magnam molem intumescente, instrumento, *Auris Speculum* dicto, utendum, quo meatus auditorius, diductis ab invicem lateribus, facilius inspiciatur, & faba pisumve Auriscalpio melius extrahantur.

Quod tamen certius aliquando per-



52    E X P E R I M E N T A  
agitur, si oblato sternutatorio capu  
concutiatur.

Globulus ligneus aut plumbeus e-  
odem modo erit extrahendus, non  
vero *Terebello*, quo globuli ex aliis  
partibus eruuntur; eo enim hoc in  
casu premuntur nimis; & pressi non  
raro Tympani membranam graviter  
afficiunt.

*Vid.*  
*Sculpt.*  
*Auctar.*  
*Secund.*

Aliquando *Turunda* altius immis-  
sa extrahi facile nequit, ipsamque  
surditatem inducit. Quo in casu si  
nec forcipe nec Volsella quid profi-  
cimus; *instrumento*, cylindro acutio-  
ri donato, extractio facile peragitur.

Quod si Animalcula, v. g. Muscæ, A-  
raneæ, & id genus alia insecta, auris me-  
atum fuerint ingressa, spongiæ porti-  
uncula stylo ferreo alliganda, quæ re-  
sina Terebinthinæ imbuta auri immit-  
tatur: quaque dum animalculum ipsi  
adhæret, haud difficulter extrahitur.

Si vero ex voto res nondum suc-  
cesserit; immisso liquore amaricante  
v. g. *Succo Absinth. Cent. minor.*  
*Tinct. Card. bened. Oleo amygd. a-*

*mar*

*mar. Ol. Tanacet.* necantur atque eruuntur. Quo artificio etiam vermes, in meatus auditorii ulceribus prognati, interficiuntur.

# EXPERIMENT. XV.

*De Aurium Excrefcentiis, Dolore  
& Tuba Acovistica.*

**E**xcrefcentiæ Aurium carnosæ vel fungosæ prudenter sunt tractandæ; forfice nimirum vel cultello, si possibile, abscindendæ, partique læsæ stypticum parum aut nihil de acrimonia participans, ne membrana Tympani lædatur, applicandum: mox turunda durior Unguento cicatricante oblita, & pulvere *C. C. Ust.* aspersa immittenda.

Alias, optato cum successu, ejusmodi excrefcentiæ iisdem medicamentis, quibus carunculæ in meatu urinario, curantur.

Hinc medicamentum sequens maximopere commendamus,

*Rx. Off. Sep.*

*Tut. præpar. aa. ʒij.*

*C. C. Ust.*

*Aloes lot.*

*Arist. rot. aa. 3j.*

*Alum. ust. 3ß.*

*M. F. Pulvis subtiliss.*

*Dein R. Ol. Rosar. 3ij.*

*Litharg. aur. 3j.*

*Coq. ad Emplastri consist. tunc ab igne removeatur, & addatur prædictus Pulvis, misceanturque ad ignem tamdiu, donec duriusculum evadat medicamentum.*

Hujus portiuncula excrescentiæ admota eandem sensim & sensim consumit.

Nonnunquam meatus auditorius membrana quadam sicuti Velo expanso clauditur, quæ pertundenda, & pertusa cicatricanda erit.

Si vero illa membrana prope Tympani membranam conspiciatur, eamque tegat, cave operationem instituas, sed manum retrahas.

Aliquando aures intolerabili afficiuntur dolore. Quo in casu sæpius cum successu adhibetur sequens,

*R. Lact. muliebr. 3ß.*

*Croc.*



*Croc. gr. xij.*

*Decoct. Chamom. vel Fœni-  
græc. ℥iij.*

*Sacch. Saturn. ℥j.*

Hujus Mixturæ portiuncula auri  
calide immittatur.

Si dolor nimis vehemens adhuc  
urgeat,

*R. Ol. Sem. papav. ℥iſſ.*

*Caph. gr. v.*

*Op. Crud. gr. ij.*

*M & Auri instillentur.*

Opiatis tamen non utendum nisi  
urgente necessitate.

Quomodo inflammationes, Ab-  
scēſſus, & Ulcera sint tractanda, de  
iis consulantur Autores.

In quavis Surditate aut obauditio-  
ne, medicamentis non cedente, con-  
venit *Tuba Sonorifera*, seu *Acovi-  
stica*, quam ægri propriis auribus ada-  
ptant, ut sonum distinctius perci-  
piant.

Si vero aurium adfuerint Tinnitus  
Tubæ rarius prodesse solent.

*Tubæ  
delineat-  
vid. in-  
fra post  
Indicem  
Fig. III.*

## EXPERIMENT. XVI.

*De Aure perforanda.*

**M**atronæ quædam & Puellæ auris lobum nonnunquam perforari cupiunt, ut per foramen arte factum annulus traducatur, quem vel ornatus gratia; vel (uti perhibent) pro quibusdam oculorum affectibus mitigandis, pendulum gestant.

Operatio hæc facili modo sequenti methodo peragitur: Lobus levi frictione agitatus, loco perforando atramento prius notato, acu modo ignita, modo non ignita perforatur, annul usque trajicitur.

Non raro autem contigit, annulum ex aure pendulum, foraminis facti latus inferius duriori attactu premendo, tandemque dilacerando, decidisse, hiatu quodam cum turpi cicatrice remanente.

Ad huic malo succurrendum, Chirurgi conveniens excogitarunt instrumentum, quod *Forcipem Cannula-*

*tam*

*tam* vocant : cujus beneficio, loco Forcipem  
vid. apud  
Soling.  
Tab. IV.  
F. 3. perforando prius notato, lobi particula justæ magnitudinis (annuli scilicet trajiciendi crassitiem circumferentia adæquans) aufertur, patulumque foramen relinquitur : mox annulus Unguento aliquo cicatricante v. g. *Minio*, *Diapomphol.* & sim: oblitus traducitur, sicque sine notabili incommodo foraminis latera facile consolidantur.

## EXPERIMENT. XVII.

*De Hydrocephalo.*

**D**atur Hydropis species ὑδροκέφαλον Græcis dicta, ab obstructis aut disruptis Vasis Lymphaticis capitis originem trahens. Hinc Tumores & aquæ collectiones in eo fiunt vel externe vel interne. Externe inter cutim & cranium, interne inter Cranium & Duram matrem, nonnunquam inter Duram & Piam matrem, subinde inter Piam matrem & cerebri Corticem, vel denique in ipsis ce-



rebri Ventriculis aquæ colliguntur, quibus caput in monstrosam magnitudinem extenditur.

Infantes frequentius hoc malo corripuntur quam adulti, quoniam eorum vascula, justo adhuc molliora, levi negotio extendi, nimis vero extensa facile disrumpi possunt. Sanguine insuper, succisque ab eo dependentibus crassioribus, & ad obstructionem magis aptis, sunt præditi.

Chirurgus prudenter hic procedat summopere necessarium putamus; Chirurgia enim, incisione & perforatione instituta, nunquam Hydrocephalum restitutum audivimus, sed omnes, in quibus Operatio fuit administrata, extinctos inde fuisse, Practici fide dignissimi unanimiter testantur.

Si malum interne à lymphâ crassa & viscida, Vasa Lymphatica obstruente, originem traxerit, medicamenta Volatilia atque Sudorifera. Diureticis maritata, interne assumpta, utramque absolvunt paginam.

Ex.

Externe Cataplasmata, vel Fötus  
capiti calide admovenda v. g. Ex *Fol.*  
*Artemis. Majoran. Rorismar. Absint.*  
*Caph. & Croco* cum s. q. *Vin. alb.*  
*Gall.* quod bis terve de die renove-  
tur. Vel

*Rx. Pulv. Rad. Cucum. Asuin.*  
*Irid. aa. ʒß.*

*Sem. Cumin. ʒj.*

*Farin. Fabar. ʒij.*

*Flor. Meliss.*

*Anthos. q. pl.*

*Cum Vino F. Cataplasma eodem  
modo applicandum.*

Hoc Cataplasmate Practicus qui-  
dam singulari cum successu fuit usus.

Nonnulli fasciæ adminiculo, quam  
*Capitalem* Latini, *La Capelline* Gal-  
li vocant, quaque totum caput ob-  
volvunt, Hydrocephalum restitue-  
re conantur, sed irritò plane conatu.

Si vero malum fuerit externum,  
& in principio, vel si leviori humo-  
ris extravasati pressione, Suturae à  
se invicem recedant, imposito prius  
*Emplastro de Cumino*, dicta fascia  
pa-

patientem aliquando restitutum novum.

Quæritur, an Fonticuli, Seracea, & Vesicatoria alicujus utilitatis hoc in affectu esse possint?

Resp. Si lymphæ acrior fuerit, Vasis Lymphaticis adhuc integris, præter interna medicamenta, eadem profuisse Practicis observatum.

## EXPERIMENT. XVIII.

### *De Curanda Dentagra.*

**I**nter alias corporis nostri partes, intolerabili aliquando dolore affectas, primas sæpe tenent Dentes, qui varias ob causas, tantis non raro afficiuntur cruciatibus, ut patiens (omnibus incassum adhibitis medicamentis) doloris acerbissimi impatiens, eundem amplius perferre non possit.

*Instru-  
menti  
delin.  
vide in-  
fra post  
Indicem.  
Fig. IV.*

Huic incommodo ut succureret ars Chirurgica, instrumentum, quo dolor hic momento citius, & quasi incantamento tolli posset, excogitatum.

In



Instrumentum hoc *Cauterium a-* *De Anti-*  
*etuale* est, quod ignitum *Antitra-* *trago vide*  
*gum* leniter tangit, & cutim, una *Anato-*  
 cum subjacentibus nervulis, à secun- *micorum*  
 do pari vertebrali oriundis, adurit. *scripta.*

Ut autem tutius hæc Operatio absol-  
 vatur, cannula sive vagina neces-  
 saria erat, quæ cauterium dictum  
 transmittens, impedimento esse pos-  
 set, ne latera auris viciniora lædan-  
 tur.

## EXPERIMENT. XIX.

### *De Dentium Extractione.*

**D**entium Extractio feliciter ut  
 succedat, unusquisque Opera-  
 tionem hanc instituturus, exactam  
 eorum ut & alveolorum habeat no-  
 titiam, perquam necessarium existi-  
 mamus. Magna siquidem uti inter  
 Dentes sic & alveolos observatur dif-  
 ferentia. *Dentium minimi* unicaque  
 tantum radice donati *Incisores*, lon-  
 gissimi *Oculares* & *Canini*, crassissi-  
 mi *Molares* appellantur, pro qui-  
 bus

bus etiam duo , tres vel quatuor radices, totidemque alveoli numerantur.

Gaudent quoque dentes suis vasis sanguineis pariter & nervosis. Sanguinea videlicet arteriosa à Carotide , Venosa à Jugulari , Nervosa à nervis oculorum motoriis & gustatoriis accipiunt , quæ per peculiaria foramina illos ingrediuntur. *Minora* tamen vascula *Incisoribus* , *numerossiora Molaribus* , (quorum quælibet radix ramum accipit) *majora Caninis* , *maxima vero Ocularibus* dentibus sunt destinata.

Quibus consideratis haud difficile colligitur , cur quidam dentes facilius , quidam veto difficilius & cum periculo extrahantur.

Ad hanc autem Operationem debite exercendam varia requiruntur instrumenta : Aliis enim dentes Canini & Incisores , aliis Oculares , aliis Molares & Sapientix , aliis denique dentium frustra & fragmenta evelluntur.

Instrumentorum huic scopo convenientium sequentia potissimum in usu sunt :

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. <i>Pedes Caprini.</i>            | Instru-    |
| 2. <i>Rostrum Corvinum.</i>         | menta V.   |
| 3. <i>Forcipes dentariae varia.</i> | apud       |
| 4. <i>Pelicanus.</i>                | Sculpt. in |
| 5. <i>Dentiscalpium.</i>            | Armam.     |
| 6. <i>Trulla.</i>                   | Tab. x.    |
|                                     | & So-      |
|                                     | ling. Tab. |

Antequam vero Extractio instituat<sup>III.</sup>ur explorandum an vacillet dens, vel carie sit consumptus ; imo an etiam possit aut debeat extrahi bene perpendendum. Dedecori namque Chirurgo esset, nec parum ejus fama detrimenti caperet, si sine successu Operationem institueret, speciatim ubi ad Principes, Magnates & Matronas delicatiores vocaretur. <sup>Fig. 2.</sup>

Præterea, quoniam Symptoma aliquod urgens, molesta scilicet hæmorrhagia, dentium extractioni subinde supervenire solet, Stypticum medicamentum necessario ad manus esse debet, *Linteum* v. g. *carptum* vel solum, vel *succo Citri* madefactum, Vel



Rx. *Fungum* (Belg: *Bovist*) e-  
jusque particulam extracti  
dentis alveolo immitte. Vel

Rx. *Linteum Ustum* (Belg. *Tin-  
tel*.) Vel

Rx. *Pulv. aut Caput mort. Vi-  
triol.* Vel

Rx. *Chartam Emporeticam* oleo  
*Vitrioli* madidam, hanc sicca,  
siccata iterum madefac,  
madefactam denuo exsicca,  
hocque ter quaterve repete,  
tum chartæ hujus siccatae  
& præparatae portiunculam  
parti sanguinem fundenti  
admove.

Si vero hisce non cedat hæmor-  
rhagia, cauterium adhibendum.

Ut itaque extractio feliciter pro-  
cedat, gingiva ab ipso dente *separato-  
rio* instrumento prius separanda, (ni-  
jam ante à Scorbuto consumpta fue-  
rit) quia alias gingivæ firmiter ali-  
quando dentibus adnatæ dilaceran-  
tur. Mox *Pede Caprino*, si ex *Inciso-  
riis* fuerit ex alveolo dens expellitur.

Ocu

*Ocularis* aut *Caninus* *Forcipe Dentaria* vulgari extrahitur, quamvis aliquando (ubi cariei nota impressa conspicitur) hujus extractio *Pelicano* felicius peragatur.

Dentes vero *Molares anteriores* convenientius *Pelicano cum brachiis rectis*, *Molares posteriores Pelicano cum brachiis curvis* melius evelluntur. Ad dentium denique frustra extrahenda *Rostrum Corvinum* potissimum convenit.

Gravidis aut nunquam aut rarissime dentes sunt evellendi, præprimis *Oculares*, quod foetus oculorum vitio aliquando exinde fuerit affectus.

Subinde Dentes extra seriem prominentes, oblique versus interna aut externa nascuntur. Horum prominentiæ tantillum lima corrigendæ, non tamen eo usque auferendæ, ut dentis cavum in conspectum prodeat, ne intolerabilis <sup>Dentium delineat. vid. infra post Indicem</sup> *Odontalgia* exinde propullulans, patientem nimis excruciet. Idem malum facile supervenire solet, si *For.* <sup>Fig. v.</sup>

Forcip. *Forcipe incisoria* Operatio hæc insti-  
 Vid. apud  
 Soling. tuatur.

Tab. III.

F. 9.

## EXPERIMENT. XX.

*De Dentium Mobilitate, Casu, &  
 Dentibus Artificialibus.*

**M**obiles sæpe fiunt dentes, vel quod gingiva laxior reddita, dentibus firmiter non adhæreat, vel eadem acri quodam humore ad alveolos usque consumpta denudentur, minusque stabiles reddantur.

Quo in casu gingivæ blandioribus astringentibus Antiscorbuticis permixtis roborandæ, quale est medicamentum *Etmulleri* sequens.

℞. *Radic. Bistort* ℥ss.

*Flor. Ros. rubr.* ℥ij.

*Balaust.* ℥iv.

*Alum ust.* ℥ijss.

*M. cum s. q. Spirit. Cochlear. Vel*

℞. *Herb. Scord. sicc. p. j.*

*Myrrh. opt.* ℥ss.

*Alum ust. gr. vj.*

*Coq. leniter in Vini alb. Gall.* ℥ijj.

Co.



C H I R U R G I C A. 67

*Colat. ʒij. add. Mell. alb. opt. ʒiij.*

*Spir. Vin. Capbur. ʒijß.*

*Cochlear. ʒj.*

*M. F. oris & gingivarum collutio.*

Hæc mixtura in plerisque oris vi-  
tiis à Scorbuto oriundis magnæ quo-  
que est efficacix. Vel

*Rx. Herb. Salv,*

*Rorismarin.*

*Flor. Ros. rubr. aa. p. j.*

*Myrrh. opt. ʒij.*

*Alum. Ust. ʒj.*

*Carioph. N. vj.*

*Coq. in Vin. Gall. & aq. Cha-  
lybeat. aa. ʒijß.*

*Colat. ʒiij. add. Mell. Ros. ʒvj.*

*Spir. Cochlear. ʒj. M.*

Ad corroborandas gingivas, den-  
tesque dealbandos, Matronæ quædam  
Parisienses sequenti pulvere, ut se-  
creto utuntur.

*Rx. Off. Sep.*

*Corall.*

*Cremor. Tart.*

*Lapid. prun. aa. ʒijß.*

*Bot. Rubr.*

*Pulv. Rosar. rubr. aa. ʒj.*

*M. F. Pulvis, quo dentes quotidie fricentur.*

Præter gingivam male affectam duplici de causa Dentes cadunt: vel quod a femine (sive novo dente) dens alveolo expellatur, vel quod ob vasa sanguinea male affecta, nutrimento destitutus, decidat.

In priori casu totum opus naturæ relinquendum; In posteriori vero (quum sermoni articulando Dentes multum auxiliuntur) *Artificiales* conficere, & in deperditi dentis locum substituere, sæpius necessarium.

*Dentes  
Artificia-  
les vide  
apud  
Sculpt.  
in Aust.  
II.*

Nihil quidem frequentius, quam ex *Ebore* eosdem conficere, confectos alveolis immittere, filoque serico, aureove, vicinis dentibus adalligare. Verum quum hi brevi temporis spatio & à saliva & à cibo potuve assumpto notabili flavedine tingantur, rectius ex *Hyppopotami dente* conficiuntur, præprimis si cortex ejus exterior niveo colore superbiat. Hic enim si adfuerit, ad aliquot annos ejusmodi

modi dentes naturali albedine illibata  
semper remanente, gestare possunt.

Si omnes maxillæ inferioris Den-  
tes nullo remanente decidant, inte-  
gra Dentium series ex *frusto Eburneo*  
vel *Hyppopotami dente* conficienda  
erit, atque intra labium ita dispo-  
nenda, ut mota maxilla inferiore,  
eadem quoque moveatur, cibusque  
ore assumptus quodammodo adhuc  
comminui possit.

## EXPERIMENT. XXI.

### *De Uvæ Descensu & Resectione.*

**C**irca *Uvulæ Descensum*, ab hu-  
more crasso & pituitoso in ejus  
tubulis stagnante ortum trahentem,  
facilis & frequens occurrit Chirurgia.

Restituenda illa astringentibus  
incidentibus, obstructionesque re-  
ferantibus pulveribus, v. g. *Alumi-  
ne usto, Pipere, Zingibere, Sale  
communi & sim.* qui *Cochlearis* be-  
neficio ipsi admovendi, vel *Cochle-  
ari, Manubrio Fistuloso & exiguo*



*Folli* donato eidem aspergendi; cuius delineationem vide apud *Hildanum Cent. 2. Obs. xxi Fol 96.*

Solus quoque *Spiritus Vini* per modum gargarizationis adhibitus, uti etiam *Spiritus Salis Ammoniaci* linreis carptis relaxatæ Uvulæ aliquoties admotus, præsentaneam nonnunquam tulere open.

Verbo, quicquid pituitosum incidere, viscidum attenuare, obstructions solvere, humoribusque per hanc partem circulantibus calcar addere aptum natum est, illud hoc in affectu utramque paginam absolvet.

Verum aliquando tam pertinaces sunt obstructions, ut *Aqua Sublimata* Uvula sit tangenda.

Quæritur, An capillorum verticalium retractio in Uvula relaxata conducat? Resp. Aliquando juvenem affert, dum major eo tempore, quo retractio peragitur, spirituum copia Uvulam irradiat, unde expeditis obstructionibus Uvula relaxata restituitur.

Ubi

Ubi vero prædictis non restituitur, sed relaxata manens loquelam & deglutitionem impedit, aut Scirrhus malive moris Ulcere, vel Gangræna afficitur, sunt qui imposito supradicto Cochleari *Aureo Nummo*, sed ignito (quamvis minus convenienter) eandem adurant.

Præstabit in ejusmodi casibus eam extirpare, quod *Volsellæ & Forficis* beneficio haud difficile peragitur. Quod si patiens Operationem hanc, ob sanguinis nonnunquam subsequens profluvium, ut cruentam nimis abhorreat, extirpatio *Anulo* cum *Manubrio Cannulato & Filo* *Hildan.* adaptato facile peragitur. Instrumenti delineationem vide apud *Hildanum*, nec non *Scultetum in Arma-* *Obs pag. 96. & Scult. Tab. VIII. Fig. 7.* *mentario*, cujus ope nuper Operationem hanc cum successu institutam vidimus.

Si cui volupe fuerit Encheiresin<sup>etiam</sup> hanc minori cum apparatu absolute, *Instrumento pro Uvula abscin-* *Scultet. Aust. I. Tab I. Fig. XI. & XII.* *denda à Rustico quodam Norwego* in.

invento, à *Th. Bartholino Cent. 2. Observ. Anatom. Hist. 88.* delineato & descripto, uti potest.

Quo instrumento aliorum quoque in corpore Tumorum, Tuberculorum, Verrucarum &c. extirpatio, singulari celeritate, inscio patiente, nihilque mali cogitante, peragitur.

Si vero resecta jam Uvula immodicus sanguinis fluxus eidem superveniat, haud inconsultum erit depressa lingua, admoto *Vitriolo Cyprino* (in linguæ vinculo proposito) partem sanguinem fundentem tangere.

Possset tamen aliquando contingere, ut sanguinis impetuosior fluxus eo non sisteretur, quo in casu ad *Cauterium actuale* confugiendum putamus.

Chirurgus itaque *Fistulam Annulo munitam* ori intromittat, manu sinistra teneat, Uvulamque fistulæ foramine excipiat: dein stylo ferreo ignito fistulæ immisso Uvulam tangat & cautericet, probe cavendo, ne vicinæ partes lædantur.



Gargarismis denique convenientibus, vel *Melle Rosaceo* admotis, curatio absolvitur.

## EXPERIMENT. VII.

### *De Labio Leporino.*

**L**abium superius, (rarissime inferius) nonnunquam ita fissum apparet, ut haud obscure *labium leporinum* repræsentet affectus, qui manum Chirurgicam sæpe etiam requirit.

Antequam autem hanc Operationem suscipiamus, attendendum primario examinandumque, utrum labium uno tantum, an duobus in locis sit fissum: an fissura magna vel parva; an divisum conspiciatur palatum; an gingiva tumore aliquo, vel cartilagine, vel exostosi sit obsessa: an dentes promineant aut obsint: an pateriens sit infans, puer, aut, adultus (in his enim non facile tentanda est Operatio) an denique corpus bene aut male dispositum; quibus ad

E 5                      ratio.

rationis trutinam rite ponderatis ,  
utrum malum curabile sit , nec ne,  
facile concludi poterit.

Si in infante labium simpliciter fissum occurrat , sequenti methodo procedendum. Ligatis infantis manibus pedibusque , ministrorum alter sedili insidens firmiter eum teneat, alterque ejus caput quantum possibile immobile servet. Chirurgus interim diductis ab invicem labiis , partem labii superiorem interioremque adhuc integram , à connata maxilla superiori , cultello separet , quo hiatus integre expleri , labiaque eo rectius extendi possint.

Hisce peractis , statim fissuræ margines callosa superficie quodammodo induratos , acutiori forfice , loco attramento prius notato , resecando cruentos reddat : dein interposito plumaceolo , ut gingiva jam separata denuo coalescat , tres *acus argenteas* , *vel chalybeas* unam post alteram , à parte superiori incipiendo , per labium divisum traducat , genis-

que

que compressis (quod commodè  
 servo caput tenente peragitur) labia  
 cruenta ita adaptet, ut filum circa  
 easdem sæpius glomeratum, eadem  
 adducta in hoc statu servet; Hocque  
 felicius succedit, si *laminis plum-*<sup>Vide</sup>  
*beis* orbicularibus perforatis labio-<sup>Schult.</sup>  
 rum latera magis comprimantur. Mox<sup>Append.</sup>  
 resectis acuum extremitatibus, fila<sup>Tab.</sup>  
<sup>XXI.</sup>  
 liquore balsamico v. g. *Bals. Copayv.*  
 vel *Unguen. Arcæi* humectanda, qui-  
 bus *plumaceolum* eodem balsamo ir-  
 roratum superimponendum, hisce  
 insuper *Emplastrum glutinosum* ab  
 una parte malæ ad oppositam sese  
 extendens, applicandum, quo genæ  
 rectius adducantur: denique *compres-*  
*sula* ad formam nasi accommodata  
 fasciæ ope alliganda.

Interne labium *Syrup. de Symply.*  
*Fernelii*, aut *Violaceo* obliniri po-  
 test, cavendumque quantum possibi-  
 le ne plorando, sternutando, cibos  
 quoque duriores comminuendo, labia  
 quodammodo diducantur, quod *Cu-*  
*cupha ænea*, extremitatibus suis ge-



Cocu-  
pham  
vid. a-  
pud  
Sculpt. in  
Auct. II.

nas comprimente , vel *Spleniis* è charta tabellata compositis , nonnunquam præpediri potest.

Sequenti ab Operatione die obligatio maneat , necesse est. Tertio vero die aliqualis fiat deligationis solutio ; tollendo ea , quæ externe filis fuere applicata ; mediæ interim *Acus* vinculum tantillum relaxerur , (uti etiam cum reliquis aliquando procedendum) ne fortiori filorum constrictione ulcera oriantur.

Quarto die media *Acus* extrahenda , reliquarumque Fila magis solvenda. Quinto sæpe acuum superior tuto extrahitur ; & sexto septimove inferior sive ultima ; quibus sublati , applicato Emplastro cicatricante una cum Fascia , facillime restituitur patiens.

Sunt qui *Unguentis* , secundo post partum die impositis , Labia Leporina in infantibus restituere satagunt , sed , nostro judicio , male procedunt.

*H. Roonhuysen* varia , quæ Labia Leporina spectant , scitu necessaria

in suis Operationibus Chirurgicis *Vid. Lib. II. part. 2. Obs. 4 5. & seqq.*  
 communicat, quibus curiosus Lector  
 carere vix potest.

## EXPERIMENT. XXIII.

### *De Linguae Vinculo nimis stricto.*

In nonnullis infantibus Linguae Vinculum adeo strictum existit, ut nec libera premendo lac fugere, nec ad majorem ætatem provecti, articulate loqui possint, nisi Chirurgica manus huic malo opem tulerit.

Non tamen ita temere, quemadmodum communiter fieri solet, hic procedendum arbitramur; quoniam adeo vulgaris hic affectus non est, quam quidem vulgus credit, quod imprudenter nimis vinculum naturaliter sæpe dispositum, non raro discindendum cupit. Omnium vero maxime culpandæ veniunt obstetrices illæ, quæ pollicis aut digiti unguibus frænulum dilacerant.

Indicium autem est, Operationem hanc esse necessariam, si infans ultra  
 den-

dentes & labia linguam exserere nequeat, vinculumque versus dentes incisores solito quidem magis prolongatum, sed contractum conspiciatur.

Iunc itaque Chirurgus sinistra linguam exsertam teneat, alteraque manu transverso vulnere vinculi hujus portionem forcicis ope incidat: dein *Melle Rosaceo* aliquoties de die partem læsam inungat.

Cavendum interim probe, ne ad candelæ lucem sectio instituatur, nec vas arteriosum aut nervosum aliquod lædatur, seu Ductus Salivales inferiores dissecentur, ne hæmorrhagia & doloribus infans pereat, aut molestissimo ptyalismo, nulla arte restituendo, tenellus patiens afficiatur.

Si vero forte contingat, vas aliquod sanguineum læsum, copiosum sanguinem exspuere, hæmorrhagia talis alioquin satis periculosa, nullo medicamento rectius compescitur, quam admoto *Penicillo Vitrioli Ungarici* particula instructo.

Quod si vinculum breve admodum,



Hum, tensum, crassiusculum, aut carnosum fuerit, temere, nec sine periculo sectio instituitur.

## EXPERIMENT. XXIV.

### *De Arteriotomia.*

**V**eteres in Cephalalgia, Mania, Epilepsia, Oculorum Aurium-que gravi Inflammatione, Arteriarum Sectiones instituere solebant. Verum jam temporis exautorata fere est hæc Operatio, rariusque inter Neotericos occurrunt, qui Arteriotomiam instituendam suadent, eam potius tum ob maiorem hæmorrhagiæ, tum Aneurismatis metum, ex foro Chirurgico prorsus eliminandam, statuentes.

Non tamen deficiunt Practici & Chirurghi, Operationem hanc, tuto & summo cum successu, institui posse sibi persuadentes.

Sequenti autem methodo procedendum volunt: Supra temporalem musculum, pone aurem, arterias decur-

currentes Spongia aqua calente imbuta (abrato primum capillitio) foveant, ægrique collum lintheamine aut mappa constringunt, ut ita intumescens arteria magis in conspectum veniat, & atramento notata felicius incidi possit.

Si vero nondum satis in conspectum prodit arteria, aut astrictio talis patienti nimis molesta, sub axillis ligaturam injiciendam volunt.

Verum enim vero (salvo illorum honore) concipere non possumus, quid ligaturæ illæ heic loci præstare possint, dum sanguinis motui contrariantur.

Infra partem quippe incidendam, ligaturæ injectio, præsertim sub axillis, arteriarum temporalium intumescentiam causari nequit.

Non quidem negamus venis jugularibus constrictis arterias temporales, (quamvis rarius) intumescere; hoc vero solummodo accidentaliter contingit, quatenus sanguini per venas jugulares, à capite versus cor.

refluenti, via præcluditur, unde arteriarum latera paulo magis necessario distenduntur. Qua de causa colli constrictio aliquo modo concedi posset.

Verum cum sanguinis arteriosi motus adeo sit impetuofus, ut vel minimum vulnus copiosum sanguinem expuat, prædictas partes ligaturis constringere, neccssum non judicamus.

Locum itaque pulsu sese satis manifestantem, ac (uti dictum) atramento notatum, lenta fortique manu incidunt, sanguinisque sufficientem quantitatem extrahunt: quibus peractis (arteria prius infra incisionem digito compressa) Pulverem astringentem vulneri inspergunt. Vel Emplastrum Mastiche obductum, vel sequens calide imponunt.

*Rx. Mastich. Sang. Dracon. aa. ʒij.*

*Bol. Armen. ʒijß.*

*Alb. Ov. q. s. F. Emplastrum.*

Mox compressulam minorem, dein majorem, tandemque maximam, ali-



*Fascia-* quando *plumbi laminam* imponunt,  
*eionem* fasciamque, *nodulis* aliquot com-  
*vid. apud* pressulas comprimentibus donatam,  
*J. van* superinjiciunt.  
*Mekeren*

*Cap.*

xxxv.

*& Scult.*

*App. Tab.*

xviii.

*Fig. 2.*

Cavendum interim ne nimia con-  
 strictione subsequens aliquando *En-*  
*chymosis* superveniat.

Hiscæ peractis per biduum partem  
 vulneratam obligatam sinunt, tertio  
 vero die deligationis solutionem in-  
 stituunt, ea tamen lege, ut, remo-  
 to jam Emplastro, obligatio de no-  
 vo, ut ante, sed paulo laxior, institu-  
 atur, quarto denique quintove die  
 admota tuto removeri posse censent.

## EXPERIMENT. XXV.

### *De Bronchotomia.*

**I**n quibusdam Anginæ speciebus,  
 post interna & externa incassum  
 tentata remedia, adeo sæpe tuba  
 respiratoria angustatur, ut patiens  
 spiritum ducere nequeat, sed suf-  
 focationis periculum incurrat, nisi  
 Bronchotomia (nonnullis Laryn-  
 go

gotomia dicta) instituat. Quæ Operatio hæc tamen fere neglecta, aliquando tamen summe necessaria; præstat enim anceps quam nullum adhibere remedium. Hac siquidem Operatione omissa, mortem auferre patiens nullo modo posset, quum e contrario Operatione hac prudenter instituta, nonnullos subinde fuisse restitutos experientia sit manifestum.

Urgente itaque necessitate, sequenti methodo procedere licebit: Servus à tergo patientis in sedili collocati caput, scapulam versus reflexum, immobile teneat, cutimque atramento prius notatam, sinistra Chirurgus, & dextra famulorum alter eleve, elevatamque incidat. Facta incisione, separatisque tantillum *musculis sternohyoidæis*, diductisque digitorum ope integumentis, intra tertiam & quartam, vel quartam & quintam cartilaginem, vulnus infligat, quo inflictæ aër statim impetuosè exit, patiensque levamen aliquod

*Tabulum percipit; mox Tubulum aureum aut  
&c. argenteum vel plumbeum lævem & in  
vide apud extremitate rotundum, leviterque in-  
Sculpt. in curvum, variis foraminibus perfora-  
App. Tab. tum & alatum, foramini facto immit-  
XXIV. tat; immissus Emplastro Glutinoso &  
Fig. I. perforato affigatur, ibidemque tam-  
diu maneat, donec patiens via ordina-  
ria spiritum iterum ducere poterit.*

Postmodum ad partis læsæ conso-  
lidationem perveniendum, vulnus-  
que asperæ arteriæ, si multum hiet,  
*Sutura* quadam adducendum, caput-  
que magis pronum gestandum, quo  
cartilaginum latera eo propius ad se  
invicem accedant.

Cavendum interim ne humida aut  
oleosa admota vulnus inter cartila-  
gineum subintrent, quia facile nova  
inde oriri possent Symptomata.

Medicamentum denique, parti car-  
tilagineæ applicandum, ex *Balsam.  
Copayv. Hypericon. & Oleo Tere-  
binth.* componatur, vulnerisque re-  
liquum ordinariis consolidantibus,  
vel sequenti unguento ad cicatricem  
perducatur.



℞. *Terebintb lotæ* 3v.*Pulv. Mastich.* 3j.*Alb. Ov. Vitel. permixt. q. s. F.**Ung.*

## EXPERIMENT. XXVI.

*De Colli incurvati restitutione.*

**I**nter musculos caput flectentes, speciatim aliquando afficitur musculus *Mastoides*, qui relaxatus, aut convulsione aut paralyfi laborans, ab antagonista extenditur, & contractione sua caput versus alterum latus tantopere contrahit, ut collo incurvato incedere necesse habeat patiens.

Principiis itaque obstandum, & medicamenta non tantum musculo contrahenti (qui proprie non laborat) sed & relaxato applicanda. Præprimis conducunt Emollientia, & fibras nimium tensas relaxantia: E. G. *Ol. Violar. Lumbricor. de Later. Vulpin. Axung. Human. Vel*

℞. *Ol. Amyg. d. Lumbric. aa.* 3j.*Axung. human.* 3iij.*Ung. Alb.* 3℞.

*Theriac.* ʒj.*Sal. Card. Bened.* ʒʒ.*Caph. gr.* xij.*M. F. Linimentum.* Vel*R. Ol. Chamomill.**Rut. aa.* ʒvj.*Nardin.**Aneth. aa.* ʒʒ.*Spir. Vin.* ʒiij.*M. F. Linimentum.*

*Instru-*  
*menti hu-*  
*jus delin.*  
*vid. in-*  
*fra. post*  
*Indicem*  
*Fig. VI.*

Hisce vel similibus pars non tantum contracta, sed & relaxata bis quotidie illinatur, dein ter quaterve singulis diebus, ex instrumento *Torques* dicto, quadrantis horæ spatio suspendatur patiens; quibus tamdiu continuandum, donec ejus caput pristino iterum statui fuerit restitutum.

Verum aliquando hoc malum tam altas egit radices, ut propter summam musculi contractionem & durtiem hac methodo restitui plane non possit; Hinc manus Chirurgica summo opere necessaria, quæ elevato patientis mento & collo, tendinolam musculi Mastoidæi partem (qua cum

cla-

clavicula conjuncta perſentitur) arripiat, eamque, ſi poſſibile, unica incifione cultello falcato præſcindat; & ſi plures partes tendinoſæ hujus muſculi impedimento fuerint, eaſdem itidem diſſecet.

Hæmorrhagia ſi ſuperveniat, ea ſiſtenda, vulnuſque deinceps hians plumaceolis *Baſamo de Copayv. & Hy-* <sup>Vid.</sup>  
*per. aa. q. ſ.* irroratis, adimplendum, <sup>Roombuy-</sup>  
 curandumque ut ampla generetur ci- <sup>ſen part. 1.</sup>  
 catrix, quod facile ſperandum, ſi inter <sup>p. 88. &</sup>  
 curandum caput ligula aliqua verſus <sup>ſeq. Van</sup>  
 oppoſitum latus inclinatum ſervetur. <sup>Mekeren</sup>  
 Cap. xxx.

Notandum, hoc in caſu longe aliter procedendum eſſe; ac cum aliis vulneribus, quorum labia adducenda, hic vero eadem, quantum poſſibile, deducenda veniunt.

Aliis hæc Operatio, ut crudelior, diſplicet, & Cauterium Potentiale tendinoſæ dicti muſculi parti applicare malunt, quod ſeparata jam eſchara, muſculi unionem cum clavicula diſnecteret; Verum moleſtiſſimam talem, & ob ſummos dolores, con-



vulsionemque periculosissimam fuisse curationem, experientia docuit.

Quidnam autem de ejusmodi cauteriis sit judicandum, & quibus in locis convenient, infra *Exper. de Abscessuum Apertione* notabimus.

## EXPERIMENT. XXVII.

### *De Venæ-Sectione, & Punctura Nervi.*

**V**enæsectio, communissima quamvis Operatio, magnamque industriam requirere non videatur, Artifici tamen, licet experto, multum aliquando faceffit negotii, & patienti non raro dolorifica esse solet. In corporibus enim obesis, quorum vasa exigua admodum, multaue pinguedine obvoluta, vix oculis venæ dignoscuntur.

Ligatura itaque nec arcte nimis, neque nimis laxè injecta, brachioque manu calente fricta, circa cubiti flexuram talumque. Vena (obscure quamvis in conspectum prodeat)

quan-

quanta fieri potest circumſpectione ſecanda. Si vero non occurrat vena, ſed in pinguedine abſcondita lateat, eam cæco impetu ſecare non licebit, ſed alibi in manu vel pede vena quærenda, ne Chirurghi imprudentia vas vicinum, aut arterioſum, aut nervoſum, lædatur.

Si ob mobilitatem ſuam *Lanceolæ* aciei cedat vena, alia quædam ligatura infra vulnus infligendum erit injicienda. Eodem modo procedendum, ſi ob profundiorẽ venæ ſitum, inflictum vulnus vulneri cutaneo non reſpondeat: hocque malum facilius evitari poteſt, ſi ſecta vena extrahendæ *Lanceolæ* mucronem Chirurgus attollat, vulnuſque cutis hoc modo dilatet, & amplius red-  
 dat; potiffimum ſi ſectio non rectilinea, ſed obliqua, quæ ubique præſtat, inſtituatur.

*Methodum inſtituendi vid. apud Scult in App. Tab. XXVIII.*

Inter Venas ſecandas occurrit *Primo Frontis, Secundo Raninæ* dictæ, quarum Sectiones uti minus neceſſariæ, ſic etiam non ſatis tuto

instituuntur. Si cui tamen volupe fuerit eas secare, collum circumjecta mappa ex linteo confecta tantillum constringat, quo constricto dictum factum venæ distinctius apparent, & facilius inciduntur.

*Tertio* occurrunt *Venæ jugulares externæ*, quas, si ullam in toto corpore, tuto secare licebit; quia neque nervi punctura, neque tendinum arteriarumque læsio hic metuenda. Quod autem dicant ab ejus Sectione nuper quendam fuisse extinctum, falsissimum credo, illudque non hujus Sectioni, sed Symptomatibus aliis adscribendum puto, cum tutissime has incidi posse expertus noverim.

*Quarto* vulgatissimæ occurrunt Sectiones venarum brachii, *Cephalicæ*, scilicet, *Basilicæ* & *Medianæ*, Veteribus ita vocatæ, quod peculiaribus partibus destinatas crederent. Verum invento circulari sanguinis motu hæc opinio expiravit. Ex his autem tribus *Cephalica* tutius inciditur, dein *Ba-*  
si-



filica, sed minus tuto Mediana, propter subjectum sæpe nervum, aut arteriam, aut musculi *Bicipitis* partem tendinosam. Hoc tamen semper non est metuendum, sæpe enim eadem sine ullo plane periculo secatur, quod situs ejus tendinis, arteriæque aliquando profundior, & nervi cursus tantillum aberret.

*Quinto* sequuntur Sectiones venarum in manu & pede, *Salvatellæ* & *Saphænæ* dictæ, quæ necessitate illud exigente circumspicte incidendæ. Quod si *Saphæna* incidi debeat pes in aquam calentem prius immergatur: quod in Sectione *Salvatellæ* sæpius quoque necessarium.

Dum vena inciditur non raro Nervus vel Tendo punctus, doloris, pulsationis, inflammationis, convulsionis vel Spasmi causa existit. In dolore convenit Pulvicula supra præscripta ex *Mica Panis albi*, *Croco*, *Lacte*, &c. Vulneri instillantur calide sequentia:

℞. *Ol. Thereb.*

*Hy.*

*Hyperic. aa.* 3vj.*M.*Vel, ℞. *Ol. Ceræ* 3j.*Hyper.**Spir. Vin. aa.* 3℔.*Euphorb.* 3j℔.*M.*Vel, ℞. *Thereb.* 3j.*Ol. Cer.* 3ij.*Vitell. Ov. N.* j.*Mell.* 3℔.*M.*

Ut autem hæc intimius penetrent, linteum carptum oleo dicto madidum admovendum, spatulaque ferrea ignita tamdiu comprimendum, quamdiu patiens id ferre poterit.

Seçta vena aliquando sanguinis extravasati portio, in partibus cutaneis vicinis hærens (*Enchymosis dicta*) maculas livescentes aut flavi coloris inducit, vel nodulus ab humore viscoso productus, post V. S. remanet: quorum curatio haud difficile absolvitur sequentibus:

℞. *Spir. Vin.* 3ij.*Sal.*

*Sal. Armon. ʒß.**M.**Vel, R. Spir. Vin ʒiß.**Sal. Vol. oleos. ʒij.**Succ. Absint. ʒß.**M. & plumaceolis aut linteis**Ter de die applicentur.*

## EXPERIMENT. XXVIII.

*De Vulneribus Vasorum Lymphaticorum.*

**P**ræter incommoda Venæsectioni supervenientia, & passim obvia, Vasorum quoque Lymphaticorum Vulnera, toties à Chirurgis, in arte coerceroquin peritissimis, Venæsectionis occasione læsorum, examinanda erant.

Instituta enim Venæsectione, præsertim in brachii flexura, lymphæ aliquod, non raro remanere solet stillicidium, à Vase Lymphatico vulnerato causatum, quod omnibus fere Chirurgis, Anatomen & Vasorum Lymphaticorum cursum nescientibus,



bus, magnam creavit molestiam, idque non tantum in dicta flexura, verum etiam in pede observatur, ubi *Saphænæ* sectio instituitur, nec non in multis aliis corporis partibus, quæ dum vel punctim, vel cæsim, vel quovis alio modo læduntur, lympham sæpe copiosissimam expuunt.

Reliqua ut præteream, illa solummodo notabo, quæ in brachii occurrunt flexura, nec non venæ *Saphænæ*, quæ socia sunt lymphatica. Ab extremitatibus enim digitorum tam manuum quam pedum vascula hæc exeuntia, in duos tresve abeunt ductus lymphaticos, hederæ in modum, vel etiam rectilineo attactu per latera venarum *Cephalicæ* & *Saphænæ* assurgentes, metam, alio loco examinandam, attingunt.

*Vasor.  
delin.*

*vid. Infra post  
Indic.*

*Fig. VII.*

*& VIII.*

Hæc autem ut distinctius occurrant, vasorem jam memoratorum delineationem, in calce subjungere perquam necessarium duxi.

Si jam forte contingat (quod Chirurgus etiam dexterrimus evitare sæpius

bis non poterit) præter venam sectam, simul Vas Lymphaticum esse incisum, omni ope curandum, ut quam citissime fieri potest, non modo venæ sectæ, sed & Vasis Lymphatici læsi vulnus claudatur.

Nihil jam dicam de iis, quæ alii communiter hoc in casu commendare solent, quæque rarius ejusmodi vulnera, nisi summa cum molestia restituunt; suffecerit indicasse, lymphæ istiusmodi stillicidium haud difficile curari, si quam primum parti læsæ sequentis pulveris portiuncula aspergatur.

℞. *Bol. Armen.* ʒj.

*Nuc. Cypr.* ʒiʒ.

*Sang. Dracon.*

*Sem. Hyper. aa.* gr. xv.

*M. F. Pulvis.*

Mox vulnusculum compressula liquore styptico irrorata, fasciæ ope comprimatur. Neque hoc sufficeret, nisi & altera compressa eodem liquore madida, & infra partem vulneratam locata, eadem fascia fortius constrin-

stringatur, ut hoc modo vale lymphatico compresso, lymphæ per aliud vas lymphaticum viam sibi quærendo, motum suum absolvat.

Hæc observatio non tantum circa Vasa Lymphatica jam proposita locum habet, verum etiam circa alios lymphæ ductus, aliis in partibus occurrentes, de quibus hoc loco studio nihil dicam.

Si vero hisce stillicidium non cedat, ad Cauterii Actualis applicationem confugiendum erit, quo solo ejusmodi vulnus subinde fuisse curatum experientia docet.

## EXPERIMENT. XXIX.

### *De Aneurismate.*

**A** Venæ sectione in brachio male administrata, aliquando arteriæ læsæ signa se produnt; tumor videlicet quidam principio exiguus, sensim tamen incrementum sumens, *Aneurisma* Chirurgis vocatus, in conspectum venit.



Verum ut affectus hujus vera constitutio melius innotescat, distinguendum *Aneurisma* erit in *Verum*, & *Spurium*; per *Verum* intelligimus arteriosum vas ita dilatatum, ut sacciforme reddatur, remanente tamen orificio tam superiori quam inferiori aperto, ut sanguinem in motu constitutum quodammodo transmittere possit.

Hinc pulsatio ut plurimum manifesta percipitur, cuius color naturali similis apparet, manu pressus tumor lenim diminutus evanescit, sed remota eadem, statim redit.

An vero hoc in casu, arteriæ tunicae vel interiores, vel exteriores, à materia quadam acri sint exesæ (ut hoc modo tunica vel interior vel exterior à pressione sanguinis extendatur, uti passim Chirurghi statuunt) merito dubitamus; Experientia interim edocti, rectius statuimus, arteriam hanc sacciformem non ab anteriori solum, sed à posteriori quoque parte fore extensam, nisi ossa prop-

ter duritiem suam illud impedirent.

Quod enim versus exteriora magis propullulat, illud minori hoc in loco partium circumambientium renitentiae adscribendum erit.

*Aneurisma Spurium* causam agnoscit vas arteriosum, Venæ Sectione, corrosione vel alia quavis occasione ita læsum, ut sanguinis aliquot particulæ per tunicas læsas exeuntes, inter partes musculosas, vel has inter & integumenta hærendo, tumorem exhibeant, frequenter durum admodum, cum arteriæ pulsu, aut obscuro, aut aliquando plane deficiente: cutis livore notabili sæpe conspicua. Tumor hic planiformis magis apparet, sed elevatus minus & tactui vix cedens, uti in *Aneurismate* vero observatur.

Malum hoc, ubi recens adhuc & in principio, Medicamentis Astringentibus, Fasciis idoneis, nec non Lamina Plumbea fortiter parti affectæ alligata, Chirurgiæ cultores interdum superare solent.

Ubi

Uhi vero notabile jam fumsit incrementum, & operationem ipse patiens defiderat, fequenti modo procedendum cenfemus.

Venæ Sectione pridie instituta, ægroque bene locato, miniftrorum unus arteriam fupra tumorem vinculo vel ligamine, quo pro lubitu arteriam hanc magis, minusve comprimere valet (Galli *un Tourniquet*, noftrates *Torcular* vocant) constringit; mox Chirurgus tumorem lanceola fimilipiane modo quo abfcelfus aperiuntur, incidit, incipiendo à parte inferiori verfus fuperiorem: Aperto tumore, fanguineque coagulato expreffo atque eruto, nervus ab arteria, quacum firmiter jungitur, prudentia fingulari feparandus, vafque arteriofum filo duplicato, cera obducto, & per acum incurvatam trajecto, probe ligandum.

Facta jam ligatura, fanguine & fordibus vacuus locus linteis carptis, liquore ftyptico imbutis, vel pulvere aftringenti, vel fungo *Bovift* a-

*Inſtrumentis de-*  
*lin. vide*  
*infra poſt*  
*Indic.*  
*Fig. IX.*

spersis , adimplendus ; impositoque Emplastro una cum Defensivo , Fasciatio conveniens instituenda.

Secundo vel tertio post Operationem die fasciationis fiat deligatio , majorque plumaceolorum pars removeatur , relictis tantum iis , qui in fundo locati erant , ne nova hæmorrhagia curam interrumpat ; mox applicatis applicandis , fasciatio ut ante , administretur.

Quarto , quintove die ea quoque astringentia , quæ hætenus in fundo hædere , removeare licebit , curandumque porro , ut Sarcoticis medicamentis excavatus locus nova carne adimpleatur.

Interim ut brachium convenientem obtineat situm , (quem nonnulli non satis curant) probe observandum ; Necessum enim , ut quodammodo plicatum cum manu elevata supra pulvinar quiescat , ut eo liberior sanguinis fiat circuitus. Præterea maximopere consultum , injungere patienti , interdum , sed prudenter ,  
bra-



brachium cubitumque flectat.

Hæcce autem dicta funto de Aneurismate brachii, reliquis enim in partibus (in quibus etiam, quamvis rarius occurrunt) vel nunquam, vel majori cum periculo Operatio instituitur.

## EXPERIMENT. XXX.

### *De Extirpatione Mammæ.*

**G**landulosa mammarum foeminei sexus substantia non raro malam, *Cancer* dictum, incurrit; qui nihil aliud est, quam tumor durus, dolorificus, livido aut plumbeo colore præditus.

Dum enim lac in mammis contentum intestinum particularum suarum patitur motum atque fermentationem (Belg. eleganter *een Broeijing* vocatam) particulæ subtiliores fugam capeffunt, crassioribus in mammarum tubulis remanentibus, obstructionesque causantibus. Cum vero crassior hic & viscidior succus

lacteus in tubulis suis hærens continuo ab advecto recens lacte prematur, vasa sua dilatando, & in majorem molem extendendo, tumorem oculis conspiciendum præbet.

Quod si adhuc illa pressio instet, particulæque stagnantes mora sua acriores reddantur, & à materia subtili usque & usque inter se agitentur, tubulorum tandem, quibus incarcerati tenebantur, parietes rumpunt, frangunt & discerpunt, sicque non raro tumorem in ulcus transmutant.

Interdum quoque tumor iste cancrusus occultus est, subinde manifestus: sæpe mobilis, aliquando pectorali musculo firmiter annexus: Pleurumque simplex, nonnunquam triplex vel quadruplex: Quandoque cum glandulis axillaribus, eodem malo affectis, commercium habet.

Inter medicamenta externe admota hætenus nulla vidi, quæ Cancrum curarunt, sive illa ex *Solano*, *Ranis*, *Succo Cancrorum*, *Plumbo*, similibusque fuerint parata: Nec magna-

gnarum etiam virium est *Emplastrum Ireatum* dictum. Ad cancrum ulceratum tamen medicamenta occurrunt, quæ malum refrænare, & ulteriorem progressum ad multos sæpe annos inhibere valent.

An *Limaces* magnæ & rubicundæ ulcerato cancro admotæ, cancri venenum assumere valeant, (quemadmodum nonnulli volunt) vix aliquam fidem meretur.

Quamvis autem medicamenta cancrum penitus debellare nequeant, non tamen ad Operationem sive mammæ extirpationem nimis temere progrediendum esse existimamus. Chirurgia enim, quæ admiranda hic interdum præstat, sæpius admodum periculosa est.

*Quibus, inquit Hippoc. sunt occulti cancri, eos præstat non curare; curati namque citius intereunt, quam non curati.* Quam sæpe enim sublato tumore recrudescent malum cum majori & tumore & dolore iterum propullulat, Labia ulceris callo-

fa, inæqualia, plumbea, & inverfa apparent? idque pro varia humoris peccantis natura.

De Ope- Ubi tamen Operatio necessaria  
rat. vid judicatur, fequenti modo procedat  
Sculs. in Chirurgus: trajiciantur per mam-  
Arm. millæ tumorem, crucis in modum,  
Fig. 1. duæ Acus filis five ligulis instructæ:  
II. III. Tum filorum extremitates compo-  
sitæ retrahantur, ut mamma eo magis à  
pectorali musculo recedat; Mox alte-  
ra manu *cultro falcato* cutis circum-  
ferentia ad mammæ basin discinda-  
tur, & à vicinis partibus separetur,  
quodque ab exercitato Chirurgo una  
aut altera incisura absolvitur.

Cultrum  
& Bi-  
dentem  
vid. apud  
Solingen  
Tab. v  
Fig. 7. 8.

Alii *Bidente* majori utuntur, cum Manubrio robustiori, cujus dentes mammillæ infigunt, atque trajiciunt, trajectas attollunt, ut cultro, eo quo jam dictum est modo, extirpatio fiat.

Facta jam extirpatione admo-  
venda erunt medicamenta sanguinem si-  
stentia; vel (uti quibusdam in more  
positum est) Actuali Cauterio vasa  
sanguinem fundentia leniter adaren-  
da,



da, parsque usta plumaceolis cum pulvere astringenti tegenda, quibus Emplastrum superimponendum, & tandem compressa una atque altera, cum *Fascia Scapulari* agmen claudat.

Sunt, quibus hæc methodus displicet, & à parte antica tumorem in crucis formam incidendum suadent, mox glandosum corpus induratum separant à remanente cute. Hoc enim modo partis hujus nimiam deformitatem præcaveri, aëremque circumambientem minus nocere posse volunt.

Nos vero modum hunc improbamus, quod multum temporis ad Operationem illam absolvendam requiratur, dum interea patiens præ nimio dolore Operationem ferre non posset. Aëris vero incommoda facile averti possunt, & deformitatem hoc in casu parum curaret patiens.

Si tota Mammilla tumore non est obfessa, inutile foret integram extirpare, sed partem solummodo affectam auferre suffecerit: quo facto,

106    E X P E R I M E N T A  
medicamenta styptica &c. admove-  
antur.

Ubi tumor cancrusus ita se extendit, ut partes quoque vicinæ, potissimum glandulæ axillares male afficiantur, nunquam Extirpatio erit instituenda.

## EXPERIMENT. XXXI.

### *De Paracentesi Thoracis.*

**I**n Abdomine pariter atque Thorace Chirurgia, *Paracentesis* dicta, occurrit; Estque vulnusculum vel Abdomini (de quo in sequentibus) vel Thoraci, in regione intercostali inflictum, per quod vel sanguis, vel aqua, vel materia purulenta extra vasa fluctuans, partesque alias Thoraci inclusas inficiens, extrahi potest.

Collecti vero puris signa manifestari solent ex difficili respiratione, anhelitu foetente, gravitate in pectore percepta, tussi sicca & molesta, febris continua, post sumptum cibum

zibum aut circa vesperam ingravescente, sudore copioso, somno interrupto, apperitu prostrato, corporis emaciatione, &c.

Interea de latere affecto certos nos esse oportet, quod tum ex calore, dolore & ponderis sensu dignoscitur; ubi enim in latus sanum se convertit æger, pondus supra mediastinum delabi sentit. Præterea linteamen madidum pectori impositum citius exsiccat ea parte, qua latus affectum tangit, quod etiam non raro intumescere solet.

In *Pectoris Hydrope* eadem signa sæpius observamus, quibus accedit, quod dum sese de latere in latus convertit patiens, aquæ fluctuationem distinctius percipiat.

Si vero sanguinis extravasati copia pectori includitur, ex difficili respiratione, lateris affecti distensione, & prægresso vulnere manifestum evadit.

*Locus* interim incidendus accurate notandus venit, quem aliqui in  
ster-

sterno ponunt, quodque haud difficulter ope Trepani perforant; sed evacuatio non ita facile procedit, quod materia in Thorace congesta à foramine facto nimis sit remota, & si acrior fuerit, spongiosa sterni substantia facile cariem conciperet.

Alii in ipsis costis, sequentes ob rationes, perforationem hanc instituendam volunt: quia videlicet.

1. Nec muscoli, nec vasa inde læduntur.
2. Labia vulneris non collabuntur.
3. Commodius turunda immittitur, & plumaceolum applicatur.
4. Pus crassiusculum per foramen stabile melius exit.
5. Quies partis curationem promovet.

Quæ argumenta contemnenda sane non forent, nisi cariei ossis ut & vasorum intercostalium, quæ facile læduntur, vulneris metus adesset; spatiumque præterea costæ nimis angustum, Operationem hoc in loco dissuadere videretur; in Hydro-



Brope tamen Pectoris locum habere posset.

Qui in loco aliquo intercostali incisionem faciendam præferunt, in spatium illud, quod inter quartam & quintam costam, à spuria costa inferiore numerationis initium faciendo, occurrit, incidere solent.

Loco autem notato, ad latitudinis distantiam præprimis attendendum, non enim nimis versus dorsi spinam apertura facienda, quod muscolum Sacrolumbi, Longissimi dorsi, & Semispinati crassities, tendinum multitudo, vasorumque sanguineorum cursus illud non permittant. Si vero nimis sternum versus Thorax inciditur, diaphragma, cujus situs hoc in loco acclivior, facile læditur, difficiliorque materia collecta, posteriora versus magis hærens expurgatur.

Hunc in finem filo metiri solent spatium inter mucronatam cartilagineam, & posteriores spinæ processus: filum dein in tres partes dividunt, ubi vero duæ tertiæ filii partes (si à ster-

no incipiamus , & una tertia si à spina ) pertingunt , ibidem verum locum assignari volunt.

Verum locus incidendus hac methodo minus recte invenitur , quia in aliis pectus magis elevatum , in aliis complanatum magis conspicitur.

Convenientius itaque certiusque locus ad latitudinem sex digitorum transversorum , à processu spinæ posteriori numerando , notatur , ibidemque Operatio instituitur , si in subjecto fuerit adulto. Si vero in corpore tenello , juniore , aut minoris staturæ , subjecti ratio habenda erit , locusque tantillum mutari , nec eo usque à spina remotus notari debet.

Non tamen ubique certus servandus locus , sæpe enim contingit , loco magis versus superiora , inferiora , aut posteriora Tumorem quendam conspici , qui digito quasi demonstrat , hunc & non alium eligendum esse locum.

Operandi modus triplici instituitur methodo : *Canterio* scilicet a-

*tuali, potentiâli vel incisione.* Qui autem Cauteriis peragi solet, jam plane in defuetudinem venit, solam incisionem reliquis præferunt, quæ tutius, citius & commodius Operatio absolvitur.

Loco atramento prius notato, longior exspiratio patienti commendatur, quo tempore oblique secundum ductum fibrarum musculorum intercostalium internorum cultelli ope (cujus portio linteamine sit involuta ne ulterius quam par est intromittatur) foramen conficitur, cavendo ne vasa intercostalia lædantur. Quo facto, cannula aut plumbea aut argentea immittitur, per quam quotidie  $\text{ʒij}$ ,  $\text{ij}$ . aut  $\text{iv}$ . extrahuntur.

Prout autem materia crassior tenuiorque existit, dictum foramen vel majus, vel minus facere oportet, sic quoque in Thoracis Hydrope, ob facilem aquarum exitum, exiguum solummodo esse debet.

Aliquando materia præ nimia crassitie exire sponte non potest, quo in

casu patiens tussiat, & in partem  
læsam se convertat. Quod si tamen  
materia majori visciditate prædita  
prodire nolit, Syringæ beneficio *In-*  
*fusum Herbae Thee* vulneri injiciatur,  
vel sequens,

℞. *Seri Lact.* ℥j.

*Mell. Rosat.* ℥iij.

*Succ. Chelid.* ℥j.

*M. F. Injectio.*

Vel ℞. *Rad. Consol. maj.* ℥ij.

*Herb Absinth.*

*Card. Ben. aa.* M. i℥.

*Flor. Ros. rubr.* Mj.

*Sem. Sumach.* ℥iij.

*Coq. ex Vin. rubr. Gall & Aq.*

*comm. aa. q. s. ℥xxx.*

*Add.*

*Mell. Rosat.* ℥iij.

*Myrrh.*

*Aloes aa.* ℥i℥

*M. F. Injectio.*

Quibus medicamentis materia  
crassa non tantum fluidior redditur,  
sed & putredo abarcetur.

Aliquando stylum excavatum vul-



peri intromittere summe necessarium; illo namque materiæ excretio multum promovetur. Vid.  
Soling.  
Tab. IV.  
F. 8.

Obligatio aut Injectio ubi instituitur, cavendum, quantum possibile, ne externus aër vulnus subingredia-  
tur, ille enim solus, intus admissus, foetoris horrendi causa sæpius existit.

In *Hydrope Pectoris* si fluidior fuerit aqua, simpliciter Acu minori perforatio instituenda. Si vero minus fluida, major Acus in usum vocanda, uti infra in Abdominis Paracentesi explicaturi sumus: Nulla siquidem Acuum  
delin.  
vid. apud  
Scuk. in  
Auct. II. obesse videtur ratio cur non æque hoc in loco, quam in Abdomine talis perforatio locum habere posset.

## EXPERIMENT. XXXII.

### *De Paracentesi Abdominis.*

In *Hydrope Ascite*, aliis remediis incassum tentatis, Paracentesis aliquando opem tulit. Mature autem instituenda est hæc Operatio, nisi aquarum moles nimis aucta, viscera

male affecta, febris continua, respiratio molesta, viriumque prostratio eam plane dissuadeant.

*Locus* perforandus communiter eligitur in sinistri Abdominis latere, tribus digitis transversis sub umbilico, totidemque ab ejusdem latere remotis.

Hic itaque locus atramento notatus, secundum ductum fibrarum musculi oblique ascendentis, inciditur aut perforatur.

Verum hæc methodus necessario observanda non videtur; perinde enim est an in sinistro, an vero in dextro latere Abdomen perforetur, Veterumque hac de re opinio nullius momenti est.

Præterea dictarum fibrarum ductus scrupulose observare, nullius est utilitatis; iis enim observatis, aliorum subjacentium muscutorum fibræ transversim diffecantur.

Præstabit itaque paulo propius ad umbilicum accedere, ductusque longitudinales fibrarum carnearum musculi

sculi recti incidendo sequi, hac tamen cautela, ne tendinosæ musculi inscriptiones lædantur.

*Umbilicus* si propullulat, & in vesicam quasi attollitur, haud difficile pertunditur, aliusque locus non est eligendus, quia foramen ob corrugatam cutim facilius clauditur, exitusque aquarum (qui aliquando vehementer nimis urget) compescitur.

Si vero non protuberat, sed *Scrotum* fero, aquave distentum conspicitur, illudque vesperi magis & mane minus repletum occurrit, *Scrotum* potius, quam *Abdomen* perforare multo erit tutius.

Veteres partem supra notatam *scalpello* incidebant, vulnereque *cannulam argenteam, plumbeamve*, lævem & alatham, exacte parti vulneratæ convenientem, immittebant.

Verum Recentiores animadvertentes, cannulam hanc, foramini præcise ita respondentem, vulneris latera nimis premendo; succumque nutritium à fibrarum poris hac ratio-

ne angustatis abarcendo, Gangrænæ subsequēntis causam extitisse, commodiorem methodum invenerunt, beneficio *Cannulæ perforatæ*, circa extremitatem acuminatam cuspidem, sed rotundam, habentis, Operationem instituentes.

Abdomine itaque hac *Cannula* pertuso, protinus aqua per foramina ab utroque cuspidis latere conspicua rivulose prodit. Fluxus autem nimius stylo cannulæ cavitatem occludente compescitur, quo extracto aqua rursus pro lubitu effluet.

Probe interim cavendum, ne aqua simul & semel, sed partitis vicibus extrahatur.

Ubi repetere Operationem hanc Chirurgus desiderat, aut de novo foramen Abdomini infligitur, aut, quod prius factum, referatur.

Si retracta acu, factaque linteo carpto & emplastro glutinante obligatione, aqua involuntarie exstillet, cannulam breviorē subere clausam, foramini aquam stillanti immittere

con-



convenit, quæ non iterum statim extrahatur, sed immissa ibidem remaneat, ut ejus beneficio quotidie aquæ portio, subere remoto, extrahi possit.

Aliquando mucago quædam, intestina aliaque viscera obsidens, aquæ immixta, cannullæ extremitatem obturando, exituræ aquæ viam præcludit. Quo in casu, Styli longioris cannulæ immissi beneficio facile illam loco movemus, & aquæ liberum exitum præbemus.

Nonnullis & hæc methodus displicet, Operationem feliciori cum successu (saltem ut perhibent) absolventes *Acu* longe *minori*, qua quotidie novum foramen faciunt. Verum si viscidior aqua fuerit, *Acus* illæ nullatenus opem ferre poterunt.

*Acus de-  
lin. apud  
Sculpt. in  
Aust. II.*

In omni denique Paracentesi prudenter procedendum: In Senioribus enim, Cachecticis, Pueris, Ascite inveterata laborantibus, aliis remediis si auscultet morbus, Operationem suscipere caveas, & famæ

## 118 E X P E R I M E N T A

potius tuæ consulas , ne Operatione male cedente patientis, uti fere semper fieri solet , fata anticipes.

Practici quidam hujus ævi non incelebres, varios Hydropicos per modum scarificationis se restituisse asserunt ; quas tamen instituendas non suademus , nisi artuum inferiorum partes subcutaneæ , lymphatico humore obsessæ & œdematosæ conspiciantur.

### E X P E R I M E N T. XXXIII.

#### *De Hernia Umbilicali.*

**V**asis umbilicalibus infantis , jam in lucem editi , minus bene ligatis, aut non ita , ut decet, Compressulis & Umbilicali Vinculo munitis , sanguis motu particularum intestino , vasorum latera tantopere distendit , ut Umbilicus inde generetur admodum deformis , membrum potius virile referens, quam Umbilicum.

Aliquando ab iisdem causis , quibus Enterocoele ortum debet , Perito-

tonæum extenditur vel dilatur, idque quidem eo in loco, ubi in abdomine concursus vasorum umbilicalium conspicitur. Hinc flatus, vel Omentum, vel Intestini Ilei portio umbilicum subit, eumque distentum repræsentat.

Leviori itaque digitorum compressione, Umbilicum distendentia versus Abdominis cavum (quod facili communiter peragitur negotio) propellantur, Umbilicoque prominenti jam compresso, *Emplastrum ad Rupturas* una cum lamina plumbea, vel corii crassiusculi particula, cum linteo ter quaterve duplicato, fasciæ ope jejuno ventriculo applicetur, eoque in statu contineatur tamdiu, donec fibræ Umbilici viciniore contractiores redditæ, umbilici procidentiam impediant.

Hisce nihil juvantibus, Umbilicus comprimendus, & vicina Abdominis cutis portio levioribus scarificationibus vulneranda, labiisque vulnusculorum Emplastris Glutinosi addu-

ctis, ad cicatrices perducenda erit, ut ita fibræ laxiores ante, jam contractæ, Umbilici prominentiæ obstant.

Si vero nec his cedat malum, ultimum refugium erit (propulso in Abdomen intestino aut omento) Umbilicum prominentem, filo serico triplicato cera obducto, decenter ligare, ligatumque extra ligaturam resecare. Hæmorrhagia resectionem subsequens, *Vitriolo Cyprino* sistitur, qua sedata, leviori styptico una cum Emplastro applicato, fili separationem, Umbilicique consolidationem brevi sperare licebit.

In adultis autem & corporibus cachecticis ab hac Operatione manum retrahere.

In obesis *Hernia umbilicalis* notabile aliquando sumens incrementum, nullo melius & rectius comprimitur, quam (apposito prius cerato) Cingulo umbilicali ex linteo duplici gossipino parato, quod ea parte, qua umbilicum tegit, scutum da-



duriusculum obtinet, in cujus centro prominentia apparet, quæ in dilatatum Umbilicum sese insinuando intestini, omenti, flatusve exitum prohibet: quale Cingulum describit *Scultetus in Armamentario.*

*Vid.*

Quod si relaxato aut neglecto Vinculo, vel alia de causa ex improvviso major intestinorum portio Umbilicum subeat, & excrementa in eadem hærentia justo duriora restitutionem impedian, Umbilici cutis erit incidenda, & dilatato foramine intestinum reponendum.

*Tab.*

*XXXIII.*

*Fig. 8.*

## EXPERIMENT. XXXIV.

### *De Hernia Inguinali.*

**N**on raro casu, saltu, ponderis gestatione, vomitu enormi; tussi gravi, motuve corporis vehementiore, intestina versus inguen prolabuntur, unde Herniæ species oritur, quæ *Bubonocèle*, *Enterocèle*, sive *Hernia intestinalis* appellatur.

Hæc autem vel uno ictu & actu

derepente, vel sensim producitur. In priori casu lacerum, in posteriori vero relaxatum & extensum esse Peritonæum, sunt, qui asserunt; nos vero in utroque casu relaxatum solummodo invenimus.

Ubi repente oritur, & intestina prolapsa durioribus fœcibus flatu distenta conspiciuntur, intestinum ilico restitui debet, quod si negligatur, funesta symptomata, dolor videlicet atrox, excrementorum vomitus, inflammatio, gangræna, & subitanea mors plerumque subsequuntur.

Hoc itaque in casu æger supinus, capite declivi, genubusque sursum protensus, collocandus; quo modo sua sponte prolapsum intestinum aliquando introrsum recedit, aut leviori manus compressione in Abdomen repellitur.

Si vero flatus aut excrementa ob sint, lene aliquod alvum laxans offeratur, aut Clyster emolliens injiciatur.

Quibus nihil juvantibus sequens applicetur cataplasma.

℞. *Radic. Alth.* ʒijʒ.

*Herb. Malv. Mj.*

*Violar.*

*Parietar.*

*Flor. Chamomill.*

*Melilot. aa. M. ʒ.*

*Furfuris Mj.*

*Cog. ex Aq. Comm. factaque  
expressione, adde*

*Farin. Hord.*

*Fabar. aa. ʒijʒ.*

*Lini ʒijʒ.*

*Ol. Rosar.*

*Lilior. alb. aa. ʒj.*

*F. Cataplasma calide applican-  
dum.*

Balnea ex Lacte dulci, Aq. commun.  
in qua Herbæ emollientes sunt coctæ,  
ut & linimenta varia, externe calide  
applicata, magnum habent usum.

Intestino jam restituto, *Empla-  
stroque styptico Crollii*, aut ad *Rupt.*  
*Fernel.* applicato, fasciis vinculisque  
commodioribus, tamdiu detinenda  
intestina, usque dum Peritonæum aut  
consolidatum, aut corrugatum fue-  
rit,

rit, quod in infantibus fere semper felici peragitur successu.

In adultis sæpe periculum in mora. potissimum ubi, præscriptis medicamentis, intestinum non statim restituitur; hinc Manus Chirurgica sequenti methodo Operationem aggredietur, maximopere erit necessarium.

Ægro decenter collocato, cutisque incisione facta, extensum Peritonæum, quod intestinum includit, in conspectum prodit; quo itidem inciso, intestinum sensim & prudenter repellendum. Nonnunquam tamen partes trium muscutorum Abdominis tendinosæ, transversalis scilicet, oblique ascendentis & descendentis (quæ in inguine angustum quasi hiatum formant, ut via, sed obliqua, Vasis Spermaticis transitum præberent) adeo angustatæ sunt, ut sine illarum dilatatione intestinum restitui non possit. Ad viam itaque hanc dilatandam, *Specillum Excavatum* intromittunt, factaque hiatus incisione, intestinum in abdomen



men propellunt. Cavendum interim ne intestinum lædatur, nec incisio nimium extendatur, cum alioquin facile vas aliquod arteriosum lædi posset. Tutius idcirco erit annulum digito eo usque dilatare & expandere, ut intestinum prolapsum reponi possit. Si vero contingat, intestinum aëre in tantam molem esse distentum, ut commode restitui non possit, variis in locis subtiliori acu erit perforandum.

Reposito itaque, ut dictum, intestino, hiatus, ad cicatricem fortiores obtinendam, in circumferentia scarificandus, vulnerique turunda vitello ovi illita immittenda, & applicatis plumaceolis atque compressis deligatio instituenda.

Aliquando eodem modo ac intestina, Omentum prolabitur. Qui affectus, Hernia Omentalis sive Epiplocele appellatus, minus est periculosus, ideoque ad aliquot annorum spatium sine notabili incommodo patientes eundem ferre possunt. Alioquin

quin facta, ut ante Peritonæi dilatati incisione, & ligatura prius injecta, omenti prolapsi refectione, haud ita difficile restituitur.

## EXPERIMENT. XXXV.

### *De Puncto Aureo.*

**P**ræcedenti Operationi commodè annectitur illa, quæ *Punctum Aureum* dicitur, quæque instituitur, quando intestinum restitutum continuo iterum in scrotum prolabitur. Ægro itaque ut decet locato, & intestino, cutis incisione facta, ad interiora propulso, instrumento separatorio obtusiori, aut unguibus Vasa Spermatica una cum extenso Peritonæo (quod hic vaginæ instar sese habet) à vicinis partibus separanda, acusque *filo aureo* instructa per ipsius vaginæ latus prope inguen, illæsis Vasis Spermaticis, transmittenda, filumque eo usque adducendum, ut via hoc modo angustata intestinum prolabi non possit. Non tamen nimis

con-

constringendum filum, ne simul Vasa  
SpermatICA constringantur, sangui-  
nique per ea circulantia via præclu-  
datur. Facta constrictione fili extre-  
mitates Forsipis ope intorquendæ,  
ut cuspidibus suis partes vicinas,  
ipsamque processum, sive Peritonæ-  
um extensum lædere non possint.

Præter dictum filum, alio Serico  
quadruplicato, aut Ligula linea, cu-  
jus extremitates extra vulnus pen-  
dulæ relinquuntur, paulo supra Au-  
reum ante nominatum, processum  
constringere aliquando solent, ut  
hoc modo Peritonæum ampliatur  
angustius reddatur, intestinumque  
alias prolapsurum, duriori attactu  
patienti principio nec molestiam,  
nec dolorem creat.

Quo facto Turunda Digestivo  
quodam oblita immittitur, & appo-  
sita Compressa Vino albo calido im-  
buta, una cum Fascia vulnus ad ci-  
catricem perducitur.

Hæc tamen Operatio in adultis  
tantum locum habet; Infantes enim

Fa-

Fasciarum aut Bracheriorum ope  
haud difficile restitui possunt.

## EXPERIMENT. XXXVI.

### *De Testiculi Extirpatione, sive Castratione.*

**S**i præcedenti merhodo instituta,  
minus certa videatur Operatio,  
vel Testiculorum alter corruptus,  
Scirrho aliquo cancroso, aut excre-  
scentia carnosa obsessus fuerit, affe-  
ctum Testiculum simul & semel au-  
ferre, tutissimum erit remedium.

Ægro itaque firmiter ligato, quo  
minus se movere queat, Chirurgus,  
facta incisione lente processum sepa-  
ret, eumque una cum tunica vagina-  
li (cui Testiculus includitur) ex scro-  
to extrahat, & acum, filo serico for-  
tiori & cerato instructam, prope in-  
guen per processum traducat, tradu-  
ctam bis circumducat, arcte contra-  
hat, & nodum duplicatum (ne de-  
cidat) imponat, fili vero extremi-  
tates extra vulnus propendere sinat.

Tu-



Tutius autem ut succedat Operatio, <sup>Vid. etiam Scult. de Castratione, sed alia methodo instituta</sup> alterum filum paulo supra primum circumducatur; Forfice denique Testiculum abscindatur, vulnusque ut supra dictum obligetur.

## EXPERIMENT. XXXVII. <sup>Auct. I. Tab. 3.</sup>

### *De Hernia Aquosa.*

**N**on raro contingit aquarum mole Scrotum aut ex parte aut in totum mirifice distendi; quæ distensio vel Ascitem vel Vasa Lymphatica Testium disrupta, antecedentem causam agnoscit.

Dignoscitur hic affectus ex tumore, & transparentia, nonnunquam odor quoque adest. Si Ascitem comitatur, mane nonnihil Scrotum detumuisse apparet: Si vero à Testium Vasis Lymphaticis disruptis originem ducit, Scrotum æqualiter distentum manet.

Hæret autem aqua vel inter Scrotum & Tunicam vaginalem, vel vaginalem inter & albugineam.

Præmissis generalioribus quibusdam internis remediis, externa quoque conducunt, inter quæ primum locum obtinet *Radix Bryoniæ* contusa, & *Spiritu Vini* irrorata calide admota. Vel Fodus & Cataplasmata ex Cephalicis, calefacientibus & penetrantibus parata. Vel seq. Empl.

*R. Emplastr. de Cumin.*

*Melilot.*

*Ranis cum Merc.*

*aa. q. s.*

*M.*

Quibus nihil juvantibus, ad manualementem Operationem confugiendum, quæ triplici instituitur methodo: *Acu* scilicet, *Lancetta*, & *Cauterio potentiali*.

Galli Cauterio magis, quam Nostrates utuntur, rariusque *Acu* Operatio peragitur. Vulgatissima namque methodus est, quæ *Lancetta* absoluitur.

Facta *Lanceolæ* ope incisione, aqua statim rivulose prodit, quam (si in ipso Scroto extravasationis ejus

cau-

causa lateat) simul & semel extrahere licet: Si vero ab Ascite originem traxit, prudenter procedendum, partisque vicibus aqua evacuanda erit.

Ubi inter Tunicam vaginalem & albugineam aquæ collectio observatur, Lancetta intimius erit adigenda, alioquin ne guttula aquæ exiret.

Evacuatione peracta, vulnus immissa turunda, &c. ad cicatricem perducere oportet.

Quod si Vas Lymphaticum, semel disruptum, inducta cicatrice denuo Lympham eructet, singulis sequentibus annis semel Operationem reiterare licebit, quemadmodum tales novimus, in quibus cum successu quotannis instituitur. Si vero Operationem toties repetendam ægre ferat patiens; Testiculus necessario extirpandus erit, quo ablato Lymphæ stillicidium certo cessabit.

## EXPERIMENT. XXXVIII.

*De Catheterismo.*

**U**rinæ excretio variis de causis vel imminui vel totaliter sup-  
primi potest. Nonnunquam enim Ca-  
runcula in Urethra sive meatu urina-  
rio intus enata exitum ejus impedit.  
Subinde tumor quidam Urethram  
comprimendo, vel viscida quædam &  
tenax materia vesicæ collum obtu-  
rando, obicem urinæ ponunt. Ali-  
quando denique calculus in Urethra  
aut vesica hærens omnem ipsi viam  
præcludit. Unde immanes patienti  
adferuntur cruciatus, quos nonnun-  
quam ipsa mors pressio pede subsequi  
solet, nisi tempestive amolitur.

*Cathe-  
teris deli-  
near. vid.  
apud To-  
let. Tab*

*III. Fig.*

*3. & So-  
ling.*

*Tab. VI.*

*Fig. 4.*

Quam ob causam, medicamentis  
tam internis, quam externis incas-  
sum adhibitis, Operatio, *Catheteris-*  
*mus* dicta, requiritur, quæ Cathe-  
tere seu fistula argentea lævi & in-  
curva, pro patientis ætate majore  
vel minore perficitur.

Cathe-



Cathetere itaque oleo prius obli-  
to, sinistra virgam teneat, meatum-  
que urinarium tantillum comprimat.  
Chirurgus; mox Catheterem intro-  
ducat, ea tamen lege, ut ejus con-  
vexitas abdomen respiciat; dein in-  
strumentum ulterius adigendo, pru-  
denterque premendo, sub offe pubis  
invertat, ita ut ipsius extremitas ve-  
sicæ collum tangens eandem subin-  
tret, sicque retracto stylo cum suo  
epistomio, urinæ exitus conceda-  
tur.

Quod dum peragitur, cavendum,  
ne Urethræ spongiosæ latera durius  
tangantur, & molesta hæmorrhagia  
superveniat.

Alia Catheterem applicandi me-  
thodus hoc modo peragitur: Virga  
versus ventrem elevata, Catheteris  
utraq; extremitas ventrem respici-  
at, rectaque via instrumentum leni-  
ter propellendo vesicæ immittatur,  
atque ita Catheteris inversio, uti in  
præcedenti methodo, non requiritur.  
Hac via Chirurgus aliquando fe-

licius procedit , sæpeque patiens manu propria Catheterem applicare potest.

Præter Catheteres , quibus frequenter Chirurghi utuntur , occurrunt *Flexiles* dicti , ex *Argento* , *Corio* , vel *Cute Anguillæ* confecti , quorum usus non modo minus certus , sed & minus conveniens esse solet.

*Delineat.*  
*vid. infra*  
*Fig. x.*

Nos autem omnium commodissimos putamus illos , qui in ea parte , ubi flexuram faciunt , variis foraminibus sunt pervii , per hos enim aquam patentiore viam inventuram nemo dubitabit.

*Delin.*  
*vid. apud*  
*Tolet.*

*Tab. III.*

*Fig. 5.*

In sexu foemineo Cathetere breviori & crassiori utendum , cujus convexitas , ventrem quamvis respicere debeat , non tamen est invertenda. Ulterius enim solummodo adigendo facili negotio vesicam subintrabit. Quibus peractis stylus retrahendus , ut per viam patulam urina exire possit.

## EXPERIMENT. XXXIX.

*De Lithotomia.*

**D**uplex in sexu masculino Calculum ex vesica extrahendi modus occurrit. Vel enim *Minori apparatu*, præprimis in infantibus & pueris, vel *Majori*, potissimum in adultis, Operatio hæc instituitur.

Posterior modus feliciter ut succedat, patiens mensæ aut sedili erit imponendus: dein bene ligatus ita locandus, ut *Itinerarium*, sive *Cathe- Cathete-  
ter cannulatus*, oleo olivarum prius <sup>ris cannu-  
lati, Con-  
ductoris,</sup> oblitus, per Urethram in vesicam <sup>Dilatato-  
ris, For-  
cipis &c.  
delin vid.  
apud To-  
let. Tab.  
III. &  
IV.</sup> intromitti ad calculum à Chirurgo possit. Mox *Itinerarii* curvatura *Perinæum* versus retorquenda, & à latere *Perinæi* incisio oblique supra *Catheterem* instituenda; hac tamen lege, ut *Cultelli* acies *Itinerarii* finui distincte opponatur, eundemque rangat. Deinde retracto *Cultro*, vulnere *Conductor* in *fulcum* immittendus, mox *Cathetere* ex *Urethra* abla-

to, Conductoris cavitati *Dilatatorium* iterum immittendum. Vulnere dilatato Conductor denuo viam monstrabit *Forcipi Extractorio*, cujus ope tandem Calculus apprehenditur, & extrahitur.

Vulnus inflictum ubi minus fuerit Calculo, nova incisione ampliandum, aut Calculus Forcipis ope in partes & frustra dividendus, atque ita per partes educendus erit.

Quandoque perquam necessarium est per tres quatuorve dies *Cannulam argenteam* immittere, ut per eandem sanguis concretus, pituita vilcosa, aut calculorum fragmenta minora egrediantur. Insuper aliquando valde proficuum est ope *Syringæ* injectionem instituere, ut heterogenea in vesica contenta facilius prodire possint.

Extracto jam Calculo, vinculisque omnibus solutis, vulnus, ut decet, obligandum, sanguinemque sistentia, ut *Bolus*, *Farina* &c una cum Fasciatione bene administrata, admovenda. Vulnus denique, quam



quam primum fieri potest, consolidandum, ne urina per locum vulneratum involuntarie postmodum effluat.

Majori apparatu proposito, *Minor* quoque sequenti modo instituentus, examinandus venit. *Patiens* nimirum puer vel infans, robustioris hominis femoribus, eo, quem *Tol-* Fig. exhibet Tol-  
*tus* depingit, imponitur modo. Si letus Tab. VII. & VIII.  
 vero natu fuerit major calculosus, scamno innititur. Mox Lithotomus indicem oleo olivarum madidum, quandoque etiam indicem cum medio digito, in anum immittit. Dextra interim Hypogastrium magis minusve premit, ut calculum, digitum inter & os pubis, exploret, cumque ad Perinæi regionem propellat, iunc eadem manu dextra, Cultello, locum supra citatum, eo usque incidit, donec per inflictum vulnus Calculus conspectui sese offerat. Nisi enim sua sponte prodiret, *Lapidillo* extrahendus esset.

In sexu fœmineo longe facilius,

imo vix aliqua incisione instituta, totum negotium sine ulla sanguinis effusione sæpius absolvitur. Immisso videlicet meatui urinario Cathetere fulcato sulcus Dilatatorium excipit, quod meatum ita dilatat, ut Forcipe Calculum extrahere admodum difficile non sit. Major vero si fuerit Calculus, via hæc urinaria minori incisione aliquando patentior reddenda, modo violentior à Calculo dilatatio, Urinæ incontinentiæ causa non existat. Calculi denique ramenta aut arenulæ in vesica remanentes, injectionibus Syringæ ope instituendis, expurgandæ erunt.

## EXPERIMENT. XL.

### *De Urinæ Incontinentia.*

**P**ost Lithotomiam institutam, ob vulnus solito majus inflictum, fibras vesicæ colli resectas; aut nimium extensas; vel etiam propter urinæ acrimoniam, ejus incontinentia, aut involuntarium stillicidium, vel  
per

per vulnus (cujus labia jam callosa reddita) vel per meatum urinarium, non raro remanere solet.

Si vulneris vitio contingat (medicamentis convenientibus sanguinis intemperie salina prius correctâ) patiens clunibus elevatis supinus locandus: mox *Cultello*, aut *Lanceola* oblongiori cuspide donata, foraminis urinam stillantis latera in Perinæo leviter incidenda & scarificanda, unde sanguis hac occasione promanans & novæ incarnationis causa existens, adhibito convenienti Digestivo, sæpe ductum hunc ita consolidat, ut urinæ omnis præcludatur exitus: cui scopo exacta & regularis diæta non parum inferviet.

Verum urina acrior, omnia quandoque remedia eludens, viamque hanc patulam sibi servans, nullis rectius *Bracherii delin. vid. infra Fig.* sistitur, quam *Compressula*, artificiosa methodo, ope *Bracherii* sive *Subligaculi* ductui admota, quæ dictum foramen comprimendo, urinæ egressum inhibet.

Si

Si fanata hac fistula urinam stillante, ob vesicæ tonum relaxatum, Urinæ Incontinentia remaneat, eodem Bracherio Urethra in Perinæo stringi potest, ut urina necessario in vesica remanere tamdiu debeat, donec relaxata cochlea (qua pro lubitu Compressa comprimitur) exitus ei concedatur.

Hocce tamen Subligaculum in foeminis, quarum meatus urinarius hoc modo comprimi nequit, locum non habet. Sed tantum instrumentum, vesicæ formam habens, ast complanatum, peculiari ostio, stillantem urinam excipienti, donatum, Subligaculoque annexum muliebribus partibus admovetur.

*Fig.  
apud  
Sculiet. in  
Auct. II.*

*Hujus instrumenti delineat. vid infra Fig. XII.* Præter Bracherium occasione Lithotomiæ in sexu potiori adhibitum, aliud instrumentum simplicissimum, *Postomis* dictum occurrit, quo urinæ incontinentia ab aliis quoque causis oriunda commode compescitur.



## EXPERIMENT. XLI.

*De Ano non perforato.*

**I**nfantēs quandoque *Ano imperforato* in lucem prodeunt, dum intestinum rectum membrana quadam vel tenui, vel crassiori occlusum conspicitur. Subinde Ani loco, exiguum aliquod foramen stylum tenuiorem vix admittens, prope labiorum frænulum (in sexu foeminino) excrementis solummodo tenuioribus transitum præbens, occurrit.

Membrana tenuior intestinum claudens, digiti apice perumpi potest. Robustior vero cultello, sed imprudenter, neq̃ temere incidi debet. Contingit enim aliquando. ut intestini recti terminus ad dictam membranam sese non extendat, sed Parenchyma quoddam intermedium intestini recti viam obscuram reddat.

Quidam hoc in casu curam, immissa *Cannula Acu* breviorē & acutiorē munita, tentandam volunt, qua ubi  
ad

## 142 E X P E R I M E N T A

ad obstaculum perveniunt, illud per-  
tundunt. Retracta jam Acu, Cannu-  
lam per diem unum aut alterum in lo-  
co pertuso relinquunt: dein turunda  
duriuscula, Unguento aliquo cicatri-  
fante inuncta, foramen tamdiu, do-  
nec via satis patula reddita fuerit,  
apertum servant.

Si foramen circa labiorum frænu-  
lum conspiciatur, turunda primo mi-  
nori, dein majori dilatandum; Si  
vero ejus latera sufficienter cedere  
nesciant, Cultello incisorio, duobus  
vel tribus in locis levioribus vulnus-  
culis ita lædenda, ut sufficienter ex-  
tendi possint. Quibus peractis turun-  
da crassiuscula, Unguento cicatrisan-  
te obducta, immittenda.

## EXPERIMENT. XLII.

*De Glande non perforata.*

**N**on modo Anus in quibusdam in-  
fantibus est occlusus, sed & *abf-*  
*que Foramine in Glande*, nonnulli in  
lucem prodeunt. Huic autem incom-  
mo.

modo, exiguo *Cultello* angustiori cus-  
pide donato, quam primum erit oc-  
currendum.

Patiens itaque supinus collocetur,  
& Glandem sinistra Chirurgus appre-  
hendat, mox altera manu, *Cultelli*  
rope foramen clausum aperiat, caven-  
do, quantum fieri potest, partes vi-  
cinæ nimium ne lædantur, ac Hæ-  
morrhagia molesta & periculosa su-  
perveniat: Dein foramini penicillus  
*Epulotico* inunctus immittatur, qui  
tamen eo tempore quo æger urinam  
reddit, auferendus, & statim ite-  
rum immittendus; quibuscum tam-  
diu continuandum, donec labia fo-  
raminis cicatrice obducta liberum  
urinæ præbeant exitum.

Si vero cum *Glandis* foramine an-  
gusto & nimis stricto infans nascitur,  
illud sine mora dilatandum & ampli-  
andum, immissa solummodo mino-  
ri turunda, ex *medulla Sambuci* com-  
pressa, vel particula *Spongiæ* prepa-  
rata, *Unguento Rosaceo* obducta,  
conficienda: dum enim turunda hu-  
mi-

## I44 EXPERIMENTA

mido, quod imbibit fenſim & fenſim, turgescit, foramen patentius redditur.

Nonnunquam Glans loco naturali quidem occurrit impervia, sed à latere frænuli *Foramen, ductu quodam* ab Urethra oriundum, urinam excernens, reperitur. Cum autem Foramen hoc notabile incommodum non adferat, cicatrice non erit claudendum, novumque faciendum, sed eo in statu potius linquendum. Imo, quod mireris, ejusmodi homines ad liberos procreandos non minus fuisse habiles, ac alii quorum partes hæ bene formatæ, non simplici constat experientia.

## EXPERIMENT. XLIII.

### *De Phimosi.*

**P***himosis* est, quando Præputio arcte adeo obtegatur glans, ut denudari nequeat. Ortum communiter ducit vel ex mala in utero formatione, vel ex variis glandis tumoribus præ-



præputium distendentibus.

Præter interna medicamenta, & speciatim diaphoretica, solis externis cura non raro peragitur. In id namque maxime incumbendum esse censemus, ut viscidæ particulæ inciduntur, acres demulceantur & involvantur, stagnantes pristinae circulationi restituantur, sicque obstructionum repagula removeantur. Id quod Balsamicis, Volatilibus oleosis, & spirituosiss peragitur. Eum in finem *Balsam. Peruvian.* vel *Unguent. nervin.* Præputio externe illinatur: Vel *Spiritu Vin. Caphur.* aut *Aq. Matrical.* cum *Aq. Sambuci* penis cum Præputio calide foveatur. Convenit quoque *Lac calidum* cum *Floribus Chamom.* coctum: Uti etiam *Forus ex Herb. Rorismar. Major. Salv. Flor. Chamom. Sambuc. Melilot. &c.* compositi. Verum ubi Luem Veneream originis suæ parentem agnoscit, morbus ille respiciendus erit.

Si vero ex utero malum hocce sibi contraxit patiens, medicamenta mo-

do præscripta vix aliquid levaminis afferre poterunt, ideoque unice ad Chirurgiam hac methodo instituentiam, confugiendum.

Primum à latere frænuli rectilinea incisio instituitur, vel major, vel minor, prout Præputium magis minusve contractum, ægrique ætas varia fuerit.

Priusquam Incisio peragitur, medicamentum aliquod stypticum ad manus esse debet, ut Præputii vasa, in ipsa Operatione resecta eo constringantur.

Facta jam Incisione, relaxatum hoc modo Præputium, vel sua sponte vel digitorum ope retrocedere incipit; tum vero sæpius de die reducendum, ut pro lubitu sursum aut deorsum moveri possit.

Veteres aliter procedentes, Præputium in anteriorem partem attrahebant, hamulisque tribus quatuorve illud extendendo aperiebant, ut cutis hac methodo relaxata retrorsum propelli posset; quem tamen procedendi modum, ut dolorificum valde, minus probamus. Ali

Aliquando frænum nimis contractum & breve, hunc affectum producit: Tum vero præmissis emollientibus externe adhibendis, sola fræni Incisione restituitur. Notandum tamen, rectius partem fræni, quæ Præputio, quam glandi jungitur, incidi; quo enim glandi vicinior Incisio instituitur, eo periculosior hæmorrhagia metuenda.

## EXPERIMENT. XLIV.

*De Paraphymosi.*

**P***araphymosis* est cum ita retractum & contractum Præputium, ut glandem denudatam tegere nequeat. Oritur autem vel à nimia penis distensione, inflatione, vel à mala hujus partis conformatione.

Malum si recens fuerit, cura externis medicamentis ordinario absolvitur. E. g.

℞. *Spir. Matrical.*

*Aq. Regin. Hung. aa. ℥j.*

*Malv. Caphurat. ℥iv.*

*F. Fetus calide admoventus.*

Fetus quoque vel Cataplasmata, ex Herbis Aromaticis sale volatili scatentibus parata, externe calide applicanda.

Si ab ipsa nativitate pars hæc male fuerit formata, frustra medicamenta admoventur.

Imo quicumque Encheiresi Chirurgica affectum hunc curare conantur, laterem lavant; factis namque tribus quatuorve (ut solent) Incisionibus Præputium tamen, ut glandem tegat, attrahere non valebunt.

## EXPERIMENT. XLV.

*De Abscessuum Apertione.*

**S**anguis innumeris acidis & viscidis particulis refertus, variis in partibus pedem figens, vel alias ob causas extravasatus, variorum Tumorum causa existit. Cum vero medicamentorum ope particulæ istæ hærentes discuti, & corrigi aliquando nequeant, sed acredinem concipien-

do,



do, partes vicinas osseas, ligamentosas, nervosas, vasculosas, aliasque non sine periculo afficiant, perfectam sæpius suppurationem expectare non licet.

Unde potius, rebus ita stantibus, Tumores istiusmodi aperiendi sunt, ut materia ibidem hærens libere exire possit.

Curandum autem, ut secundum ductum fibrarum carnosarum, idque in loco eminentiori, molliori, & si possibile, inferiori (quo commodius materia purulenta ptodeat) Apertio illa instituatur.

Vitentur præterea, quantum fieri potest, Venæ, Arteriæ, Nervi, & Vasa Lymphatica; Nec omnis materia purulenta (si copiosior videlicet fuerit) una vice educatur, neque apertus abcessus valide comprimitur, sed blandius tractetur.

*Si Folliculo sit inclusa materia,* levis juxta Tumoris longitudinem fiat sectio; In majori vero Tumore decussatim instituatur, ut diductis &

150 E X P E R I M E N T A  
separatis vulneris labiis, vesica facilius extrahi possit.

Interim probe cavendum, ne Vesica illa lædatur, quandoquidem ejus læsio foetidi & fere incurabilis ulceris causa sæpius existit.

Ubi vero Folliculo destituitur Abscessus, duplici modo Apertio peragitur: Alii nimirum *Scalpello*, alii *Cauterio Potentially* utuntur.

Cauterium Potentiale qui præferunt, sequentes adducunt rationes:

1. Quod ægris terrorem non ita incutiat.

2. Quod tantum sæpe dolorem non pariat.

3. Quod facta separatione Apertura inde subsequatur amplior, sicque consequenter materiæ largior concedatur exitus.

Parantur autem ejusmodi Cauteria  
ex *Calc. Viv.* & *Smegmat. Holland.*  
*aa. q. s. Vel*

*R. Ciner. Clavill. ℥ss.*

*Calc. Viv. ʒij.*

*Sal. Nitr.*

*Ammoniac. aa. ʒiſſ.*

Infundantur omnia in Aq. comm.  
 ꝑ IV. Vafe clauſo ſtent ita per dies  
 6. aut 7. quo tempore lixivium guſta-  
 ri poteſt; ſi vero ſatis acre nondum  
 ſit, add. *Cin. Clav. ʒiſſ. Calc. Viv.*  
 ʒſſ. Quod ſi ſatis acre viſum fuerit,  
 decantandum, craſſius vero & terre-  
 ſtre tanquam caput mortuum reji-  
 ciendum. Decantatum deinde tam-  
 diu coquendum, donec primo in  
 maſſam pultaceam, mox in talem  
 abeat duritiem, ut inde Lapilli aut  
 fruſtula formari poſſint, quæ Cauter-  
 ria vocantur, & vitro bene clauſo  
 indita, in loco ſicco aſſervari debent,  
 ne humidioris aëris attactu lique-  
 ſcant. In Salis Nitri locum *Vitriolum*  
*Calcinatum* ſubſtitui poteſt.

Priusquam autem Cauterium ap-  
 plicetur, probe examinandum, an  
 vaſa ſanguinea majora, tendines aut  
 nervi in ea parte occurrant: quæ ſi à  
 Cauterio graviter læderentur, fune-  
 ſta producere poſſent ſymptomata.

Si vero nihil horum obſit, Empla-

strum glutinosum perforatum admove-  
 vetur , hujus foramini Cauterium ,  
 cauterio Plumaceolum , plumaceolo  
 iterum Emplastrum imponitur , de-  
 nique Fascia omnibus hisce superin-  
 ducitur , atque in hoc statu per duas,  
 tres , quatuorve horas relinquitur.  
 Ubi autem tanto temporis intervallo  
 satis profunde pars nondum corrofa  
 fuerit , & materiæ nihilominus exi-  
 tus concedendus sit , Scalpello via  
 ipsi aperienda.

Sunt qui in Abscessuum apertio-  
 ne solo Scalpello , sequentes ob ra-  
 tiones , utuntur :

1. Quoad longitudinem & pro-  
 funditatem tanta fieri potest Apertio,  
 quanta requiritur , & à Chirurgo de-  
 sideratur.

2. Ipso instanti materia effluit ,  
 patientque levamen percipit.

3. Cauterio Potentiali Operatio si  
 instituitur , circa partes glandulosas  
 peculiari vase excretorio aut vasculis  
 Lymphaticis donatas , ob callosam  
 hisce ductibus introductam oram ,



sæpius lymphæ aut feri stillicidium subsequitur, quod ab Incisione, cultelli ope peracta, non ita metuendum.

Tumore aperto aut inciso, materiaque purulenta excreta aut expressa, pro rei necessitate Cannula excernendæ materiæ transitum præbens, immittitur.

Injectiones, quales in fistulis & ulceribus adhiberi solent, hoc in casu sæpius quoque necessariae.

## EXPERIMENT. XLVI.

### *De Spina ventosa.*

Quandoque Ossa cariei quadam specie consumuntur, quæ principio non percipitur: Quod malum ab interiori ossium superficie originem ducens, gravissimorum symptomatum causa non existit, nisi prius ad externam ossium superficiem serpsit, eamque perforando, membranam, periostrium dictam, læserit. Hinc dolores lancinantes cum tumore molliusculo & concolori patienti obve-

niunt, febres & ulcera fistulosa accedunt, emaciatur patiens, & cartilaginea excrescentia partem affectam subinde occupat.

Affectus hic, *Spina ventosa* dictus, omnem quamvis medicamentorum vim sæpius eludat, nonnunquam tamen Antivenereis vulgo vocatis auscultat, quibus crassæ viscidæque particulæ inciduntur, aut per sudores expelluntur, acidæque corrosivæ infringuntur & involvuntur. Salivantia præterea dicta, suum quoque hic conferunt symbolum.

Facta tumoris incisione, sunt, qui corruptionem corrigere cupientes, *Euphorbium* cum *Spiritu Vitrioli* & *Sp. Vini* admovent. Sed præstabit *Terebinthina* coctione indurata, in pulverem redacta, & *Unguento Ægyptiaco* mixta.

Sequens Fomentatio magnarum quoque est virium:

℞. *Ras. Lign. Guajac.* ʒiiss.  
*Cortic. ejusd.* ʒj.  
*Herb. Card. Bened.*

*Ab-*

*Absinth. aa. Mj.*

*Scord.*

*Centaur. min.*

*Rut. aa. Mß.*

*Coq. s. a. ex Aq. & Vin. aa. q. s.*

*Colat. 3xx. add.*

*Aq. Theriac. 3ij.*

*Mell. Rosat. 3j.*

*M. F. Fomentum.*

Flumaceolis, petiisque madidis calide applicandum.

Si hisce, uti frequenter contingit, nihil proficimus, ad Ferrum Ignemve perveniendum. Primo itaque *Scalprum* in usum vocandum, potissimum si Spina non admodum magna fuerit, quocum tamdiu continuandum, donec omne vitiosum separatum fuerit. Si vero malum profundius hæret, *Terebraque* applicari potest, ea melius quam Scalpro tollitur. Quo sublato, pulveres exsiccantes & Callum generantes appellati, facto foramini inspergendi. Ubi autem dicta instrumenta propter loci angustiam applicari nequeunt, *Can-*  
*nula*

156 E X P E R I M E N T A  
*nula* admovenda, per eamque *Ferro Candenti* pars affecta urenda; retracto dein *Cauterio*, per eandem *Cannulam* *Medicamenta* præscripta applicanda.

Quod si nec hoc modo malum superemus, sed hisce non obstantibus quotidie ulterius serpat, pars affecta rescindenda, ejusque extirpatio necessario instituenda erit. Quibus autem cautelis & circumstantiis eadem peragatur *Operatione XLIX.* demonstraturi sumus.

## EXPERIMENT. XLVII.

### *De Sutura Tendinis.*

MUSculi parte tendinosa, vel secante vel pungente instrumento resecta, non raro contingit, post vulneris consolidationem illius musculi actionem periisse, membrumque motu suo regulari destitutum fuisse. Qua occasione Chirurgiæ Cultores in eo omnem locarunt operam, ut *Operatione* quadam, *Su-*  
*tu.*



*tura Tendinis* dicta, præscissi Tendinis extremitates ita adducerent, ut cura peracta, membri illius motus integer servaretur.

Operationem hanc instituendi methodus occurrit duplex. 1. *Filo* per extremitates præscissi Tendinis trajecto, eadem adducuntur, & ligantur. 2. Filum per supremam mediamque tendinis partem trajicitur, inferiori parte sive tunica illæsa manente: dein ligatura, ut supra, sed interposito corio injicitur; hacque methodo Galli communiter utuntur.

Nos vero nec hanc, nec illam calculo nostro probamus, sed parte læsa decenter locata duobus in locis unamquamque Tendinis extremitatem perforamus, Filumque sericum cera obductum trajicimus; hinc interposita *Suberis* aut *Corii* particula extremitatum adductio, filorumque adstrictio certior redditur, neque etiam Tendinis extremitates adeo facile, ac in prima & secunda methodo, lacerantur.

Si

Si Tendo ex parte fuerit resectus remanente aliqua portione integra, cum refecare & Operationem instituerè præstabit. Si vero major pars integra, refecanda illa non erit.

Operatione peracta, pulvis *Terebinthinæ coctæ* Suturae inspergitur, vulnerisque Deligatio, Digestivo vulgari seu *Balsamo Arcæi*, instituitur.

Curandum interea partem affectam, dum cura peragitur, ita disponi, ut nec moveatur, nec extendatur nimium; Absoluta cura, membrum contractum quidem quodammodo apparebit, sensim nihilominus progressu temporis extendetur, extensumque naturalem usum recuperabit. Hac itaque methodo distincte servata, felicem successum sperare licebit, uti non simplici constat experientia.

In nimia tamen extremitatum resecti Tendinis retractione, Operatio hæc nullatenus locum habet.

## EXPERIMENT. XLVIII.

*De Luxationibus.*

**D**uplicem *Luxationes* agnoscunt causam, alteram internam, à ligamentorum laxitate, vel humore extravasato inter duo ossa articulationem componentia, hærente, productam. Hic primo gelatinæ, dein cartilaginis, tandem ossis naturam assumens, sensimque incrementum capiens articulationem disnectit; Et hæc illa est luxationis species, quæ difficillime & fere nunquam restituitur.

Altera causa externa est, & à casu, ictu, saltu, compressione, extensione, motuve partis violentiore produci potest.

Luxati autem membri in sedem naturalem reductio ut facilius peragatur, omnium in subiecto humano ossium eorumque Articulationum structuram accurate novisse oportet. Cujus cognitione si imbutus fuerit Chirurgus

rurgus, in restituendo longe erit felicior.

Reductioni huic speciatim inservit Membri luxati extensio, qua non tantum Tendines contracti elongantur, sed & Caput Ossis loco motum cavitati naturali applicatur: hocque manuum, Laqueorum, Fasciarumque perficitur ope. Si vero Luxatio inveterata & pertinacior fuerit, variae hunc in finem præparatae machinae in usum vocandæ.

Glossocomii & Machinae Tractor. Fig. vid. apud Scult. in Arma-ment. Tab. XXI. XXII.

Inter quas tres potissimum in usu sunt: *prima* est *Glossocomium* apud *Hildanum*, *Scultetum*, aliosque descriptum; *Secunda* est *Machina Tractoria* cum funiculo annexo, & *zonula* parti luxatae alliganda. *Tertia* est *Machina Tractoria nova*, cujus delineationem vide apud *Scultetum* in Appendice Tab. VI. Cui usui etiam egregie inservit *Cochlea Luxatoria nova* descripta Tab. XXIII.

Harum itaque machinarum beneficio luxata membra sufficienter extenduntur, extensa ope mappæ manuve



nuve Chirurgi in locum naturalem reducuntur, quod ex sono membrive reducti munere haud difficulter colligitur, reducta in eo statu servantur; id quod, facta lotione, *Vino rubro astringente, Ferulis ex charta tabulata, corioque confectis, Fasciis, & si opus fuerit, Spleniis,* peragitur.

Postmodum Membrum molliuscule collocetur, situmque naturali convenientem obtineat. Deligatio autem nullis urgentibus symptomatibus, ante quartum, quintum aut sextum diem non solvatur. Quod si nimius *Pruritus* patienti sit molestus, ac idcirco obligationis solutio requiratur, pars pruriens *Aqua calenti, Lacte tepido* vel infuso *Herbæ Theæ* fomentetur.

Quo modo Luxationes cum Inflammatione, Vulneribus, Fracturis, callosive Excrecentiis sint tractandæ, Autores citati fuse satis descripserunt, methodumque, speciales Luxationes restituendi, tradi-

162    E X P E R I M E N T A  
derunt : quapropter earum specula-  
tioni heic loci non immorabimur.

## EXPERIMENT. XLIX.

### *De Membri Extirpatione.*

**Q**uotiescunque corporis nostri  
pars, vel sphacelata, vel gan-  
grænata, aut alio modo male affe-  
cta, ne vicinis labem inferat, ut in-  
utile pondus tollenda occurrit ; to-  
ties aut supra aut infra articulum, si  
fieri potest, in parte sana Amputatio  
instituenda.

Cibo itaque potuque, vel spiri-  
tuoso quodam aut aromatico medica-  
mento roboratus Patiens in sedili, ut  
decet, locetur, hinc sana cutis cum  
carne subjecta sursum trahatur ; mox  
ad duorum digitorum transversorum  
latitudinem supra locum incidendum  
vinculo fortiori, & *Torculari* infra  
delineato, pars amputanda arcte con-  
stringatur ; quibus peractis, *Cultro*  
*Falcato* celeriter in orbem dissece-  
tur, periostrumque (& si duplex os

occurrat caro & ligamentum intermedium simul separandum) illico ab osse abradendo separetur. Non tamen diu huic separationi incumbendum, quoniam magnæ utilitatis sæpe non est, & Patienti maximam molestiam afferre solet.

Mox *Serra acutiori* ossa præcitantur, & hæmorrhagia, si major fuerit, Cauterio Actuali sistatur, dummodo eschara ejus beneficio inducta, postea decidens, novæ hæmorrhagiæ causa non existat.

Nonnulli hæmorrhagiam inhibere laborantes, abscissa vasa *Tenacula* apprehendunt, eaque filo deligant; verum cum hic modus admodum sit, molestus, & Patienti dolorificus, illum omnino improbamus.

Præstabit itaque *Pulverem stypticum* Albumini Ovorum permixtum, cum Plumaceolis, Petiisque applicare, vel Fungum illum *Bovist*, qui in sanguine sistendo non ignavam semper navat operam, partibus sanguinem eructantibus admoveere.

Strypticum interim multoties feliciter cum successu adhibitum sequens esto :

℞ *Bol. Armen.* ℥iij.

*Calc. Viv.*

*Vitriol. ust.*

*Alum ust. aa.* ℥j.

*Lap. Hæmatit.*

*Aloës Lucid.*

*Sang. Dracon.*

*Terr. Lemn.*

*Croc. Mart.*

*Mumiæ aa.* ℥iij.

*Mastich.*

*Thur.*

*Oliban. aa.* ℥ij.

*M. F. Pulv.*

Si vero Hæmorrhagia minor fuerit, sunt, qui statim, facta Extirpatione, filo cera obducto, quatuor in locis cutim cum carne perforant, hinc priori vinculo soluto, eandem deorsum ducunt, atque ita cutis extremitates propius ad se invicem accedentes externum aërem excludendo, subjectum os à corruptione præservant, vulnusque citius

cu-



curatur. Verum hæc methodus jam apud plerosque inoluit, & modo præscripta familiarior est.

Styptica igitur admota, beneficio *Emplastri defensivi & glutinantis* in situ convenienti detinentur: quod Emplastrum in crucis formam præparari debet, ut extremitates ejus eo melius parti affectæ adaptari possint; quibus omnibus Vesica bubula superinducitur, & admota compressa una aut altera, *Fasciatio Cruciata* instituitur.

Nonnulli Manum *Sphacelo* correptam aut occulto *Cancro* affectam (facta prius ligatura) *Scalpro* majori, cum successu amputare solent. Corrupti vero digiti aut pollices, facili negotio vel forfice vel forcipe robustiori abscinduntur.

## EXPERIMENT. L.

*De Sanguinis Transfusione.*

**H**æc *Transfusio* nihil aliud est, quam sanguinis unius Animalis in sanguineum vas alterius, per intermedios *canaliculos* derivatio, ad illius Animalis, in quod sanguinis transfunditur, vel vitam prolongandam, vel morbos depellendos potissimum inventa.

Hinc in Delirio, Mania, Lethargo, Febris nonnullis, Lepra, Lue Venerea, Cancro, Ulceribus &c. Operatio ista quandoque instituta fuit; Verum plerumque saltem, si non semper, eam male cessisse, experientia constat. Unde etiam Romæ non tantum, sed & aliis in locis, sub certa poena interdictum fuit, ne quis sanguinem è bruto in Hominem transfunderet.

Quam ob causam hæc Chirurgia Transfusoria non sine ratione, ab omnibus fere hoc tempore negligitur.

Si

Si enim morbi leviores fuerint, nec ita periculosi, sanguinisque massa haud multum turbata, & in visceribus secretiones modice adhuc peragantur, tum Patientes haud difficile, tam externis, quam internis remediis à morbis suis frequenter liberantur, ideoque ad Trasfusionem confugere necesse non habemus.

Imo quamvis morbus fuerit pertinacior, morsque jam præ foribus existat, ita ut regulari illa sanguinis miscela penitus sublata, hinc inde variis in corporis partibus obstructions, punctiones, rosiones, convulsiones, similiaque funesta symptomata oriantur, & medicamenta cæteroquin potentissima æque ac præstantissima nihil levaminis afferant; attamen hæc Transfusio ne minimam illo in casu præstabit utilitatem. Quin potius eam periculosam fore vel ex eo constabit, quod partes, Patientis sanguinem componentes, à statu naturali quam maxime disiectæ, in motu adeo irregulari jam sunt consti-

tu-

tutæ, ut aliis particulis accedentibus, bene alioquin constitutis, non auscultent amplius, sed cum iis luctam potius incant notabilem; haud secus ac Vinum Aceto affusum eundem saporem induit. Præterquam quod animalium sanguis cum mixtura sanguinis humani non conveniat.

Non tamen idcirco Transfusionem hauc ex foro Medico & Chirurgico plane eliminandam censemus; sed præterquam, quod *Circularem Sanguinis Motum*, tanquam experimento certissimo monstret; præprijis in *Vulneribus*, cum sanguinis profusione copiosa junctis, locum habet.

Ubi enim sanguis rivulose adeo prorumpit, ut circuitus ejus jam in extremis cessare incipiat, impossibile foret ejusmodi vulneratum medicamentis à præsentaneo periculo liberare, nisi Transfusio opem ipsi ferat.

Enimvero cum hujus rei in Brutis, experimentorum in iis institutorum



beneficio, certi esse possimus; cur idem in Homine, si sanguis ex alio Homine sano in ipsius vulnus transfundatur, æque locum non habere posset, non video.

Apparatus ad Encheiresin hanc instituendam tanti non est momenti, quin Chirurgus in re Anatomica modice versatus, facili methodo, Operationem hanc instituere valeat. Qui vero pluribus eam descriptam desiderat, consulat *Louwerum in Tractatu de Corde, & Scultetum in Append. Tab. XI. de Transfusionis Sanguinis.*

Unicum in instrumentis ab aliis hunc in finem adhibitis, culpandum habeo, *Canaliculorum* scilicet intermediorum, *Tubulis argenteis* annexorum, rigiditatem aut flacciditatem nimiam. Hinc tales in usum vocare volui, qui egregie scopo nostro satisfaciunt, & ex *Arteria aspera* Delin. Tabulr. *Gallinæ, aut Anatis, junioris* vid: infra Fig. XIII. & XIV. componuntur: hi enim Canales in ipsa Operatione semper patuli manen-

M

tes,

170 EXPERIM. CHIRURGICA.

tes, sine incommodo flectuntur, sanguinisque motus per illos distincte sentitur, minima mora statim observatur, vel exploranti digito percipitur.

F I N I S.






*Fig. 1.*



*Fig. 2.*



*Fig. 3.*



*Fig. 4.*





# FIGURARUM EXPLICATIO.

Figur. I. pag. 35.

Acum exhibet, ad pertundendam  
Corneam, ante Cataractæ depositionem.

A. *Acus ex Chalibe.*

B. *Manubrium ex Ligno, Argentove.*

C. *Mucro excavatus, qui excipit Acum obtusam, Fig. II.*

Fig. II.

Ejusdem magnitudinis Acum, ad  
deprimendam Cataractam utilem,  
delineat.

A. B. *Acus cum suo manubrio.*

C. *Pars obtusa, quam Fovea sua excipit Acus  
altera, Fig. I.*

Fig. III. pag. 55.

Tubam Sonoriferam proponit, ad  
Gravem Auditum.

A. *Tuba.*

B. *Pars illa quæ meatui auditorio admovetur.*

C. *Os Tubæ amplum, in quod adstans loquitur.*

D. *Manubrium quod patiens manu altera tenet.*

Fig. 4. pag. 60.

Cauterium ad Dentagram de-  
monstrat.

A. *Vagina ex Cupro facta.*

M 2

B.

## Figurarum Explicatio.

B. *Ansa ejus.*

C. *Cauterii manubrium.*

D. *Cauterii extremitas, ad lineæ dimidiæ mathematicæ latitudinem caput exserens, ne, intimius, quam decet, cauterium penetret.*

Fig. v. pag, 65.

Dentem molarem & ocularem delineat, ut cavitates eorum conspici possint.

A. *Dens molaris.*

B. *Cavitas ejus, quæ vasa includit sanguinea & nervosa.*

C. *Striæ sive Stamina ossea coronam componentia, à dicta cavitate ad circumferentiam extensa.*

D. *Dens Ocularis.*

E. *Cavitas.*

F. *Stamina ossea.*

G. *Stylus eidem foramini immissus, quod ingrediuntur vasa.*

Fig. vi. pag. 86.

Torquen depingit ad collum incurvatum.

A. A. *Hemisphærium ex Ferro confectum.*



B. *Annulus in parte elatiori, per quem trajicitur chorda trabi alliganda.*

C. C. *Extremitates, quibus alligatur Corium crassiusculum Lana investitum.*

Fig.



*Fig. 5.*



*Fig. 7.*



*Fig. 8.*



100

7/2



11


12

13









## Figurarum Explicatio.

Fig. VII. pag. 94.

Venam cum incumbente Vase Lymphatico monstrat.

A. *Vena.*

B. *Vas Lymphaticum.*

Fig. VIII. pag. 94.

Similem venam ex pede proponit cum Lymphaticis Anastomoli inter se junctis.

A. *Vena.*

B. B. *Vasa Lymphatica.*

c. c. c. *Anastomoses.*

Fig. IX. pag. 99.

Torcular ostendit, ad constringenda vasa sanguinea, in amputandis membris proficuum.

A. A. *Chorda.*

B. B. *Duo Bacilli, quibus circumagitur Chorda, ut vasa constringantur.*

Fig. X. pag. 134.

Catheterem foraminatum exhibet.

A. *Catheter.*

B. *Stylus cum suo epistomio.*

b. b. b. b. *Foramina*

## Figurarum Explicatio.

Fig. XI. pag. 139.

### Bracherium ad Urinæ Incontinentiam notat.

A. A. *Bracherium.*

B. *Fibula.*

C. *Pars pendula corii perforata, qua constringitur Bracherium.*

D. *Cochlea, cujus ope comprimitur pulvillus, cum annexo Capitulo E compressula instructo.*

Fig. XII. pag. 140.

### Postomen proponit ad eundem affectum.

A. A. *Postomis ex Argento Cuprove confectus.*

B. *Clavis instrumento affixa, qua pro lubitu claudi & aperiri potest.*

Fig. XIII. pag. 169.

### Asperam Arteriam offert, ad Transfusionem sanguinis, cum tubulis rectis.

A. A. *Aspera arteria Gallinae aut Anatis.*

C. C. *Tubuli, trachææ alligandi.*

D. *Tubulus venæ, &*


E. *Tubulus arteriæ alligandus.*

Fig. XIV.

*Eadem demonstrat, cum tubulis curvis, qui subinde majoris sunt utilitatis.*



*Fig. 12.*



*Fig. 14.*



*Fig. 13.*





# I N D E X

## EXPERIMENTORUM.

I.	<i>De Fonticulo in Sutura Coronali.</i>	Pag. 1
II.	<i>De Setaceo.</i>	5
III.	<i>De Fonticulis in Artubus excitandis.</i>	8
IV.	<i>De Vesicatoriis.</i>	13
V.	<i>De Trepani applicatione.</i>	16
VI.	<i>De Strabismo.</i>	25
VII.	<i>De Cataractæ depositione.</i>	27
VIII.	<i>De Oculi Symphisi.</i>	35
IX.	<i>De Oculi cicatrice albicante.</i>	37
X.	<i>De Oculo Artificiali.</i>	38
XI.	<i>De Polypo Narium.</i>	40
XII.	<i>De Hordeolo &amp; Grandine.</i>	44
XIII.	<i>De Hypopyo, sive Oculo purulento.</i>	46
XIV.	<i>De Aurium Chirurgia, Ceruminibus &amp;c. extrahendis.</i>	50
XV.	<i>De Aurium Excrescentiis, Dolore &amp; Tuba Acoustica.</i>	53
XVI.	<i>De Aure perforanda.</i>	56
XVII.	<i>De Hydrocephalo.</i>	57
XVIII.	<i>De Curanda Dentagra.</i>	60
XIX.	<i>De Dentium Extractione.</i>	62
XX.	<i>De Dentium mobilitate, casu, &amp; dentibus artificialibus.</i>	66
XXI.	<i>De Uvulæ descensu, &amp; resectione.</i>	69
XXII.	<i>De Labio leporino.</i>	73
XXIII.	<i>De Linguae vinculo nimis stricto.</i>	77

# INDEX EXPERIMENTORUM.

XXIV.	<i>De Arteriotomia.</i>	79
XXV.	<i>De Bronchotomia.</i>	82
XXVI.	<i>De Colli incurvati restitutione.</i>	85
XXVII.	<i>De Venæ Sectione &amp; Punctura Nervi.</i>	88
XXVIII.	<i>De Vulneribus Vasorum Lymphaticorum.</i>	93
XXIX.	<i>De Aneurismate.</i>	96
XXX.	<i>De Extirpatione Mammæ.</i>	101
XXXI.	<i>De Paracentesi Thoracis.</i>	106
XXXII.	<i>De Paracentesi Abdominis.</i>	113
XXXIII.	<i>De Hernia Umbilicali.</i>	118
XXXIV.	<i>De Hernia Inguinali.</i>	121
XXXV.	<i>De Puncto aureo.</i>	126
XXXVI.	<i>De Testiculi extirpatione, sive Castratione.</i>	128
XXXVII.	<i>De Hernia aquosa.</i>	129
XXXVIII.	<i>De Catheterismo.</i>	132
XXXIX.	<i>De Lithotomia.</i>	135
XL.	<i>De Urinæ incontinentia.</i>	138
XLI.	<i>De Ano non perforato.</i>	141
XLII.	<i>De Glande non perforata.</i>	142
XLIII.	<i>De Phimosi.</i>	144
XLIV.	<i>De Paraphimosi.</i>	147
XLV.	<i>De Abscessuum apertione.</i>	148
XLVI.	<i>De Spina ventosa.</i>	153
XLVII.	<i>De Sutura Tendinis.</i>	156
XLVIII.	<i>De Luxationibus.</i>	159
XLIX.	<i>De Membris extirpatione.</i>	162
L.	<i>De Sanguinis transfusione.</i>	166

F I N I S.

CA-



# CATALOGUS LIBRORUM,

MEDICORUM, PHILOSOPHICORUM  
ET MATHEMATICORUM,

QUOS

SAMUEL LUCHTMANS,

VEL IPSE

Typis mandavit, vel quorum major ipsi  
copia suppetit.

**A**Lbini (*Bernardi*) Oratio de Incremento & Statu Artis  
Medicæ Seculi xvii. 4.

Alpinus (*Prosper*) de Medicina Methodica. 4.

—— de Medicina Ægyptiorum, de Balsamo & Raphon-  
tico, ut & Bontii Medicina Indorum. 4.

—— de Raphontico. 4.

Barbeyrac *Dissertations Nouvelles sur les Maladies de la Poitri-  
ne, du Coeur, de l'Estomac, des Femmes, Veneriennes,*  
Ec. 12.

Bedevole *Essais d'Anatomie, ou l'on explique clairement la con-  
stitution des Organes, & leurs operations Mechaniques, selon  
les Nouvelles Hypotheses.* 12.

Bellini (*Laurentii*) Opuscula aliquor ad Pitcarnium, de Mo-  
tu Cordis in; & extra Uterum, Ovo, Ovi Aere, & respira-  
tione, de Motu Bilis &c. cum fig.

Bidloo (*Godefredi*) opera omnia Anatomico Chirurgica. 4.  
cum fig.

Bidloo

# CATALOGUS

Bidloo de Oculis & Visu variorum Animalium Observationes  
Phyfico Anat. 4. cum fig.

Blancardi (*Stephani*) Lexicon Medicum renovatum, cæteris longe auctior & perfectior. 8.

Boerhaave (*Hermani*) Institutiones Medicæ. 8. Editio nova, Auctior.

- - - Aphorismi de Cognoscendis & curandis morbis. 8.  
Editio nova & auctior.

- - - Atrocis Morbi Historia 1. & 2. in 8.

Cypriani (*Abrahami*) Epistola Historiam exhibens, foetus humani post XXI. Menses ex uteri tuba, matre salva ac superstitè, excisa. 8. cum fig.

Dekkers (*Frederici*) Oratio de Medicina & Medendi methodo. 4.

Endeleichus sive Severus Sanctus de Mortibus Boum, cum Notis. 8.

Euth (*Joh. Ægidii*) Anatome Umbilici curiosa. 8.

Garangeot *Traité des Instruments de Chirurgie, in 12 avec fig. à Paris.*

De Graaf opera omnia, cum fig. 8.

's Gravesande (G. 1.) Matheseos Universalis Elementa, quibus accedunt Specimen commentarii in Arithmeticam Universalis Newtoni &c. 8. cum fig.

Hammen (*van*) de Herniis. 12.

Hamilton (*David*) de Praxeos Regulis & Febri Miliari, accedit Febris Miliaris Historiarum Fasciculus, Lond. 8.

Hecquet Novus Medicinæ conspectus. 12. Paris.

Herfelt Philosophicum Hominis. 8.

Hermani (*Pauli*) Catalogus Plantarum Horti Academici, Lugd. Bat. 8. cum fig.

- - - Paradisus Batavus, sive descriptio Plantarum rariorum. 4. cum fig.

Hofmannus (*Fred.*) de Cinnabari Antimonii, in 12.

Hugenii (*Christiani*) opera Reliqua, 2 vol. 4. cum fig. 1728

- - - *Traite de la Pluralité des Mondes.* 12. avec fig.

Keil Introductio ad Veram Astronomiam. 8. Oxon.

Kerckringii (*Theodori*) opera Anatomica, continentia Specilegium Anatomic. Osteogeniam foetum, nec non Anthropogeniæ Ichonographiam. 4. cum fig.

Mortii

# LIBRORUM.

- Mortii (*Iac. le*) Fundamenta Novo-Antiqua Theoriæ Medicæ ad Naturæ operas revocata. 8.
- - - Facies ac Pulehritudo Chymix ab afflictis maculis purificata. 8.
- - - Oratio de Empirica Doctrina Medica. 4.
- Muller (*Wilh. Henr.*) Defensio Exercitationis de Thymo contra Ph. Verheyen. 4.
- Musschenbroekii (*Petri*) Epitome Elementorum Physico Mathematicorum, Editio altera sub prælo. 8.
- - - Physicæ Experimentales & Geometricæ de Magnete, tuborum capillarium vitreorumque speculorum attractione, magnitudine terræ, cohærentia corporum firmorum Dissertationes, ut & Ephemerides Meteorologicæ Ultrajectinæ. 4. cum fig.
- Nieuwentyt (*Bernb.*) Analysis infinitorum seu Curvilinearum proprietates ex Polygonorum Natura deducta, & Considerationes duæ ad Leibnitium. 8. cum fig.
- Nuck (*Ant.*) Adenographia & Scialographia. 8. cum fig.
- - - - Operationes Chirurgicæ Experimentales. 8. cum fig.
- Oosterdyk Schacht (*Herm.*) Oratio de iis quæ Medicum ad artis exercitium se accingentem præcipue scire oportet. 4.
- - - Orationes duæ, quarum prima est de firmitate artis Medicæ, altera de Medico Exercitato. 4.
- Pharmacopœa Leidenfis Amplissimorum Magistratum auctoritate instaurata. Editio altera. 8.
- Praxis Barbettiana cum Animadv. Dekkers. 12.
- Rau (*Ioh. Iac.*) Oratio de Methodo Docendi & Discendi Anatomen. 4.
- Redii [*Franc.*] Opuscula varia, sive Experimenta Naturalia, de insectis & Animalculis vivis, quæ in corporibus vivorum reperiuntur, 3 vol. in 12. cum fig.
- Reverhorst [*Maur. van*] de Motu Bilis Circulari ejusque Morbis, cum fig. 8.
- Riverii opera Medica, in folio, Lugd. 1698
- Royen [*Adr. van*] Oratio, qua jucunda, utilis, ac necessaria, Medicinæ cultoribus commendatur doctrina Botanica. 4.

# CATALOGUS LIBRORUM.

- - - Carmen Elegiacum de Amoribus & connubiis Plantarum. 4.

Rudolphi [*Ioh. Gabr.*] Medicus ad Ægri palatum varium in Materia Medica, imprimis universali evacuante adaptatus. 8.

Sanctorii Sanctorii Ars de Medicina Statica cum M. Lister commentatio, accessit Staticomastix Hipp. Obicii cum Responsione Sanctorii. 12.

Snellen [*Henrici*] Theoriæ Mechanicæ Physico-Medica delineatio, 8.

Stenevelt de Ulcere verminoso, 4. cum fig.

Swammerdam Miraculum Naturæ, sive de uteri Mulieris fabrica, 4 cum fig.

Sydenham progressus integri in omnibus fere curandis morbis. 12.

Taffin la Chirurgie Militaire. 12.

Terraneus [*Laurentius*] de Glandulis universim & spectatim ad Urerhram virilem novis. 8. cum fig.

Thermarum Bathoniensium & Aquisgranensium comparatio. 8. Londini.

Tolet Traite de la Lithomie. 12. avec fig.

Traite de Physique par Castel 12. a Paris.

Valialva [*Ant. Mar.*] de Aure Humana. 4. cum fig. Edit. altera sub prælo

Verle (*Ioan. Bapt.*) Anatomia Artificialis Oculi Humani, cum fig. 12.

Willis (*Thomæ*) Anatome Cerebri, cui accessit Nervorum descriptio & Usus, cum fig. 8.



SIALOGRAPHIA  
E T  
DUCTUUM AQUOSORUM  
ANATOMIE  
NOVA,

Priori auctior & emendatior.

Accedit

DEFENSIO DUCTUUM AQUOSORUM,

Nec non

FONS SALIVALIS NOVUS,

Haftenus non descriptus.


*Authore*

ANTONIO NUCK, Med. Doct.


In Academia Lugduno-Batava Medicinæ

Anatomicæ Professore, & Collegii

Chirurgici Præsides.



ANTONII NUCK  
SIALOGRAPHIA  
ET  
ADENOGRAPHIA  
CURIOSA.





▲ ANTONI NUCK; Med. Doct.  
In Academia Lugduno-Batava Medicinæ & Anatomicæ  
Professoris, & Collegii Chirurgici Præsidis,  
SIALOGRAPHIA;

ET  
DUCTUUM AQUOSORUM  
ANATOMIE  
NOVA,

Priori auctior & emendatio.

Accedit

DEFENSIO DUCTUUM AQUOSORUM,  
Nec non  
FONS SALIVALIS NOVUS,  
Hactenus non descriptus.

*Ejusdem*

ADENOGRAPHIA  
CURIOSA

ET

UTERI FOEMINEI  
ANATOMIE NOVA.

Accedit

DISSERTATIO  
ANATOMICO-MEDICA  
INAUGURALIS,

DE

MOTU BILIS CIRCULARI  
ejusque morbis,

OLIM

*Publicè proposita à Clarissimo VIRO*  
MAURITIO VAN REVERHORST,  
*h. t. Anatomæ Professore Haga-Comitis.*

Editio tertia.



LUGD. BATAVORUM,  
Apud SAMUELEM LUCHTMANS. 1723.



*NOBILISSIMIS,  
DOCTISSIMIS, CLARISSIMIS,  
EXPERIENTISSIMIS VIRIS,*

D. HERMANO OOSTER-  
DIJK SCHACHT, A.L.M.

PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ

DOCTORI,

MEDICINÆ THEORETICÆ

ET PRACTICÆ,

ET COLLEGII PRACTICI

PROFESSORI,

COLLEGII PHARMACEUTICI

PRÆSIDI,

H. T. RECTORI MAGNIFICO.

D. HERMANO BOERHAVE,  
A. L. M.  
PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ  
DOCTORI,  
MEDICINÆ, BOTANICÆ,  
CHYMIÆ,  
ET COLLEGII PRACTICI  
PROFESSORI,  
COLLEGII CHIRURGICI PRÆSIDI.

D. BERNARDO SIEGFRIED  
ALBINO,  
MEDICINÆ DOCTORI  
ANATOMIÆ ET CHIRURGIÆ  
PROFESSORI.

*VIRIS*



# VIRIS

FAMA, STUDIO, SCIENTIA,  
DISCIPLINA ET FACULTA-  
TE MEDICA ACADEMIAM  
LUGDUNO-BATAVAM TOTO  
ORBE ILLUSTRANTIBUS,  
VERIS TRITIAE VINDICI-  
BUS, DE GENERE HUMA-  
NO OPTIME MERENTIBUS,


## HAS CELEBERRIMI

D. ANTONII NUCKII,  
IN EADEM PALÆSTRA  
QUONDAM EODEM HONO-  
RE DEFUNCTI, LUCUBRA-  
TIONES


*Omni debiti officii observantia  
inscribit & offert*

SAMUEL LUCHTMANS.





Lugd: Batav: Apud S. Luchtmans, 1722





Illustrissimis, Nobilissimis  
Amplissimisque Academiae  
Lugduno-Batavae

CURATORIBUS

D. JACOBO BARONI de WASSENAER,  
Domino de Wassenæ, Obdam, Hensbroek,  
Spierdijk, Wochmeer, Zuydwijk, Kernhem  
&c. Equestris Hollandiæ Ordinis nomine ad  
Confessum Celsissimorum Fœderati Belgii  
Ordinum Deputato, Militiæ Equestris Præ-  
fecto, Urbis Willemstadii, Clundert &c. Gu-  
bernatori, Aggerum Rhenolandiaë Assessori.

D. HIERONYMO van BEVERNINGH,  
J. C. Theilingæ Domino, Reipublicæ Gou-  
danæ Viro Consulari, Legationibus variis &  
maximis pro Fœderato Belgio magnificè obi-  
tis Inclyto.

D. CONRADO van BEUNINGEN, J. C.  
Reipublicæ Amstelodamensis Viro Consula-  
ri, apud Potentissimos Reges Fœderati Bel-  
gii Exlegato.

Eorumque Collegis Ma-  
gnificis, Reipublicæ Leidensis

C O N S U L I B U S ,

D. Johanni vander Marck *M. D.*  
*Præsidi.*

D. Johanni van Banchem.

D. Cornelio Paadts.

D. Nicolao vande Velde.

*Nec-non*

*Consultissimo Prudentissimoque Viro,*

D. Johanni van Groenendijck, J. C.  
*Reipublicæ Leidensis & h. t. I. I.*  
*D. D. Curatoribus à Secretis.*

*D E-*

# DEDICATIO.



uas jure quodam Vestro, tanquam Vestras postulare possentis, eadem officiosissimæ, *Viri Illustres atque Munifici*, offeruntur primitiæ: Immemor antè mei ero, quam non persentire, quanto honore me affeceritis, dum, in Celeberrima Vestra Academia, in eam me adscripsistis Facultatem, quæ ipsi præ reliquis Academiis maximam peperit celebritatem.

Hominum forem ingratißimus, ni publicè profiterer, gratissimum mihi fuisse, dum mihi illam Medicinæ partem obtulistis pertractandam, qua, in Alma hac Academia; primùm *Petrum Pavium*, dein *Ottonem Heurnium*, postmodum *Adrianum Falcoburgium*, denique *Johannem Hornium*, & tandem *Carolus Drelincurtium* Collegam honorandum immortalitati donatos novimus.

Gratiam & habeo & habiturus sum immortalem; Microcosmi contextum stupendum & mæandros admirandos altius perlustrandi potestatem mihi esse concessam; quodque & hæcenus tam bene ces-

# DEDICATIO.

fit, ut quotidie adhuc magno Auditorum numero, ex variis Europæ tractibus, me cinctum videam, quoque in stadio, labore contendam improbo, & animo perfeveranti, connitar tam diu, quam spiritus artus meos irrorabit.

Hæc itaque, in humillimæ observantiæ gratique animi mei testimonium, suscipite primitias, & alia, sed majora, brevi expectate. Hæc interea ad patrocinii Vestræ aram suspendo, ut me illo favore protegeretis, quo soletis devotissimos. Vivite, *Mecænates Optimi*, Orbis, Urbis & Academiae bono diu superstites, ut, vestra benevolentia, provocatae Musæ moliri quid possint, seculis profuturum.

*Illustriss. Nobiliss. & Amplissimorum Nominum Vestrorum*

*Cultor devotissimus*

ANTONIUS NUCK.






A D

# LECTOREM

## PRÆFATIO.

uod Tractatus nostri Exemplaria jam dudum desiderari cœperant, & Bibliopola sæpius mihi testatus sit, passim ab Anatomen excolentibus eundem expeti; hinc alteram hanc Editionem publicæ luci exponere æquum duxi; idque quidem eo magis, ut emendatior, simulque auctior, in publicum prodiret.

† 5

## P R Æ F A T I O.

ret. Varia ibidem occurrent nova, Anatomicis hætenus nondum tradita. *Salivalium Ductuum, ex Subjecto Humano desumptorum, Magnitudo Naturalis, & Fons Salivalis aperitur Novus. Ductuum Aquosorum Origo & Terminus clarè & distinctè hic tibi repræsentatur, &*, ne quid deficere videatur, *Ductuum dictorum Defensionem subjunximus*; quibus, quæ iteratâ experientiâ tentavimus, certius constabunt.

Quam olim promisi *Lymphographiam Generalem*, hætenus ob varias occupationes, tam publicas, quam privatas, absolvere nondum potui. Ne interea Reipublicæ Anatomicæ & Medicæ obesse videar, Deo conatibus annuente, per partes eandem tradere conabor; quarum  
Speci-

# P R Æ F A T I O.

Specimen brevî Anatomæ veræ  
Cultoribus examinandum, & Glandularum Conglobatarum (quarum cognitio adeò obscura, sed summè necessaria) fabricam offeram examinandam; simulque vassa, vulgo Lymphatica dicta, non esse Glandularum conglobatarum Ductus Excretorios, imo Lymphæ Materiam, à Glandulis illis, oculis passim obviis, originem non ducere, dabo perlustrandum.

Tu interea, *Benevole Lector*, aspice hæc sine invidia, lege sine præjudicio, pro solito tuo candore judica, & nostris laboribus fruire. Si vero nonnulla aut hic aut alibi occurrant, quæ nec Tibi, nec aliis visa unquam fuere, & multi in rerum natura invenienda esse negarent;

## P R Æ F A T I O.

garent; me conveni, mea vide,  
eademque perlustra & examina;  
non imagines delineatas, sed res  
ipsas invenies, quæ oculum non  
tantum, sed & Curiosorum ani-  
mum delectare valebunt.



*Ad Clarissimum Virum*

ANTONIUM NUCK

*In almâ Academiâ Lugduno-  
Batavâ Medicinæ Anatomicæ  
Professorem Ordinarium.*

*Cùm in Lucem daret*

SIALOGRAPHIAM

*S U A M, E T*

DUCTUUM

AQUOSORUM

A N A T O M E N

N O V A M

**J***upiter incertis cupiens succurrere Nau-  
tis,  
Intulit Arctòo Sydera bina Polo;  
Quorum ope luctantes pelago deducere  
classes,*

*Et*

Et pleno possent credere vela Mari.  
Morbosos hominum miseratus Apollo la-  
bores.

Arte salutiferas sparserat orbe ma-  
nus :

Sparserat innumeras fœcunda in pectora  
dotes :

Inde habuit primum mox Medicina  
decus.

Sed , dum cæca notat teneræ vestigia  
Natæ ,

Tandem sit tenebras fas mihi pellere ,  
ait :

Sit mihi fas legisse viros , qui luce se-  
renâ

Irradiant Medicæ pulpita sacra Scho-  
læ :

Exoriare novum nostro de Lumine Lumen.

Dixerat : Occiduo Sydus ab axe mi-  
cat ;

Sydus , in Harvæo quod Magna Bri-  
tannia pandit :

Primus in ignotâ Dux fuit ille viâ :  
Primus detexit veros in sanguine Mo-  
tus ,

Omniaque ex Ovo progenerata docet.  
Huic comitem junxisse cupit molimine  
magno , Ut

Ut stare Medica Lux geminata Polo.  
Multa notabat adhuc densis latitare te-  
nebris,

Quæ trahere in lucem tempora nostra  
jubent.

Condum, qui nitidè Ductus aperiret  
Aquosos,

Quoque modo vadat quilibet, atque  
viâ;

Condum, qui rivos omnes monstrare Sa-  
livæ

Nosset, quoque Oculi Fonte rigentur,  
erat.

Luraque restabant, nostrum quæ par-  
turit ævum,

Quæque brevî, Famâ jam præeunte,  
feret.

um, talem quæ Terra daret, quære-  
bat anhelans,

Eôas relegens Occiduasque plagas,  
Quâque sub Arctois Tellus extenditur

Ursis,  
Quâque ultra metas stat, Capricorne,  
tuas;

um longo tentat varias examine gen-  
tes;

Musarum auspiciis Harderovica dedit.

Au

A u M E S M E.

Beau Rejetton du Ciel , ta charman  
industrie

Descouvre un grand tresor de joja  
precieux.

Qui parent richement la Dive Ana  
mie.

Jupiter la voyant d'un air plus g  
cieux

Paroître, que jamais, brillante & to  
pure ,

En fit pour les Mortels une autre  
nosure.

D. L I E B E R G H E N.



# ANTONII NUCK, SIALOGRAPHIÆ NOVÆ,

## CAPUT PRIMUM.

### *De Ductu Salivali Novo.*

**E** Atendum quidem, in Majorum nostrorum scriptis non contemnenda existare fundamenta, quæ oblivionis aut inscitiae tenebris sepulta fortè manerent, nisi per eorum monita ejusmodi periculum evasissent. Imo contigit aliquoties, ut Prisci illi certas suas notitias traderent, quæ captum nostræ ætatis effugiunt, quia non sat laboris & industriæ in earum investigatione concessum fuit. Interim satis infelices mihi videntur, qui mordicus tenent, Veteres omnia scivisse, omnia tam plana & absoluta ab illis tradita esse, ut nihil possit dici, quod non sit dictum.

Non  
omnia  
Veteribus  
fuere  
cognita.

A                      Etum

Etum prius , nihil ulterius cogitandum , nihil perpendendum restare , omniaque in beato quasi otio collocata esse ; verum hi minimè præfagiunt , venire tempus , quo ista , quæ ante latuere , clarescent ; advenire dies , quibus nos tam manifesta tam aperta nescivisse Majores miramur.

Quod  
in A-  
nato-  
micis  
maxi-  
me ap-  
paret.

Quod , uti passim occurrit in Republica Literaria , nuspiam tamen magis quam in Re Anatomica ; à capite ad calcem , à supremo vertice ad infimum usque pedem , vix aliqua corporis pars oculis subjicitur , cujus admirandam structuram , non longe aliter , quam quidem Veteres , invenerint ; cui utilitatem non longe clariorem & manifestiorem adscripserint , multiplicique experientia comprobant Filii Anatomicorum recentiores. Reliqua ut præteream ; Fontes certè Salivæ dicati , obscurè adeo Veteribus (nobis alioquin summo opere venerandis ) fuere cogniti ; ut glandularum vasorumque ipsis annexorum , verum usum structuram-  
que

que obnubilare magis videantur, quam ut illorum sensu corporali quam possent adferre utilitatem. Non mihi animus est illorum opiniones hic recensere; cum passim illæ in eorum scriptis occurrant; quæ, si cum hujus seculi Anatomicis conferantur, differentiam sumus visuri stupendam. Sic laudabile semper erit, illa in lucem tradere, quibus malè observata corrigantur, & (quod majoris adhuc momenti) nondum observata in lucem edantur.

Multum autem disputarunt Veteres de origine humoris hujus ora rigantis; nihil ipsis vulgatius, quam per *Occultas quasdam vias* à Cerebro hunc deducere; alii à *Nervis*, aut Succo quodam Nerveo prodire putabant; quidam à *Sanguine Arterioso*, osculis suis in os hiantibus, illum deducebant; nec desuere, qui à *Succo quodam*, *Rorifero* dicto, per *Vasa Lymphatica*, eo destinata, originem suam ducere crediderunt.

Quæ omnia tribus verbis refutari

possunt. *Occultas* hic introducere vias , occultum nimis est & iners. Neque etiam ex *Nervis* prodit ; cum nulli nerveum succum adhuc videre, quod sciam , licuerit ; & particulis constat crassioribus saliva , quam ut per angustissimos nervorum canaliculos transire possit. *Qui à Sanguine Arterioso* illum provenire statuunt, vera narrant ; omnia enim , exceptis stercoreibus quibusdam , in œconomia animali ab eo proveniunt ; sed hoc nimis longe petitum. Nec magis id à *Vasis Lymphaticis* expectandum ; cum illa lympham à partibus cor versus vehant , & non contra valvulæ enim in iis ubique obstarent præter quam quod ligaturis contrarium satis manifestè demonstratur.

Veterum Opiniones recensentur ;

Sed videor mihi audire obloquentes, qui tamen ex Veterum scriptis probare conantur, & Priscis omnia illa cognita fuisse ; imprimis adferendo textum *Galen*i lib. IX. c. III. ubi humor quendam deducit per palati foramina. Paulo ulterius ; in palatum ceu in



os foraminibus desinentibus. Lib. XI. c. XIX. idem Galenus hæc habet: *Continent jam in sese meatuum cerebrum purgantium foramina. Et de usu part. lib. IX. c. I. Quid igitur natura non ut palati os, ita & capitis tenuibus foraminibus, quasi cavernulis quibusdam pertudit. Quæ sane omnia adeo obscura sunt, ut nihil certi ex iis erui possit. Foramina enim, de quibus Galenus loquitur, innumera in ore & potissimum palato sunt, pro vase tamen excretorio peculiari non habenda.*

Interim Veterum Patroni ulterius urgendo, ex eodem Galeno, alia adferunt argumenta, magis, ut credunt, stringentia, dum glandulas proponunt, ex quibus hos ductus originem ducere volunt, lib. 3. cap. v. de *Aliment. Fac.* hæc habet: *Ut plurimum vero cum epiglottide & larynge & glandulis, quæ illic sunt: tum iis, quæ Linguae sunt propriæ, Salivam generant; tum iis, quæ sunt ad Paristhmia & Laryngem. Et cap. VI. Tum ea, quæ sunt circa Linguam; natu-*

*ra enim eas Linguae comparavit, ad Salivam generandam.* Possem hic ex eodem Galeno & alios textus allegare; sed qui omnes nihil certi probantes, obscurè nimis lectori obveniunt, & nemo facile ex ejusmodi relatis, veram partium structuram indagare poterit. Unicus tamen prostat locus lib. x. cap. xi. de Usu Partium. *Quæ meatibus non obscuris, agit hic de Glandulis, humidum in oculos effundunt, similiter ac glandulæ, quæ linguae radici adjunctæ, Salivam in os derivant: ubi non pororum, sed ductum videtur facere mentionem.*

Propius tamen accedit 1. *Avicenna*, qui lib. 3. Fen. 6. c. i. hæc habet; *Et sub lingua sunt duo orificia, quæ ambo ingreditur stylus, & sunt fontes salivæ, & isti duo fontes nominantur duo effusoria salivæ; conservantes rorem linguae.* 2. *Arabs, Al-sabaravus*, qui tract. 4. c. ii. ita loquitur. *Et sub ea, de Lingua sermo est, sunt duo orificia, ex quibus procedit Saliva.* 3. *Oribasius* seqq. men-

tem

tem explicat. *Ad hoc autem vinculum utrinque ex obliquis partibus ora vasorum, quæ salivam excipientia dicuntur, invenies, in quæ descendere stylus posset.* Quibus omnibus rectè examinatis, luce meridiana clarius patefcet, aut circa structuram, aut usum, situmve, graviter errasse Veteres. Quòd sub lingua *duo ostia* conspiciantur, verum quidem, sed nimis late sumtum hoc; non enim hic demonstratur ostiorum locus, & idem est, ac si quis diceret; in intestino duodeno ostium ductus pancreatici invenitur: aut in vena subclavia vel jugulari ostium ductus thoracici occurrit; quis mortalium, quæso, ostia ibidem inveniret, aut fidem adhiberet, talia ostia in rerum natura dari; nisi accuratiori descriptione & demonstratione constaret, ejusmodi ostia invenienda esse?

Deinde *salivam excipientia* non dicenda, quum certis experimentis manifestum, eadem ostia magnam salivæ

vim eructare. Ex quibus iterum constat, quantopere in usu partium erratum à Veteribus.

War-  
thoni  
Nova  
opinio.

Adeoque ut jure merito Clarissimus *Warthonus* primus hac in re glanciem frangere cœperit, quum in sua *Adenographia* Cap. *xxi.* Fontium Salivalium rivum aperiret atque describeret primus; sed unicum potissimum desideratur, quod nemo Anatomicorum hæctenus hujus ductus ex Subjecto Humano dederit delineationem: ideoque operæ pretium esse duxi, ex variis cadaveribus hocce vas excretorium accuratius perlustrare, simulque delineatum exhibere: uti ex *Tab. i. Fig. i.* constabit, ubi naturalis Glandulæ & ductus magnitudo ob oculos ponitur.

War-  
thoni  
Ductus  
ex Ho-  
mine.

Magna namque intercedit differentia inter Ductum hunc Salivalem, qui Humani, quam qui Bruti est animalis Subjecti. In Brutis enim animalibus hic Ductus longior, tenuior & arctior est, quam Ductus Salivalis Stenonianus. In Subjecto verò Hu-



Humano hic Ductus brevior & amplior conspicitur Ductu Stenoniano: præterea hic Ductus duabus majoribus ramificationibus ex glandula inframaxillari prodit, quæ coeuntes in unum, truncum constituunt, brevem quidem, sed notabilem fatis, uti ex dicta Figura patet.

Post *Warthonum*, *Subtilissimus Anatomicus*, *Nic. Stenonis*, Anno 1660. alium descripsit Ductum, osculo fatis manifesto in os hiantem, quem præter alios adhuc, sed minores, neque vase peculiari excretorio donatos, *Buccarum*, *Palatinarum*, &c. nomine venientes, continuo itidem humorem Salivalem eructantes, idem observavit *Stenonis*.

Ductus  
Steno-  
nianus.

Sed quandoquidem oculatissimus *Stenonis* Ductum illum, non nisi in Capite Vitulino delineatum obtulit, & alii non nisi admodum, obscure proposuerunt, necessum erat, eundem ductum, ex Subjecto Humano eruere, ut eo melius de ejus ma-

Ductus  
Ste-  
non.  
ex Ho-  
mine. gnitudine, tum Glandulæ tum Ductus, ejusque ramificationibus judicari possit; ideoque ex variis cadaveribus, diversimode Ductum una cum Glandula præparavi, ut ita ex variis collatis, vera ejus constitutio redderetur manifesta; uti *Tab. 1. Figura 11.* demonstrabit.

Hisce acquiêvere Anatomicorum Filii; cogitantes ex quatuor illis rivis (unâ cum iis, quæ in ore inveniuntur, minoribus, palatinis, scil. buccalibus, sublingualibus, &c.) sufficientem humoris salivalis copiam prodire posse, quæ continuò os humectaret, reliquisque usibus, infra dicendis, sufficeret. Sed ecce Anno 1682. in scenam prodit Clarissimus *Casp. Bartholinus*, obscuram novi ductus viam manifestans; dum Glandulam profert Sublingualem, Ductu quodam peculiari, Ductui *Warthoniano* adstiti, prodeuntem.

Ante autem illud tempus Lipsiensis Doctor, eundem observavit Ductum; namque hæc dum meditor, qui-

quidam ex amicis mihi transmittit  
Dissertationem Medicam ; De Dyspep-  
sia , Anno 1679. Lipsiæ habitam  
sub Præsidio Viri Clarissimi *Augusti*  
*Quirini Rivini*, ubi Corollaria quæ-  
dam annectuntur , quorum primum  
hæc habet : *Ductus salivales* , quos  
in capite vitulino præterita hyeme ali-  
quoties demonstravit D. Præses , me-  
rentur illis annumerari , quos *War-*  
*thonus* & *Steno* annotarunt. Oriun-  
tur autem ex anterioribus glandulis  
sublingualibus , in quarum substan-  
tia radices agunt , perguntque supra  
*Warthonianos* immediate ( ita ut his  
cauté separatis conspiciantur ilicò )  
donec unà cum illis egrediantur ex  
iisdem papillis. Diversa tamen sunt  
ostiola , in quorum interiora si stylus  
aut flatus immittatur , ad glandulas  
maiores sublinguales per ductus *War-*  
*thoni* penetrat ; his vero à latere  
alii adstant pori , qui stylum & fla-  
tum in glandulas minores sublingua-  
les deducunt , adeoque nullo modo  
hi ductus cum illis communicant ,  
sed

*sed omninò singulares sunt.* Quicquid sit, ego aliorum litem, meam non faciam; forte *Cl. Bartholinus* Ductum suum invenit, licet nihil quicquam, quod nobis etiam sæpe contigit, de *Cl. Rivino* audiverit.

Verum quidem est, in Subjecto Vitulino, & paucis aliis animantibus hunc Ductum reperiri; sed in plerisque aliis Ductus ille, aut saltem ostium peculiare non occurrit; sic & in Humano Subjecto non (aut saltem rarissimè) conspicitur. Glandula quidem sublingualis ubique ferè invenitur, sed vas excretorium singulare in omnibus subjectis non reperitur. In Equo etiam observat *Warthonus*, Glandulam illam Sublingualem, communicare suis ramificationibus, cum Ductu Salivali à Glandula Maxillari oriundo, in quem salivam suam exonerat; & ita simplici non duplici ostio in os eructat. Quum Locus *Warthoni* notabilis sit, eum hic adjungere placuit, uti profstat Cap. XXI. Fol. m. 120. & quidem



dem hisce verbis : In Equo , circa mediam linguæ longitudinem utrinque aliæ glandulæ conspicuæ , in ductum salivalem sese exonerantes , occurrunt. De quibus forsitan uberius dicetur posthac , quum earum varietates in cæteris animalibus examinatæ fuerint.

In Ovibus idem obtinet , in quibus semper quidem occurrit Glandula Sublingualis , nunquam vero Ductus & Ostium peculiare. Hujus Glandulæ omnes , quotquot ejus sunt ramificationes , in unum quidem coeunt , sed ante exitum subintrant in Ductum Warthonianum , & communi ostio salivam in os deponunt , uti videre est

Ductus  
Bartholin.  
in Ovibus a-  
liter  
constitu-  
tus.

Tab. I. Fig. III.

In Hominibus hujus Glandulæ Sublingualis Ductus adhuc magis obscuri occurrunt ; semper enim simplex Warthoni occurrit ostium , nullamque Glandula Sublingualis communicationem habet cum Ductu Warthoniano , aut ductus adeo exigui sunt , ut visum fugiant. Ad latera tamen

Glandulæ  
Sublingualis  
constitutio  
in Homine.

dicti

dicti ostii non raro exilia occurrunt foramina , ab hac Glandula oriunda , tunicamque sublingualem pertorantia. Unico tamen in casu , hoc anno Duplex inveni Ostium, eodem modo ut in Subjectis Vitulinis; verum non in utroque, sed in altero tantum latere. Quo viso , putabam occasionem mihi datam , hunc Ductum in Subjecto Humano , quod à nemine tentatum , altius examinandi: ideoque Mercurium nostrum Ductulum hunc subintrare curavi , qui saltem furculum unum aut alterum , sed exiguum admodum distendit, idque solum in antica Glandulæ parte, quâ ostium respicit : in reliqua vero & majore Glandulæ portione, ejus ne quidem vestigium occurrebat; adeoque ut illo in casu, ludentem potius consideraverim naturam, quam quod ubique Ductus foret inveniendus.

Ut autem Naturalis hujus Glandulæ Sublingualis magnitudo constaret magis, ejus Figuram hic adjicere æquum duxi , quatenus Conglomerata hæc Gland-

Glandula inferiori suo latere contigue Ductum tangit Warthonianum. Vide *Tab. I. Figuram* 1v; quæ accuratè dictam Glandulam delineatam exhibet.

Si cui interea placeat trium harum Glandularum, unà cum Ductibus delineationem, prout ipse in Subjecto Humano, non ita pridem observavi, videre; inspice *Tab. II. Figuram* 1. quæ explicatum dabit; quomodo arteriæ carotidis & venæ jugularis ramificationes hæc Glandulas, sanguine suo continuò alluunt, atque irrorant.

Glandularum descriptarum situs naturalis.

Sed nec hic *Bartholinianus*, aut si mavis *Rivinianus*, sufficit Ductus; Quartus adhuc alius erat adjiciendus, à nemine, quod sciam, ante me, observatus, quem Ductu peculiari, & ostio satis manifesto, humorem suum in os eructare experientiâ jam sæpius didici; quâ autem occasione eum invenerim, narrabo breviter.

Ductus nostri Novi.

Cum ante tres circiter annos, Ductus Salivales, tam Superiores quam Infe-

Occasio Inventionis.

Inferiores, Ductus itidem Lachrymales, & Vas Excretorium Naribus Proprium, examini meo subjicerem, tum temporis in Subjecto, quod præ manibus habebam, Canino, *Stenonianos* Ductus examinandi causa, potissimum intentus: ecce, præter expectationem, aliud ostiolum, non nisi ad distantiam duarum vel trium Linearum Mathematicarum á *Stenoniano* dissitum, in altero se prodit latere, stylum immissum non nisi in ipso principio admittens; incertus itaque viam ulteriorem variè exploro, modo sursum, modo deorsum, mox iterum antrorsum & retrorsum, tandem rectâ quasi lineâ oblique sursum tendere stylumque ad latitudinem pollicis admittere observavi. Rei novitatem tamen non admirabar, & Naturam, sit venia verbo, (quæ in variis ludere solet) ludentem considero, minime cogitans, quod in opposito latere simile conspiciendum foret ostiolum; in quod, uti in priori, ubi stylum immitto,



mitto, ad eandem etiam distantiam  
substitit stylus : interim occupatio-  
nes aliæ aliò me vocabant; qua-  
propter in inquisitione horum tum  
temporis ulterius non insudavi; ve-  
rum in proxime subsequenti subjecto  
canino attentiore mente illa exami-  
ni subjienda æquum duxi. In Ca-  
ne itaque majori, primo statim in-  
tuitu, Ductus hujus osculum in uno  
& altero latere se prodit, haud ab-  
simili modo, ut in priori subjecto,  
stylum tamen paulo altius, quam  
quidem in priori (canis enim erat  
major) admittebat; postmodum in  
aliis subjectis caninis horum osculo-  
rum Ductuumve inventio adeo facilis  
fuit, ut primo statim intuitu illa ap-  
paruerint; ideoque necessum non  
habeo plurimis subjectis illud con-  
firmare, nec etiam opus fuisse pu-  
tabam oculatos adduxisse testes, cum  
ipsâ autopsiâ cuique curioso manife-  
stum esse possit : nec etiam primo  
inventionis tempore aliis communi-  
cavi; quod, uti sæpius jam vidi-  
mus,

mus, aliorum plumis superbire plurimi soleant.

Ductus  
Novi  
Origo.

Originem hujus Ductus quod spectat, oritur à Glandula intra orbitam cranii (ubi pro oculis locum facit) sita, musculum intra oculum abducentem, & ossis jugalis partem supremam, ubi ex hoc Glandoso corpore plurimis furculis in unum Ductum coit (quod melius conspicitur, si ossis jugalis processus confringatur) & rectâ lineâ propè os maxillare, externè tamen deorsum tendit, ubi osculo suo quam proximè secundum dentem molarem, (à posterioribus numerando) superioris scilicet maxillæ, se manifestat, in suprema gingivæ parte; ut ex Tab. III. Fig. 1. patebit.

Glandula  
Novæ  
Magnitudo.

De Glandulæ hujus *Magnitudine* facile ex adjuncta Tab. III. Fig. 2. simulque de Ductus Longitudine judicari potest; Magnitudo alioquin ejus Pondere si æstimetur; observavimus Glandulam hanc pendere Dragma dimidiatam aut Scrupulos

los Duos , & rarius hocce pondus excedere.

Glandulæ *Figuram* quod spectat , Glandulæ  
Figura.  
ea subinde variare solet ; in nonnullis enim oblongior , in aliis depressæ profunditatis , in quibusdam ad figuram ovalem , vel etiam nonnunquam ad Triangularem accedit , uti Tab. III. Fig. 3. monstrabit.

*Vasa* , quæ Hæc Glandula obtinet , præter Vas Excretorium , quadruplicia sunt ; *Arterias* quippe à Carotide habet , *Venas* à Jugulari , *Nervos* à Nervis Oculorum Motoriis possidet , *Lymphatica* eam habere , vix dubitare licet. De Vasis tamen Sanguiferis aliqui dubitarent , quoniam ad oculum sæpe non satis apparent , verum ea plurimis furculis per hanc glandulam dispersa esse , vel ex eo constat ; si in strangulato animali statim post strangulationem Glandula examinetur , ubi minima etiam vascula sanguine videbis turgidula ; causa autem , cur tum temporis magis turgeant , hæc videtur. Quod

strangulationis principio venæ jugulares statim constringantur ; arteriæ vero colli profundiores sitæ & inter musculos latitantes , tunicasque insuper crassiores habentes , sanguinem superiora versus motum , tardius paulo transmittant ; adeo ut dum ad vasa venosa , jam constricta transire sanguis non potest , necessario vel minimi arteriarum capillarum furculi repleantur , & in tantum distendantur , ut colore sanguinis rubicundo tincti , ad oculum perquam satis appareant.

Expe-  
rimen-  
tum in  
Cani-  
bus.

Extra strangulationem idem experiri licet , si Carotidis Ramus hanc versus Glandulam tendens , coloratâ aliquâ tincturâ repleatur ; quo experimento non minus quam ante , ramorum subtilissimorum ramificationes patefient. Quomodo autem Surculi hi Arteriosi contigue procedentes cum ramulis Ductus Salivalis conjungantur , eosque , hederæ arborescentis ad instar , ambient spectaculo curioso conspicitur , si h  
atqu



atque illi diversi coloris cerâ , mediante Siphone , repleantur : uti *Tab. III. Fig. 4.* notabit ; ubi *Ductus Stenoniani* ramulos Arteriarum furculis associari videmus , eodem fere modo , uti arteriam hepaticam ramulos venarum portarum concomitari observamus ; in quibus tamen experimentis faciendis notandum , quod in ejusmodi injectionibus liquatæ ceræ , multum olei debeat admisceri ; ut cera , eo fluidior reddita , subtilissimos arteriarum ramulos subire posset.

An autem Anatomicorum ullus Ductus hic Novus antea fuit incognitus. Novi hujus Ductus fecerit mentionem , fateor me ignorare ; hoc tamen scio , nihil de eo , tum apud majoris nominis Veteres , tum apud Neotericos exstare , quamvis hi atque illi sæpius dicant , se non dubitare , quin præter inventos jam Ductus alii adhuc restitent aliis indagandi ; cæterum certi nihil de iis proponentes.

Nostro igitur hoc Invenito Nu-  
B 3 me-

## 22 *De Ductu Salivali Novo.*

Voca-  
tur hic  
Du-  
ctus,  
Saliva-  
lis Su-  
perior  
Alter.

merum Ductuum Salivalium adau-  
gendum judicamus Pari Quarto;  
quod, ad differentiam Ductus Ste-  
noniani, sive Salivalis Superioris,  
vocabimus *Ductum Salivalem Supe-  
riorem Alterum*; non quod usum  
ipsi adscribamus à reliquis diversum,  
quin una cum illis destinatum pu-  
tamus, ad viam parandam, qua perpe-  
tuò humor Salivalis in Glandulis se-  
paratus, os versus amandari possit,  
ut eo humectetur, esculentis admif-  
ceatur, gustum promoveat, cibo-  
rum comminutionem adjuvet, & quan-  
do necessitas requirit, copiosior per  
has vias salivæ quantitas excernatur  
uti in Salivationibus sponte obve-  
nientibus, aliisque arte excitatis ali-  
quando ex usu esse potest.

## CAP. II.

*De Saliva.*

**M**agni momenti in Oeconomia Salivæ in Glandulis Secretio quomodo? Animali occurrit dubium: Quomodo scilicet *Humoris Salivæ* in Glandulis fiat *Secretio*? Alii enim à varia particularum & pororum proportionem illud deducunt; verum hæc opinio multa adhuc alia requirit, uti inferius, ubi de modo secretionis agitur, clarius patebit. Alii iterum mediante quodam *Fermento* hoc peragi putant: hanc opinionem qui amplectuntur, à *Succo Nervoso* hoc expectant, confidendo, quod nervi numero plures glandulis inferantur, quam quidem ad motum illarum & sensationem requiruntur; quod insuper variæ corporis partes sint, quæ plus nutrimenti ac glandulæ accipiunt, etiam exquisitissimam (non obtusam, ut glandulæ) habentes sensationem: quæ præterea adducunt, quibus suam

stabilire student opinionem , hic recensere nimis longum foret ; eoque libentius ea omittimus , quod apud Neotericos quosdam quisque veritatis indagator ea ipsa inveniet ; tum quod facili experimento horum hypothesis destrui possit.

Expe-  
rimenten-  
ta.

Si ligatura injiciatur in nervum ad Glandulam tendentem , aut transversim disseccetur nervus , non tamen ideo Secretionem cessare observabimus , sed tardiores solummodo & magis lentam procedere. Quis , quæso , fermentationem concipiet & regularem in subtilissimis vasorum canaliculis , ubi moram nullam necit , sed transitus momentaneus est ?

Nostri  
opinio.

Nos aliud supponimus , existimando Succum hunc Spirituosum necessario accedere debere , & copia quidem majori , quam in multis aliis partibus , tum quod subtilissima glandularum vascula ( varios cincinnos conformantia , ne sanguis in motu subsisteret ) subeat , tum ut tranantis sanguinis velocitatem acceleret ,

&



& tradendo spirituosum hunc humorem damnum illud refarciatur; quod ex separata jam Lympha & Saliva amiserat glandula, quibus necessario sanguis etiam venosus (alias particulis suis maximè flexibilibus orbat) in motu suo continuare debet.

Alio itaque modo hanc *Secretio-* Modus Secretionis explicatur ulterius.  
*mem* fieri necesse est; sanguis namque arteriosus, variæ magnitudinis & figuræ particulis constans, in glandulas has delatus (sive illud fiat à subsequenti sanguinis protrusione, sive partium ambientium pressione) ulterius propellitur, donec pervenerit ad angustissimos glandularum canaliculos, ubi tum poruli occurrunt, diversæ ab invicem figuræ & diametri, quorum hi unius, alii alterius generis particulas suscipere apti nati sunt; Salivalis Humor porulos Ductuum Salivalium, Lymphaticus vero, particulis constans magis flexibilibus, Ductus Lymphaticos subit; Reliqua autem massa, cujus

B 5

parti-

particulæ ejusmodi conditiones non habent, per patentiores vias, Venas scilicet, transmittitur; non tamen quod statuendum sit, omnem humorem Salivalem & Lymphaticum à venoso sanguine tum temporis separari, sed necessum fuit, motu suo rapido multum Salivalis & Lymphatici humoris sanguini remanere permixtum, & cum reliquo sanguine, moram ibidem non nectente, cor versus tendere, ut subsequenter sanguinis circuitibus nova iterum materia supeditari posset.

Rei hujus veritas vel ex eo constat, quod venarum harum ligatura copiosiore nobis dabit Salivæ Secretionem; sanguis quippe tunc circulatione impedita, ab arterioso sanguine à tergo arietante, omnes tali modo figuratas particulas deponit in Ductus Salivales transmittendas: pro cujus confirmatione varia possent adduci experimenta; sed unicum instar multorum erit, peritioribus Anatomicis cognitum: Venis Jugularibus, sub-

Tubducto filo in cane arcte ligatis, non solum lachrymas copiosius prodire, sed & salivam tam copiose profluere, ac si Mercurio assumpto fluxus ille concitaretur; quod non aliunde, quam ab impedito sanguinis ab arteriis in venas circuitu.

Interim *Separatio* hæc, ut legitime procedat, varia particularum & pororum requiritur proportio; nunquid manifestum satis, confusam miscelam Granorum Milii & Hordei commode per cribrum separari? Per Corii & Ligni poros Aqua transit & Oleum, minime tamen Aër: Abdomen cujusvis animantis bruti, ope Syphonis per processum peritonæi, aquâ quadam diureticâ (E. G. Tincturâ Theæ) si repleatur & distendatur totum; viginti quatuor intra horas per insensibilem transpirationem aqua omnis dissipatur. Si vero abdominis cavum aëre summè distendatur; per aliquot dies aërem tamen ibidem remanere experienciâ didici. Auri porositas Mercurium admittit, quæ

Reque-  
sitâ Se-  
cretio-  
nis.

lam quandam sive pelliculam adhærere internæ uveæ parti, ubi foramen pupilla dictum conspicitur, qua interveniente radii ab externis objectis procedentes, ad retinam usque nervumque Opticum penetrare nequeunt.

Non tamen ubique eodem modo sese habet: Aliquando enim pupillam ex parte tantum pellicula tegit, subinde ad medietatem usque eam obumbrat, imo nonnunquam totam obscurat.

Quandoque malum in ipso humore crystallino hæret, cujus antica superficies opaca reddita colorem mutat, salvo manente humore aqueo.

Affectus hic pro Cataracta ab imperitis habitus, Cataracta proprie non est, sed Crystallini humoris obstructio à particulis terrestribus, nulla arte tollendis, ortum trahens.

Membranæ istius colores multum inter se variare solent: aliquando enim albicanti, nonnunquam gryseo,  
sub.



subinde vitreo, quandoque flavo, mox viridi, colore prædita conspici-  
tur; sæpe chalybis aut castaneæ co-  
lorem æmulatur, & non raro nigri-  
cat. Melioris autem notæ membranæ  
sunt quæ lividæ, & perlarum instar  
coloratæ videntur.

Notandum interim hoc loco ve-  
nit, quod Iris in Cataracta laboran-  
tibus aliquando, veluti in sanis, con-  
trahatur & dilatetur. Subinde vero  
aut contracta aut dilatata, firmissime  
cum ipsa Cataracta conjuncta immo-  
bilis maneat, unicumque quasi cor-  
pus efformet. Id quod facile explo-  
ratur, si palpebræ clausæ leni frictio-  
ne agitentur, iisque apertis oculus  
subito inspiciatur.

Antequam Cura instituatur, exa-  
minandum, an Cataracta sit inci-  
piens, an vero confirmata.

In incipienti, externe singularem  
usum habet Infusum Croci Metallo-  
rum, ut & sanguis columbinus cali-  
de adhibitus. Vel

℞. *Succ. express. Chelidon.*

*Fæ-*

se ; hâc tamen quantitate non semper & ubique os versus demandatur ; aliqui enim , non nisi singulis bihoriis Unciam tantum deglutiunt , alii iterum plusquam Duas Uncias , duarum horarum spatio , deglutiendo ventriculo tradunt ; quibus satis constat, tantam Salivæ quantitatem , præterquam ori , etiam ipsi ventriculo , ut & toti intestinali tubo , virtutes suas communicare.

Quo  
tempore Se-  
cretio  
copio-  
sior  
fiat ?

Hæc autem , de qua loquimur , Secretio de die fit , & quidem copiosissimè , cum cibum sumimus ; nocte verò , quamvis non plane cessat , multo tamen minori copiâ influere solet , & quæ de die singulis bihoriis quantitate Sesquiunciæ prodit , de nocte vix Unciam Dimidiatam adæquabit ; quod autem os nocturno tempore tantillum saltem accipiat , vel ex eo manifestum , quod in statu sano , tempore somni , nulla deglutitio fiat , & deglutitione non contingente , difficile quid versus ventriculum propellitur ; non tamen  
tunc

tunc temporis (uti dictum est) in totum cessat illa Secretio, quia os ipsum humore quasi inunctum madere videmus.

Imo aliquando, licet rarius post potum liberalius assumptum, de nocte Salivæ Secretio copiosior contingens, tantam parit dormienti molestiam, ut subitaneo modo expergefactus, & suffocationi proximus, necesse habeat, copiosam ore exceptam salivam exspuere; quod tamen non contingeret, si eodem, quo de die, modo deglutitio procederet.

*Quod autem Nocte minus secernatur*; à variis dependet causis, sanguinis namque motus circularis tum temporis tardius procedit, consequenter Secretio minor, motus musculorum (imprimis linguæ) maximam partem feriatur, hinc & glandularum pressio minor; insuper & animi motus (qui multum etiam hoc in casu valent) plurimum tum temporis cessant. In nonnullis tamen

Cur  
Nocte  
Secretio fiat  
minor?

cor-

corporibus (sed morbofis) Humor Salivalis exiguâ admodum quantitate subinde prodit, quum nimirum in ipsis humidi est defectus; aut quod illorum massa sanguinea multis sca-  
teat particulis viscidis & tenacibus, facile obstructions causantibus, alia-  
rumque partium secernendarum viam præcludentibus, vel quod Diarrhœa diuturniori, vel Diuresi frequentior afficiantur; aut quod ipsâ Insensibili Transpiratione copiosiore multum humidi excernatur; aut Ductus ipsi post sanata ulcera, aut vulnera cicatrice aliquâ claudantur, vel denique si Salivales Ductus materiâ aliquâ calculosâ obstruantur; aut quod Lapilli in iis geniti Salivæ viam præcludant; in quibus & similibus casibus non raro materia, Salivæ destinata alio demandatur, aut parcius secernitur.

Unde  
copio-  
sissima  
Salivæ  
Secretio?

E contrâ hæc Salivæ Secretio *ali-*  
*quando copiosa* adeò, ut morbi, hæc  
mediante, sponte quasi solvantur  
sicuti & nonnunquam arte eadem co-  
pious



piose provocatur , dum Medicamentis Mercurialibus aut Inunctione , aut Fumigatione promovetur. Ita nuperrime patienti Pilulas Mercuriales obtuli devorandas , qui decem dierum spatio Triginta circiter Libras hujus humoris salivando reddidit: Mercurius namque vel maxime exiguos glandularum canaliculos intantum aperit , ut excretio fiat satis copiosa; Sanguini enim communicatus Mercurius , & in innumeras particulas orbiculares divisus , ad omnes pororum configurationes sese accommodat , saliumque aciculas , ubique hærentes , confringit ; quibus locomotis , plurimæ obstructions tolluntur , iisque sublatis , tota materia morbifica per tubulos Glandularum Salivalium delata , patentiores jam invenit vias , quibus facilius in os fluit , & foras amandatur.

Lues autem Venerea sola non est , quæ usu Mercurialium , salivam moventium , sæpe pellitur tota; Capitis enim Dolores , Vertigines , Manias ,

nias, Epilepsias, Ulcera, Arthritides, Scorbutum iisdem Mercurialibus sublata aliquando fuisse Clarissimi Authores testantur. Imo Asciten tali modo curatam fuisse notant exemplo singulari Eph. Germ. Dec. 2. Ann. 4. pag. 91.

In-  
tempe-  
stivi  
Mercurialium  
usus  
moxa.

Quicquid agitur, prudenter tamen agendum, ne intempestivo Mercurialium usu mors inopinata aut Ptyalismus lethalis subsequatur; cuius notabile exemplum prostat in Ephem. Germ. Dec. 2. Ann. 6. pag. 204. Patiens, inquit Author, xxxv annorum, Scabie totius corporis laborans, à muliere medicastra cingulum pro eâ citius curandâ, ex panino rubro confectum emit, neglectisque aliis remediis, statim eo se circumcinxit. Post biduum omnes oris partes, lingua, fauces, palatum, gingivæ & labia ipsa cum dolore ulceroso & phlogosi ita ipsi intumuerunt, & tanta viscidorum humorum copia confertim ex ore emanavit, ut viis propemodum interclusis,

clusis, nec loqui, nec cibum aut potum assumere, nec respirare posset; quin imo facie in immensum auctâ, & lividitate perfusâ, suspensi hominis instar, ilico suffocatum iri videretur. Hic tamen cingulo avulso, renâsectione instituta, variisq; oblati medicamentis octiduum intra repositus.

Verum copiosa hæc Excretio non solum post oblata Mercurialia contingit, sed & in Febribus, Melancholia, Sputo Sanguinis, &c. aliquando fieri solet. In Febribus, potissimum Quartanis, ut & Melancholicis Affectibus, ubi sanguis crassitie suâ peccans, & tardius per Glandularum Salivalium canaliculos motus, necessario in vasorum extremitatibus moram aliquam debet necere, & copiosiore Salivæ Materiem suppeditare.

In Sanguinis Sputo idem fere notandum, ubi sanguinis spirituosum non parum, massâ suâ, frequentiore Salivæ Sputo, orbata, quod remansit

Cur  
copio-  
sa in  
Febri-  
bus,  
Melan-  
cholia  
&c.

reliquum , in motu suo tardius si  
 necesse est , & consequenter Salivæ  
 Secretio major ; uti illud nuperrimè  
 in Viro quodam Literato videre ad  
 huc contigit ; cui , postquam per al.  
 quot dies sanguinis uncias tres qua-  
 tuorve tussiendo reddidisset , sexie-  
 ve aut pluries , modo in brachio  
 modo in pede , vel manu secta ven-  
 fuisset ; Sanguinis Sputum quiden  
 cessavit , sed Salivæ Secretio Spu-  
 tum hoc Sanguineum subsequuta e-  
 tam copiosa , ut per quatuordecim  
 circiter dies , quotidie uncias triginti  
 sex , sive pintam unam cum media  
 salivando redderet ; quod quiden  
 ægrum multum debilitavit , attamen  
 ab imminente periculosissimo affectu  
 ferè liberavit.

Non raro tamen à copiosa ex o  
 Salivæ rejectione virium sequitur d-  
 bilitas , & subinde tanta , ut patie-  
 tes animam agere videantur ; u  
 Practici varii experienciâ didicero  
 confirmaturque exemplo Fœminæ  
 cujusdam , cujus historia videre est  
 Ephes



Ephem. Germ. Dec. 2. Ann. 4. pag.

207.

Aliquando *Salutaris* adeo est *Critica* illa *Salivatio*, ut morbi (alioquin admodum periculosi) eâdem fuerint sublati. *Phthysicam* Ptyalismo spontaneo septem dies perdurante, sine ulla Mercurialium Medicamentorum exhibitione restitutam legimus *Observ. CXXII. Miscell. Medic. Physic. Anni. 1. In Capitis Dolo-* *Critica Salivæ Excretio aliquando Salutaris.*  
*re, Odontalgia, Gravi Auditu, &c.* sæpe levamen attulit. A *Febri Ar-*  
*dente*, ejusmodi Criticâ Evacuatio-  
ne quendam liberatum fuisse, dicit  
*Blegni* in suo *Zodiaco Medico Gal-*  
*lico.*

Quæritur, *Quare hic Humor Sa-* *Quare Saliva*  
*livalis, non æque per Ductus Pan-* *non per*  
*creaticos, quam Salivales excerna-* *Ductus*  
*tur?* Resp. Hoc iterum dependere *Pan-*  
à particularum & tubulorum diversa *creati-*  
configuratione, quibus Saliva à Pan- *cos ex-*  
create & Lympha Pancreatica Glan- *cerna-*  
dulis Salivalibus excluditur; si vero *tur?*  
tenuior sit Saliva, & obstructions in

Glandulis Salivalibus pertinaciores sint; tubuli Glandularum Pancreatis magis aperiuntur, & Salivalis Humor, una cum Lympha Pancreatica, intestinum versus amandatur, & cum alvi excrementis excernitur, uti aliquando contingit, quibus Lue Venerea affectis Mercurialia offeruntur.

Saliva-  
tionem  
pro-  
moven-  
tia.

Eandem Salivationem etiam promovet *Tabaci Usus*, sive illud masticeatur, sive fistula sugatur, quibus horæ quadrantis spatio, facile uncia integra Salivæ (potissimum in iis, qui ejusmodi suctionibus assueti non sunt) fecernitur; partes namque Tabaci subtiliores & magis volatiles, in vasa Glandularum excretiora penetrantes, ea ipsa irritare, particulasque viscidas hinc illinc hærentes incidendo, Humoris Salivalis Secretionem promovere valent, copiosiore etiam exspuunt Salivam, quod multum loquantur Tabaci Suctores, & copiosiore potum assumant.

Dum genio ita suo indulgent  
Her.

Herbæ hujus Amatores, evenit, ut multi excrementitii humores una cum Saliva, in nonnullis cum *Dyspnoea* excernantur, quamvis in aliis iterum nocivus adeo Tabaci Usus sit, ut continua hæc Salivæ exspuione, massam sanguineam reddat in motu nimis tardam, appetitum destruat, *Dyspnæam* aliaque mala inducat.

Quantum interim partes volatiles *Sternutatoria* quid faciant? misce in casibus valeant, ex ipsis *Sternutatoriis* satis manifestum est, misce enim Salivæ Secretio etiam copiosior causatur, quoniam horum usu Glandulosæ narium Partes non solum afficiuntur, sed & proxime adsitæ, uti sæpe videmus horum usum simul lachrymarum involuntariarum copiam producere, & quid valeat hac in re *Reginæ Hungariæ Aqua* (*l'Eau de la Reine d'Hongarie*) non est, quod ulteriori ratio-  
cinio ostendam, cum quotidie nobis occurrant illi, qui ex phialis suis hoc spiritu repletis, nimium

per nares attrahunt.

Unde  
Fre-  
quens  
Sputa-  
tio in  
Angi-  
na.

Faucibus affectis v. g. *Anginâ*, aut alio quocunque morbo, frequens sæpe suboritur Sputatio, quæ tamen non à suborta hac Inflammatione (quæ potius obesset Secretioni Salivalis Humoris) sed à Deglutatione præpedita procedit; ob molestiam enim, quam his in casibus in Deglutiendo percipimus, facilius Salivam, in Glandulis secretam, expuimus.

Quare  
post  
Oscita-  
tionem  
os Sa-  
livâ a-  
bundat.

Ad *Oscitationem* proni, post eam sæpe experiuntur, Os Salivâ abundare; quod non aliunde, quam quod musculis, quibus Oscitatio peragitur, simul & Glandulæ & Glandularum Ductus Salivales comprimantur; unde omnis, quæ in iis continetur, Saliva, os versus demandatur. Idem etiam contingit; si Ductuum Stenonianorum ostia in os hiantia angustiora sint, unde ipsi Ductus dilatantur, & sæpe modica quantitas Salivæ in iis asservatur; qui jam ejusmodi Ductibus gaudent, dum ore patu-



patulo ab interna parte Ductus me- Quomo-  
do ali-  
quibus  
rivulose  
ex ore  
prodeat  
Saliva.  
liante lingua, externè vero & Glandula & Ductus comprimatur, sæpe jucundo spectaculo os extra ad aliqualem distantiam profilit Saliva: imo aliquos novi, quibus solâ Glandulæ Ductusque Stenoniani compressione, ex patenti ore rivulose prodeat Saliva: aliter tamen res sese habet, dum esculentorum aut potulentorum gratiorum aspectu os Salivâ madet (Belgice dicimus hoc, *Wattertanden*) hoc enim à copiosiore spirituum in Glandulas influxu & linguæ motione causatum.

Naturalem & quatenus in sanis Naturalis Salivæ constitutio. corporibus invenitur, conditionem Salivæ quod spectat, eam ex sequentibus colligere licet: Vitro excepta per diem si reservetur, inspidam (quatenus linguâ dignoscimus) eam percipimus inodoram, viscidam parum, turbidam, & instar feri lactis, pallidi coloris conspicuam; spuma supernatans plurimis bullulis permixta, in superficie per quatuor, quin-

quinque & subinde per sex dies remanet, sed statim, ac vitro fuit excepta, sensim & sensim sedimentum albicans (externe materiam purulentam referens) fundum petit.

Per Salivam autem hic intelligimus, quod Græci *σίαλον* vocant, sive illum humorem, qui *αὐτομάτως* per Ductus Salivales in os fluit; non vero illud *πύσμα* sive Sputum, quod cum excreatione rejicitur: qualis distinctio hic locum habere debet, quamvis hæ voces non semper distinguuntur, quoniam illud, quod ore ordinario rejicitur, Sputi & Salivæ mixtura est.

Saliva  
Chymice  
examina-  
tur.

Naturaliter ejusmodi constituta Saliva, post levem particularum inter se agitationem, cum quam plurimis liquoribus tum acidis, tum alkali-  
bus, variisque spiritibus hæc sese admisceri patitur Saliva: sive enim cum Urina, cum Sale Absinthii Liguato, Liquore Tartari, Aqua Forti, Spiritu Salis, Spiritu Nitri, Spiritu Nitri Vitriolato, Oleo Sulphuris,

Sulphuris , Oleo Vitrioli , Spiritu Salis Volatilis , Spiritu Urinæ , Spiritu Volatili Cornu Cervi , Spiritu Volatili Sanguinis Humani , Alcohol Vini , five , inquam , horum aliquo admisceatur Saliva ; expertus novi , post leniorem luctam , sese omnibus & singulis associare & de colore parum tantum mutatum iri.

Hoc tamen observavi peculiare ; mistam cum Oleo Sulphuris Veteriori flavescentis coloris evadere ; quod non item contingit , si cum Oleo Sulphuris per Campanam miscetur. Cum Spiritu Nitri Veteriori juncta , odorem gratum spirat ; sed cum Spiritu Nitri Recenti non item ; cum Spiritu Salis Volatilis mista , Saliva Lactis tenuioris instar apparet ; & Butyro Antimonii si jungatur , in totum lactescit , Cremorisque Lactis faciem induit.

Interim cum spiritu uno & altero etiam hanc sese non combinare observavi ; cum Spiritu enim Ligni Guajacini mista , supernatat Saliva :  
con-

contrarium vero apparet , si cum Sale Volatili Oleoso jungatur , ubi fundum petit Saliva , supernatante Sale Volatili. Spiritui Therebintina minime associatur ; hic enim , ab admista Saliva , in globulos quam plurimos abit.

Lue  
Vene-  
reâ af-  
fecti  
Saliva  
exa-  
mini  
subji-  
citur.

Eosdem Liquores , Spiritus , Olea , &c. jam dicta admiscui Salivæ cujusdam , Lue Venereâ infecti post sumtum Medicamentum Mercuriale copiose salivando Salivam reddentis : hujus itaque Salivam de particulis Mercurialibus participantem examini nostro subjeci , eaque cum Oleo Sulphuris Vetustiori juncta , grisei coloris evasit , & ingrati odoris ; cum Oleo Vitrioli , urinosum & ingratum spirabat odorem : cum Spiritu Nitri , Musto haud dissimilis , quod ad colorem , evasit ; & hinc illincque per mustum volitare corpuscula quædam exigua visa sunt : cum Sp. Nitri Vitriolato mista hæc nostra Saliva , instar lactis tenuioris apparuit , odoris non ingrati ; cum

Aq.



Aq. Forti , acriter nares feriit , & colorem ex flavo rubicundum exhibuit : cùm reliquis vero aut nullam , aut nullius momenti mutationem subiit.

Hiscæ minus contentus , Salivam <sup>Saliva ulterius exami-</sup> hominis sani altiori examini subjiciendam æquum duxi ; ideoque ex Retorta vitrea lento igne destillationem institui. Primo statim momento (dum igni incalesceret Saliva) in plurimas abiit bullulas ; quibus sensim & sensim dissipatis , statim novæ , sed non adeo copiosæ in superficie conspiciebantur ; idque ad finem distillationis perduravit , destillando itaque è Duabus Unciis cum semisse Salivæ , Duas extraxi , quæ insipidam claramque Lympham præsentabant : Residuum , quod in Retorta supererat , ad Drachmas scilicet tres , materiam purulentam tenuiorem , & non nihil viscidam præ se ferebat , quæ gustu explorata , de acredine non nihil participare indicabat.

Hoc

Hoc ex Retorta superfluum , insuper cum Aqua Forti , Butyro Antimonii , Sale Volatili Sanguinis Humani , Spiritu Nitri , Sale Absinthii Liquato , Liquore Tartari , &c. miscui ; verum hoc inter , & admista , vix ullam licuit deprehendere mutationem ; sed eadem observata , quæ de Saliva supra diximus ; nisi quod mistorum lucta subinde paulo fuerit major.

Sed neque hæc Experimenta sufficere posse credebam ; quare & uncias duas Salivæ evaporandas esse judicavi , ut ejus Caput Mortuum examinari posset : evaporatione peractâ , grana quinque materiæ fusci coloris , linguam acore ferientis , remansere ; cui plurimas particulas scintillantes , hinc inde permixtas , vidi ; hanc igitur massam cum variis iterum miscui liquoribus , ut , Butyro Antimonii , Spiritu Nitri , Sale Absinthii Liquato ; verum mutationem notabilem , præterquam in supra dictis , observare non licuit.

Hiscæ

Hiscæ interim constat, quod, licet inter Salivam & nonnulla alia, aliqua observetur lucta; cum plurimis tamen exactè sese misceat, adeoque concludendum, quod ori excocta aut ventriculo tradita, cum quam plurimis, (si non omnibus) & esculentis & potulentis jungi commode possit, quibus pro universali mentitruo inservit.

Non tamen judicandum, simplicem liquorem & phlegma esse inutile salivam, sed varii generis particulas in se continere; quin præter jam elictas, particulæ scintillantes etiam valent in se continere nos docent; præterea, quod Mercurii mortificationem eadem promoveamus; particulas Oleosas Acidis permixtas adesse necesse est: ad lapides projecta, eos tingit maculis albis, ac si Aquâ Forti fuissent tacti; unde de ejus aciditate judicari poterit. Lac Vaccinum dum excoquant ancillæ, si inter coquendum illud gustaverint, & deinde cochlear Salivâ adhuc madidum

Saliva  
tan-  
quam  
Univer-  
sale  
Men-  
struum  
est.

Quibus  
parti-  
bus con-  
sistat Sa-  
liva,  
disqui-  
ritur.

didum iterum lacti immiserint ebullienti, observatum est, lac hoc secedere, non aliter ac si liquor plane acidus fuisset admixtus; certo indicio, ab Acido in Saliva contentum hoc provenisse. In canibus Rabie Hydrophobicâ laborantibus vitia est adeo Saliva, ut pro veneno habetur, & homines etiam inficere possit; hinc constat, alias adhuc præter flexiles, habere particulas quod vulnus, etiam levissimum, cane rabido morfu inflictum, edocet, utpote periculi plenum & difficillimæ curationis; & qui lascivius cum infectis oscula miscuere, expectati norunt, quanta ex iis contraxerint incommoda.

Historia à Cl. *Ledelio* Eph. Germ. Dec. 2. Ann. 6. p. 149. propositam rem declarat manifestè. Pusio, inquit, trium septimanarum, vegetus, sanusque habitus, derepente corripitur singultu, colore, vigiliis inquietudine; dum singultio, & crebra Sternutatio adest. Quæritur Consilium

Quarta-  
nâ La-  
borantis  
Vitiata  
Saliva.



ium , inquiritur in causas , & re bene  
perpenſa , nulla invenitur niſi hæcce :  
Vetulam , quæ erat à miniſterio puel-  
li , invaſerat Quartana ; hæc pulmen-  
tum infanti ſubminiſtrans , prius ori  
proprio ingeſſerat , & ſingulum præ-  
mium deguſtarat ; dein ori infantis  
commiſerat , fermento febrili inquin-  
atum , & hinc illæ lachrymæ.

Sic & alio modo eadem Saliva à Saliva  
vitioſa.  
naturali conſtitutione multum quan-  
titate defleſcit , & pro inſipida fit  
aſa , vel amara , vel dulcis , vel  
acida : ſubinde etiam colorem depo-  
nit , & ex albo fit crocea : pro aquea  
crassa , viſcoſa evadit ; imo & Ver-  
miculi in eadem viſi , ut teſtatur  
*Clariffimus Dolæus* (Miſcell. Med.  
Phyſic. Ann. 9. & 10. Obſerv. cxxx1.)  
qui Swalbachii Hamburgensem Scor-  
buticum vidit exſpuentem Salivam  
valde foetentem , & plurimis Vermicu-  
is ſcatentem.

Salivam plane Lacteam vidit Pra- Saliva  
La-  
cteæ  
cticus hujus Civitatis feliciffimus.  
Gœmina enim , inquit , puerum la-  
D Etans ,

ctans , gravis iterum fit , & ideo puerum ablaetat ; exsuctricem negligerenti mammarum dextra insignem tumorem abit , & brevi post , nocte quadam , copiosum lac cum dolore in os proflire sentit , cum subitanea mammæ dextræ detumescencia ; lac autem ore ita exceptum sine ullo incommodo deglutit , hocque jam per quatuor menses continuat.

Unde  
Saliva  
La-  
ctea ?

Sed quæritur jam , unde illa mammæ detumescencia ? Non aliunde meo iudicio , quam quod massæ sanguineæ , copiosissimo chylo gravidæ chylusæ ejus particulæ mammarum tubulis lactiferis , jam ante collapsis non potuerint excipi ; sed iisdem primo mammarum Glandulæ , potissimum vasa ejus arteriosa fuerint repleta , quæ summè distenta & plerumque accipere nescia , in tumorem assurrexere. Chylusæ vero lacteæque particulæ per reliquum massæ sanguineæ copiosissimè distributæ , in varias partes , potissimum Glandulosas arduas , & nullas , præter Salivales

con

convenientiores invenientes, easdem  
ne notabili obstaculo permearunt.  
Interea sanguis, propter motum libe-  
riorem & velociorem, particulas  
Chylosas in mammis hærentes pro-  
pellit versus vasa venosa & ita ad  
cor; hinc mammam detumescere ne-  
cesse est.

Omniū autem rarissimam Obser-  
vationem Ephem. Germ. Dec. 2.  
Ann. 4. p. 311. habent, ubi Cl. Saliva  
in Cal-  
cem  
excre-  
scens.  
author ita loquitur. Occasione Sa-  
livæ in mentem mihi revoco amicum  
quendam meum, qui, dum serio &  
serenius loquitur, Salivæ guttas quasi  
per siphonem eructat, quæ conti-  
nuo in albissimam calcem excre-  
scunt. Si quid, conjiciendum, particulas  
quasdam Alkalicas terrestres à Spiri-  
tu Salivæ nitroso, seu acidulo,  
solvi; hoc vero Spiritu, in Saliva  
eructata, ob volatilitatem suam ex-  
spirante, calcem denuo coagulari;  
non secus, quam in fonte prope Je-  
sam, cui imposita Ligna, Folia, &c.  
lapide incrustantur.

Salivæ  
effica-  
cia in  
curan-  
dis  
qui-  
bus-  
dam  
Affecti-  
bus ex-  
ternis.

Sed quid morbosum statum refe-  
ro, redeamus ad naturalem; nun-  
quid pertinaces sæpe Tumores to-  
luntur affriktione jejuni hominis Sa-  
livâ? jejunam autem sumendam sua-  
dent; nec immerito; hæc enim præ  
reliquis magis pura & defæcata, ne-  
nullis potulentis aut esculentis (quæ  
de die ordinario post sumtum cibum  
restare solent) inquinata. Pedum  
Clavi matutinis horis si per aliquod  
dies eâ imbuantur, adeo hos emo-  
liri experientiâ constat, ut facilè to-  
lantur; Manuum Verrucas simili me-  
thodo auferri sæpius visum. Immo  
Saliva propria mane parti affectæ in-  
fricata munit contra Arthritidis ne-  
vos insultus. Morsibus insuper ven-  
enatis Serpentum, Canum Rab-  
dorum, &c. medetur. Ganglia seu  
Nodos in carpo existentes frequen-  
tius affriktione curat. Lichenes & Tu-  
bercula Hæmorrhoidalia Salivæ illis  
tolli expertus est *Clarissimus Wed-  
elius*. Imo & Oculos vulneratos  
felici eventu, hac curatos fuisse re-  
stant



stantur Miscell. Med. Phys. Obs. xcii. Anni 3. Ibidem enim notatur; Adolescentuli cujusdam duodecim annorum, cuspide cultelli tunicam Corneam Uveamque ita vulneratam fuisse, ut notabilis quantitas humoris efflueret; inflicto vulnere nullo alio quam matris Salivâ curabatur: mater enim, diductis palpebris, linguam Salivâ madidam vulnere admovebat, quo sensim ad curam perduxit, remanente solummodo exigua cicatriculâ, cum pupilla angustiore. Idem Salivalis Humor Scabiem aliquando sanat, unde ab effectu concludendum & Sal Volatile tam in se continere, quod vias sibi parando, obstructions resolvat, & circulationem legitimam in parte affecta restituat: Panis Biscoctus masticatus & Salivæ probè mistus aëri calido si exponatur, de novo fermentabitur; ex quibus de Salivæ particularum diversitate judicari poterit.

Modo citatus Author Dec. 2.  
D 3 Ann.

Ann. 6. p 428. viribus egregiis Salivam pollere expertus, dicit; numquid hodiernum illinitur vel insputatur salubriter incipientibus Strumis Gangliis, Gibberi in principio, accedente frictione; quæ vulgi sunt remedia innoxia, & fatis bona; implevit & ipsi Salvatori ad miraculosam Cæci curationem exspuere in oculos ejus, Marc. 8. v. 23.

Cur Spumosa & tenax sæpe reddatur Saliva.

Hæc autem Saliva quæ feri lactis ad instar tenuis apparet, Spumosa ordinario & Tenax sæpe redditur hocque potissimum inde oritur; quo linguæ musculorumque maxillam inferiorem moventium motu, variagitetur; hinc Sal, quod in ea continetur (forte Lixiviosum) una cum Spirituosis Acidis & Oleosis (cum Spiritus volatilis in auras dissipatur) in spumam abit nivi modo albicantem; quæ varietas ex eo provenit quod radii lucis tum temporis majorem quam ante subeant mutationem magis tamen Spumosa ista Saliva apparebit, si longiore sermone h

Sal

salivalis Humor agitetur: Accedit, quod aër continuo inspiratus & expiratus multum ad id contribuatur, potissimum si Salivæ diutius maneat permixtus, uti hoc videre est in iis, qui *Apoplexiâ* afficiuntur, in quibus (dum liber aëris exitus denegatur) talis Spumosa Saliva ordinario conspicitur.

An in Saliva, quæ in Inferioribus Ductibus & Superioribus excreta, aliqua occurrat differentia, ex Colore, Sapore reliquisque conditionibus manifestum esse potest; Color namque in his atque illis idem observatur, quamvis nonnunquam contingit, ex Inferioribus Ductibus excretam Salivam pellucidiorē paulo fuisse; ex superioribus vero viscidiorē magis, ob canaliculos harum Glandularum paulo patentiores; hoc tamen non semper observatum, sed ut plurimum æqualiter colorata visa: Gustu autem si una & altera examinetur, vix ac ne vix quidem differre videntur; namque, cum ejusdem

An Aliqualis sit differentia Salivæ in Ductibus Superioribus secretæ, ab ea, quæ in Inferioribus fecernitur.

generis vasa habeant hæ Glandulæ, differentia percipi nulla potest. Experimento si certus esse magis desideras, superioribus aut inferioribus ligatura injiciatur, & quæ tunc temporis ex ore fluit Saliva, sive illa fuerit ex superioribus, sive inferioribus, ejusdem conditionis eam observabis, idemque tibi constabit, si tubuli ad id aptati Ductibus alligentur, & secretus liquor lagunculis excipiantur.

Qualis  
sit hu-  
mor, qui  
in Du-  
ctibus  
Bucca-  
rum,  
Palati,  
&c. de-  
ponitur.

Neque etiam multum à prædicta Saliva differt ille humor, qui ex Ductibus Buccalibus, Sublingualibus & Palatinis provenit, hic enim ejusdem fere naturæ est, nisi quod viscidus magis & tenax appareat, quod tamen non nisi in cadaveribus conspicitur; in corpore enim vivente tanta viscositas non observatur: verum post mortem humoribus lentior inducitur, dum particulæ magis volatiles in auras abiere, quemadmodum idem etiam observatur in Saliva in Ductibus tam *Stenonianis* quam

*Wartho*



Warthonianis post mortem examina-  
tis.

Circa palatum Glandulæ confide-  
randæ veniunt, *Tonsillæ*, nonnul-  
lis *Amygdalæ* dictæ, quarum una-  
quæque in vitulis Drachmam inte-  
gram pendit: hæ in inflammatis fau-  
cibus tumidæ aliquando videntur,  
& in magnam molem excrescentes,  
quas Chirurgi imperiti subinde minus  
cauté exscindere solent; Nonnun-  
quam eadem ulcerosæ conspiciuntur,  
potissimum in iis, qui Lue Venereâ  
afficiuntur.

Glandulæ hæ, quæ congeries sunt  
plurimorum acinorum, naturaliter  
pumicosæ, cavernosæ, & Glandu-  
larum mammalium ad instar flaccidæ  
sunt, è quibus, dum edulia linguâ  
premuntur, multum humoris elici-  
tur, sed cum reliquis per palatum  
dispersis Glandulis ejusdem condi-  
tionis non sunt; multum enim, tum  
respectu molis, tum respectu hu-  
moris, quem copiosius reddunt, ab  
illis differunt; hinc videtur dexterri-

mus alioquin *Stenonius* rem acu non tetigisse, dum in tractatu suo de *Glandulis oris* §. 21. hæc proponit: *Ultimas palatinas appellare visum mihi, cum revera tota palati caro, ut in brutis, sic & in homine, nil nisi conglomerata Glandula tonsillis continua sit, unde innumeri exiles Ductus prodeunt, qui ipsam membranam perforantes, quasi cribrum inde formant.*

Verum ut pace tanti Viri hoc dicam, hæ Glandulæ cum palatinis pro continuis non habendæ, sed ut contiguæ tantummodo considerandæ, quæ acinis constantes majoribus, à palatinis reliquis facillimè possunt separari; amplum insuper utraque hæc Glandula, ovalis figuræ habet sinum, intra cujus oram duo majores & in majoribus plures minores sinus & ostia triplo quadruplove reliquis palatinis majora conspiciuntur, in quibus tamen humor paulo viscosior quam in aliis palatinis, colligitur. Hujus Glandulæ Delineationem *Tab. IV. Fig. 1.* exhibet.

## CAP. III.

De Historiis Ductuum Salivalium  
Malè Affectorum.

Quam necessaria horum Ductuum Du-  
ctuum  
Saliva-  
lium  
cogni-  
tio ad-  
mo-  
dum  
neces-  
saria  
Chi-  
rurgis. cognitio Chirurgis sit, illi pro-  
pè norunt, qui unquam hos Ductus  
Glandulasve aut vulneratas aut ulce-  
ribus obsessas curandas susceperunt;  
utique non rarò contingit, fistulas  
libidem obortas, humorem limpidum  
stillantes, à tendinibus, nervis, &  
nescio quibus partibus, quem de-  
duxerunt hujus rei imperiti.

Lubet hic *Aquapendentis* textum Histo-  
ria a-  
pud A-  
qua-  
pen-  
den-  
tem. allegare, qui *Part. II. Cap. xxxi.*  
*Fol. m. 901. de vulneribus genarum*  
hæc habet; *versus aurem*, inquit,  
de hac parte vulnerata verba faciens,  
*foraminulum angustissimum, vix ocu-  
lis conspicuum, apparet, per quod*  
*ubi patientes mandunt, tanta copia*  
*exit limpidae aquæ, quæ est veluti*  
*lachryma ab oculis emissa, unde &*  
*quomodo effluat, ego certè nescio:*  
ubi

ubi Clarissimus Author tum temporis horum inventorum plane nescius vulneratum tractavit Ductum à Glándula parotide oriundum.

Apud  
Hildanum.

Idem etiam notavit *Fab. Hildanum Cent. v. Observ. LXXX. fol. 47*. Ubi mentionem facit cujusdam Studiosi, cui duodecimo ætatis suæ anno, aure sub dextra ulceratio tandem in fistulosum ulcus degeneravit quod, postquam irritò conatu, per triennium integrum ab imperitis Chirurgis male curatum fuisset, postmodum à se medicamento quodam caustico, labia callosa interna consumente, septem septimanarum spatium feliciter curatum fuit. Magnus ille Hildanus experienciâ didicerat quamvis harum partium structuram nesciret, hæcce ulcera vulgaribus medicamentis non auscultare, sed ad extraordinarium medicaminis genus confugiendum esse.

Apud  
Galenum.

Id ipsum suo tempore etiam observavit *Galenus lib. I. de compositione medicam. Sec. gener. lib. I. cap.*



*cap. vii.* Ubi Juvenem introducit xv. annorum, cui post febrim parotis Glandula in tumorem ulcerosum degenerabat; quo curato, remansisse tamen fistulam refert, per sex menses durantem, & postea Emplastro quodam Caustico à se plane curatum.

Haud absimilem historiam *Experi- Apud Corn. Stalpart vander Wiel, in sua cent. 1. Observationum Selectissimarum Observat. xiv.* narrat de quadam Matrona, quæ diu morbo aliquo fatigata, tandem dextræ parotidis exulcerationem passa est, quæ tractu temporis in ulcus transiit, materiam ferosam producens, imprimis cum cibos masticando occuparetur, hocque malum jam à longo tempore durasse refert.

Non ita pridem Vir quidem *Lue Venereâ* affectus & hinc inde variis per corpus dispersis ulceribus infectus, quoddam ex iis parotidum alteram obsedit, in tantum virus suum, dum cura perageretur, exspuens, ut  
hâc

hâc peractâ, fistula ibidem restaret humorem limpidum, Salivæ haud absimilem, stillans; Chirurgus, qui hunc tractarat (in curanda Lue alias non imperitus) de Ductibus Salivalibus fortè cum nihil unquam audivisset (nam ex illorum genere est, qui à novis abhorrent) casum hunc miratus est, & post varia incassum tentata patientem dimisit.

Quid  
Paroti-  
dis ex-  
ulcera-  
tio ma-  
li effi-  
cere  
valeat?

Juvenem 24. annorum ante aliquot hebdomadas adii, qui in uno & altero latere parotidis exulcerationem patiebatur, quæ dextri lateris erat, quotidie copiam materiæ purulentæ egerebat, postmodum humorem tenuiorem limpidumque; nullus dubitabam, quin una cum vasculis sanguineis ramuli aliquot salivales (sed minores) per glandulam dispersi, fuerint exesi, quorum tamen oscula, ulcere prius mundato, medicamentis nonnihil adstringentibus constricta coaluerint.

Præterquam quod hi ductus, aut vulnere aliquando læduntur, aut ma-  
teria

eria acri exeduntur; unde transitus  
salivæ versus os impeditur: sic idem  
evenire potest à tumoribus durioribus Ductus  
Saliva-  
les à Tu-  
moribus  
com-  
pressi.  
in hisce partibus subortis, quemadmo-  
dum id imperrime in puella, unde-  
cim circiter annorum, observare li-  
cuit, huic à tumoribus, Ductus Saliva-  
is sinistri lateris, tam superior, quam  
inferior in tantum comprimebatur,  
ut transitoræ Salivæ via præcludere-  
tur, & ægra os in totum fere aridum  
haberet, adeo ut Salivæ pauxillum  
tantum ventriculo per deglutitionem  
tradere posset.

Subinde observamus, quod post Læsis  
Glan-  
dula  
Ducti-  
bus,  
non  
semper  
Fistula  
subse-  
quitur.  
ulcera & vulnera harum Glandularum,  
Fistulæ non subsequantur, quoniam  
in ejusmodi casibus furculi minores,  
per glandulas dispersi, tantum læ-  
duntur, quorum oscula facili negotio  
cicatrice aliquâ clauduntur. Si vero  
Ductus ipse, aut plures in Glandula  
furculi concurrentes (& pelvim quasi  
facientes) lædantur, ulcera fistulosa  
facile suboriri solent; rarius tamen  
hoc contingit in vulneribus, si vul-  
nus

nus sit perexiguum , aut secundum longitudinem Ductuum fibroforum tunc enim leviori compressione Ductuum latera sæpe coalescunt, & pristino statui restituuntur.

An  
Ductui  
vulne-  
rato  
Cau-  
terium  
appli-  
care  
conve-  
niat  
Actuale?

Si vulnus sit majusculum , aut transversim abscissus Ductus , aut materiâ acri corrosus , Actuale , ut vocant , Cauterium levamen subindulgit; non tamen à ferro ignito semper hoc expectandum : sæpe quidem, hoc mediante , vulnerati Ductus osculum clauditur , sed si non longè ab extremitate Ductus , ubi inchoat , contingat , subsequi solet quod à Saliva continuo secreta , Ductus à Glandula versus cicatricem quotidie extendatur & sacculum facere incipiat , qui , cum sese extendere amplius non queat , humorem collectum os versus internè aut externè evomit , & fistulæ insanabilis causa evadit ; quod exemplo uno aut altero confirmatum ibimus.

Obiit non ita pridem , in hac Civitate vir quidam honestus , cui

dur



dum viveret, post varios, quos pa-  
 tiebatur malarum, gingivarum & den-  
 tium dolores, exiguum externe in  
 mala apparet tuberculum (& quidem  
 præcisè eo loci, ubi internè Ductus  
 Salivalis Superior in os hiat) quo  
 aperto, materia purulenta, sangui-  
 ne & aquâ permixta, prodit: ad e-  
 us curationem Chirurgus admissus,  
 eam, quam facilem putabat, brevi  
 promittit; Chirurgus attonitus varia  
 incassum tentari, & suis medica-  
 mentis hoc malum, quod exiguum  
 credebat, non cedere, sed in Fistu-  
 lam ulcerosam transire, curam, ut  
 vocant, palliativam instituit. Su-  
 bindè tamen ad cicatricem videbatur  
 perductum ulcus, remanente solum  
 exiguo tuberculo; quod licet per a-  
 quot dies & subinde hebdomadas  
 clausum maneret, ab animi passionè  
 & corporis exercitio vehementiori  
 facile de novo aperiebatur, aper-  
 tumque aquam, tantillo sanguine  
 permixtam, evomebat, hocque ma-  
 lum modo clausum, modo apertum,  
 E per

Histo-  
 ria, ubi  
 in Fi-  
 stulam  
 transit  
 Ductus  
 læsus.

per triennium integrum gestavit. Ductuum Salivalium situm exitumque si novisset hic Chirurgus, omni ope laborasset, & osculum ipsius Ductus, os versus clausum, aperuisset; vel cauteriis vel compressione, aliisve pro rei necessitate necessariis, ægrum curasset.

Alia  
Histo-  
ria a-  
pud H.  
Roon-  
huyse.

Melius famæ suæ consuluit H. *Roonhuyse*, qui tractatu suo Belgicæ idiomate conscripto, *lib. II. Ob- serv. xxxix.* sequentem narrat Historiam. Anno 1668. ægrum cum exulceratione malæ tractavi, ex exiguo tumore suborta, quæ ad cicatricem perducere non potuit; quoniam maxillæ inferioris motu, continuo aqua stillabat; bibenti aut comedenti aqua guttatim malam humectabat. Æger hic primum Amstelodamum veniens, curæ haud incelebris Chirurgi fuerat commissus; qui actuali cauterio ægrum restituere conabatur sed irritum plane conatu; quoniam hoc medicamine affluxio major causabatur, ita ut consultum duxerim corro-

corroborans & exsiccans cataplasma  
applicare, cum unguento de Tutia &  
diætâ admodum exsiccante; namque  
quo liberalius liquidis utebatur, eo  
majori copiâ aqua promanabat, ita  
ut continuo strophium admove-  
re cogeretur æger, cum aquâ mala ma-  
heret: tandem non nisi compressio-  
ne & emplastro sequente glutinante  
ad curam perduxî.

Rec. *Resin. Pini Unc. tres.*  
*Ol: Mastichin. Unc. unam.*  
*Coq: ad Consistent. Empl.*

Huc usque historia. Non tamen  
ideo adducor, ut credam, hunc Ce-  
lebrem Chirurgum convenientem in-  
stituisse curandi methodum; parum  
enim aut nihil profuit Cataplasma  
um Corroborans, ut vocat, &  
exsiccans, neque ab Unguento de  
Tutia aliquid singulare expectandum  
fuit: Emplastrum præscriptum vix  
ne vix quidem prodesse potuit;  
quæ singulatim examinare vix operæ  
E 2 pre-

pretium. Attamen patientem restituit, & quidem non aliis, nostro iudicio, quam compressione & diætæ exsiccantis præscriptione; primo enim, ipsius Ductus latera, renitente gingivâ maxillæ superioris, in tantum compressit, ut omnis Salivæ aditus eo fuerit præclusus, quo necessario Ductus latera debuere coallescere: Secundo, exsiccante diætâ vel potius abstinentiâ humidi effectum, ut parca saltem humoris Salivalis in Glandula fuerit secretio, quo paulatim Glandulæ & consequenter Ductus usus in totum fuit destructus; si enim osculum Ductus solum coaluisset, novum potuisset provenire incommodum, uti ex sequentibus magis erit manifestum.

Ductus  
Lachry-  
malis  
obstru-  
cti Hi-  
storia.

Matronam non ignobilem ante aliquot menses vidimus, cui, Ductus Lachrymalis (idem contingere potest & Salivali) sinistri lateris, à quoniam nescio causa obstructo, & coalitus liquor, Lachrymalis dictus, obstriculum inveniando, necessario sub-



tit, ita ut regurgitaret continuo; quæ, cum oculi canthum majorem leniter titillantem sentiret, leviori partium externarum compressione liquorem strophio suo excipiebat, idque sine notabili patientis incommodo. Ut tamen ab hoc malo in totum liberaretur, in consilium vocavit Medicos & Chirurgos aliquot, qui Ductuum istorum constitutionis agnari, hunc affectum ut *Ægylopem* tractarunt; quid sit? Medicamentis suis causticis Punctum Lachrymale inferioris palpebræ claudunt, aperto remanente puncto superiori, hoc lympham Lachrymalem continuo quidem excipiebat, sed, ut ante, per inferius punctum regurgitare non poterat; substitit ergo liquor, & novo accedente liquore, Ductus Lachrymalis (cujus alterum punctum jam clausum) magis & magis extendebatur; qua extensione tumorem repræsentabat in facie paulo infra palpebram, non parum huic matronæ alias non deformi, de formo-

fitate sua auferentem ; tumor interim quotidie accrescendo sacculum sibi formavit, qui, cum nihil amplius hujus lymphæ capere valeret, prope nasi cartilaginosa partem liquorem suum effudit, lachrymis interim involuntariis continuo per genas fluentibus ; quod cum patienti molestum valde, atque aspicientibus ingratum videretur, consultum visum, punctum coalitum aperientibus medicamentis de novo referare ; quod successu haud infelici contigit ; & fistulam infra palpebram jam progenitam curarunt, & cicatrice clauferunt ; quo facto, ut ante, lachrymæ in Ductu regurgitantes, per viam jam patulam exivere ; sicque hæc Matrona minus incommodum majori transmutare lubens voluit.

Simile quid Ductibus Salivalibus contingere potest, si, ut dixi, prope osculum, ubi in os hiat, cauterium applicetur, quo necessario ipse Ductus extendetur & sacci formam induet. Si vero prope Glandulam  
ipse

ipse Ductus, aut per Glandulam disperfi Ductus minores urantur, illud metuendum non erit, quoniam hi parum Salivæ jam excipientes, ita excipiendi non possunt & faccum formare, quo necessario ipse Salivæ canalis usum suum amittet, venæ & arteriarum umbilicalium ad instar.

Clarissimi Kerckringii Observatione Anatomicâ dictorum veritas magis adhuc confirmatur, qui Spicilegii sui Observatione LXVIII. Ductus Salivalis aberrantis mentionem facit his verbis: *Deflexerat enim Ductus ille (cujus radices parotis conglomerata, quique ostium suum in mucus reperiens, ibi sese exonerat) versus laryngem, ibique humoris sui, qui ore excipi solet, exitum non inveniens, tumorem ingentem excitaverat, lentâ materiâ redundantem;* Ubi & statim hæc subjungit. *An non hæc fistularum, ad stuporem morbum perpetuos usque humores supeditantium ut causa dici, ita ex eadem posset inveniri via, easdem*  
Kerckringii  
Observatio.  
ubi in  
Sacculum  
transierat  
Ductus.  
faci-

*facilius persanandi? Quisquis novæ ad otiosam naturæ cognitionem, sed ad fructuosam hominum Curationem, vel lectionum Anatomicarum subis fastidia, vel sectionum exhauris labores, age sis, speculari, experire, suppedabit aliquid hæc brevis observatio, quod ab aliis derelicta sanando, gloriæ tibi multum, utilitatis non parum adferet.*

Ductu  
læso,  
tamen  
non  
semper  
forma-  
tur  
Sac-  
cus,  
licet  
ostium  
clau-  
datur.

Datur tamen casus, ubi prædictum malum tantopere non metuendum sed tuto cauterium potentiale Ductu læso applicare licitum erit, uti illud sequenti Historiâ clarius patebit. I. neunte hæc æstate præteritâ Vir quidam plebeius, currui suo insidens & vertigine correptus, ex curru in terram prolabitur, idque præcise ante transituram rotam, quâ ita genarum sinistra comprimitur & proteritur, ut superior Ductus Salivalis five Stenonianus, haud parum fuerit læsus, atque ex Ductu læso Salivæ tantillum continuo effluxerit. Chirurgus accersitus partem læsan



Ad cicatricem quum perducere nequie-  
ret, quippe destillante Salivâ præ-  
reditus: ideoque aliùs Chirurgi, ma-  
gis experti, opem imploravere; qui  
post varia incassum adhibita, tandem  
Causticum ex oleo Vitrioli, cum  
Melle Rosato permixto, applicuit;  
quo fluxum cohibuit & brevi tempo-  
ris spatio patientem restituit, cum  
hoc tamen subsequente incommodo,  
quod hic Ductus Salivalis in totum  
usu suo fuerit destitutus.

Quæritur jam, quomodo Causti-  
cum Vitrioli læsum Ductum ejusque  
osculum claudere potuerit. Resp.  
Widetur hoc potissimum ab eo de-  
pendere, quod Saliva in Ductu &  
humores in circumjacentibus fibril-  
lis læsis, Acido Vitrioli fuerint in-  
crassati & coagulati, hinc ostium  
Ductus læsi paulatim cœpit obturari;  
quod tamen melius successit, quo-  
niam patienti os ante casum (sicut  
& hodie adhuc) ficcum solitoque  
magis aridum fuerit; hoc autem cum  
à tardiore Salivæ secretionē depen-  
deat,

deat, facilius ad cicatricem Ductus læsus fuit perductus.

Du-  
ctus  
Saliva-  
lis ob-  
stru-  
ctus.

Aliquando Salivalis Ductus ab ostio obstructo aut coalito in tumorem abit, cujus notabile Exemplum *Cl. Lentilius* in Eph. Germ. Anni 4. Dec. 2. habet: Sculptoris, inquit, formosa uxor, viginti & aliquot annorum juvencula, à prima juventute odontalgia subinde laboravit. Jam ante biennium enormis dentium dolor tuberculum pisi quantitate in maxilla superiore dextra, supra dentem caninum, sui vestigium ingratus hospes reliquit, quod, quum parum incommodi ferret, utcumque toleratum. Quum igitur incrementum tumor sumeret, Chirurgus expertissimus quidam consultus, qui, variis adhibitis externis emollientibus, discutientibus, maturantibus, &c. nihil tamen profecit. Denique curam per incisionem in simili casu factam allegavi. Cum & ægra vehementer hanc postularet, & consentiret maritus; incisio, scalpello secundum longitudi-

adinem, in eminentiore parte, profundior perfecta. Sed neutrius nostrum suspicionem exitus comprobavit; dum enim hæmorrhagiam ille, ego, expectaremus, horum neutrum vulnus dedit; sed aquam, seu serum, paucò sanguine mistum, nullo foetore naribus ingratum, limbidum ad instar Salivæ, ingenti & larga scaturigine, excrevit. Vulnus debite tractato, per crebras collutiones, turundas traumaticas & alia, brevissimo negotio fuit consolidatum, nec ullum notabile symptoma insecutum.

F I N I S.





ANTONII NUCK,

M. D.

Medicinæ & Anatomix

PROFESSORIS

TRACTATUS,

DE

DUCTIBUS OCULORUM

AQUOSIS.



## DEFENSIO

## DUCTUUM

## AQUOSORUM.

Quum Ductus nostri Novi de novo examini subjiciendi essent, haud actum agere me credidam, si in antecessum, ad dubia & objectiones, ante aliquot menses à Doctore quodam Transmosano, in Tractatulo, cui Titulus; *Dissertatio Medico-Physica de Tribus Oculi Humoribus*, propositas, responderem; vera autem an proponat, nec ne, æquis rerum Anatomicalium æstimator ex sequentibus judicare poterit.

Experientissimus Doctor pag. 9. hac methodo incipit, *Clarissimus Nuck vasa sua ita describit: quod sunt Ductus nigricantes in canibus numero duo; in aliis vero animalibus, multo plures, qui partem nervi optici,*

tici, & superficiem Scleroticæ externam perreptantes, tandem corneam perforant; ubi diductis palpebris, adhuc viventi animali, cerne possunt sua lymphæ turgiduli. Resp. Certissimum est nuspiam in toto tractatu talem proflare descriptionem, sed variis ex locis hic quædam extraxit Author, eaque conflavit, unde inde descriptionem non nostræ, sed suæ opinioni convenientem formaret. Pag. enim III. dixi, Ductum hosce colore atrato plerumque se manifestare, & non semper. Nuspiam etiam statui semper multo plures in aliis animantibus, exceptis canibus hosce Ductus inveniri: pag. namque 109. dixeram, oculum Piscis Gale non nisi unicum habere Ductum.

Pag. 10. Ego vero huic descriptioni, utpote quæ naturæ libro minimè consona videtur, nequaquam assentiri possum. Etenim nunquam mihi videre contigit in ullo animalium genere, hæc vasa usque ad corneam porrigi; sed omnia semper tunicam Sclero



*Scleroticam in medio oculi bulbo ad corneam distantiam sex vel septem linearum Mathematicarum perforant.* Quod autem nostram descriptionem veram libroque naturæ satis consonam assequi non possit, doleo multum; semper enim mihi in omni animalium genere, hætenus à nosse dissectorum, ad corneam usque porrigi vidimus, & nuspiam tunicam Scleroticam (exceptis nonnullis animalibus, in quibus subinde circulus unus aut alter, uti etiam in tractatu nostro notatum, posticam sclerotidis tunicam permeant) secundum Authoris descriptionem perforant; sed semper Corneam, uti figuris nostris notavimus. Forte non attendit Author, Corneam tunicam Anatomicis dividi in Corneam opacam & Corneam pellucidam: Pellucidam enim non intelligo, sed opacam. Et si, secundum Authoris mentem, in medio oculi bulbo ductus insertio foret, quis, quæso, sex vel septem Linearum Mathematicarum

F                      tica-

ticarum distantiam à tunica cornea posset concipere? veram autem Ductuum nostrorum nos descripsisse insertionem, variis in præparatis curiosis ostendere possum.

Pag. 10. *Præterea quod aquam contineant & lymphâ suâ turgidulâ aliquando cernantur, hoc autopsiæ & rationi manifeste contrarium est.* Quis quæso, experientiam mihi negaret quamvis postea aliis experimentis didicerim, sæpe aquam, loturæ carnem ad instar se habentem, in iisdem conspici Ductibus; quemadmodum illud suo loco clarius explicabimus. Non etiam dixi, diductis palpebris vasa illa *semper* videri; sed rarissimè & non nisi in illis canibus, quorum oculi extra orbitam osseam, solius magis, prominent, & ubi Ductus nostri magis (licet rarius) ad corneam pellucidam accedentes, corneam opacam perforant. *Neque etiam tunica adnata, illo in casu, obest quia tunicæ hujus tenuitas & pelluciditas in ejusmodi occasionibus* forte

forum horum turgescientiam tollere non potest: præsertim ubi oculi bulbis humore aqueo summe distentus, non admittit humorem vasculis nostris contentum; sed sua renitentia ad tempus avertit, donec per insensibilem transpirationem portio ejus in auras abeat, & ita, qui ante fores est, humorem aqueum in Ductibus contentum admittat.

Pag. 11. *Cum primum horum vasorum examini in oculo orbitâ suâ peruto incumberem, atque sanguinem coagulatum in ipsis hædere viderem, statim apud me cogitare cæpi, an forsitan commercium inter hæc vasa aquosa & vas aliquod sanguineum intercederet. Et pag. 13. Ab injecto liquore vas sanguiferum esse animadverti, & pluries eodem successu observavi; liquor enim copiose injectus, torrentis instar, per arteriam carotidem effluebat. Sanguinem coagulatum nuspiam in tot à me dissectis oculis videre potui. Et licet sanguini quid analogum in iisdem*

F 2

ali-

aliquando conspiciatur ; non tamen inde concludendum , esse vas sanguineum ; quandoquidem in ipsis vasis sanguineis partibusque membranaceis humorum potest fieri secretio , licet frequentius in Glandulis. Experimentis namque constat , uti Cap. de Saliva demonstravimus , ceram liquatam , cinnabari tinctam , oleo dilutiorē redditam , & mediante siphone in vas aliquod arteriosum aut venosum injectam ( prout variæ conformationis occurrunt ductus ) in varii generis abire particulas ; adeoque , ut plus quam semel observatum , per has vias rubicundam , per illas , albam , per alias iterum flavicoloris ceram secerni ; quum tamen ante tota massa rubicunda fuerit ; quid ni hic contingere posset , particulas aqueas in ipsis vasis arteriosis à reliqua massa sanguinea deponi , propter arteriolæ porum , non nisi talem humorem admittentem , & reliqua excludentem ? Idque non solum in hac , sed & in nonnullis aliis

Micro-



Microcosmi partibus locum habet. Exemplo uno atque altero hoc ut confirmem. 1. Nunquid inflatis vasis permaticis, ex illa inflatione simulperiuntur vasorum lymphaticorum principia ex tunica albuginea proleuntia, & agminatim versus sacrum chyli ferum tendentia? quod fieri non posset, nisi hæc vasa à sanguineis manifestam ducerent originem. 2. In lienis vitulini, aquâ epidâm eloti, arteriam, splenicam ductam, flatum ubi immiseris; non vasa distendit tantum capillaria per lienem dispersa, sed ulterius pergit flatus in ipsa vasa lymphatica (ab arteriosis oriunda, tunicam perforantia) & externam lienis superficiem perreptantia. Quid? an non arteria venave pulmonalis inflata, flatum suum transmittit in vascula lymphatica (in tunica pulmonali externa conspicua) à vasis sanguineis oriunda? quum tamen ibidem nec Glandula, imo ne Glandulæ vestigium occurrat. Possem similia & in

aliis partibus demonstrare; sed videntur dicta sufficere.

Pag. 13. *Unius generis tamen Experimentis hac in re non acquiescendum esse judicavi. Molosso gulam laqueo constrinxi, ut sanguis hoc modo in vasis stagnans, veram illorum vasorum naturam exponeret, & vidi hos Ductus sanguine repletos. Valde suspectum mihi est hocce Experimentum in molosso institutum; in ipsa enim strangulatione, statim pleræque venarum jugularium constringuntur; quum tamen arteriæ sanguinem adhuc transmittant, qui in reliquum ibidem hærentem sanguinem (propter circuitum impeditum) arietans, particulas quasdam ex ipso sanguine rubicundo vi propulsas, ablegat, nostrumque humorem colore tingit magis rubicundo; quod tamen ut naturale minime existimandum. Nunquid alio obstructis venis emulgentibus, urinæ redditur sanguinea? An non à sanguine, irregulari modo moto, partem*

ticu

iculis ejus male mixtis , porisque cutis solito magis apertis , aut venulis capillaribus obstructis , sudor acidus non solum & viscidus , sed sanguineus aliquando excernitur? An non in aliquibus corporis partibus lymphæ lactea , vel , quod frequentius adhuc , sanguine tincta , visa? An bilis aquosa , & lymphæ pancreatica nonnunquam biliosa non fuit observata? Ligatis ureteribus an non Saliva adeo copiosa , & viscida ex Ductibus Salivalibus prodit , ac si mercuriale medicamentum dictum animal sumsisset? Adeoque ut ex hisce constet , à statu præternaturali ad naturalem nullam dari argumentationem.

Pag. 14. *Patet itaque ex dictis, vasa hæc perperam aquosa fuisse appellata, atque adeò inverso nomine sanguifera jam vocanda esse. Ex responsis nobis constare videtur, non inconvenienter vasa hæc aquosa appellata esse, & ex dicendis clarius adhuc illud patefcet, vasa dicta in*

posterum aquosa esse vocanda.

Pag. 14. *Sed quia plures arterias ad oculum ferri Authorem nostrum non latuit, priusquam ulterius progrediamur, examinandæ sunt rationes, quæ ipsum arterias, veras tamen humorum ocularium scaturigines, repudiare coëgerunt. Hæc sunt ejus verba; „ Ab arteriis per tunicam scleroticam & corneam dispersis, humorem hunc, aqueum scilicet, deducere velle, nullo certo nititur fundamento, nemo enim hoc unquam demonstravit, & licet ibi copiosissimæ inveniantur arteriæ, hinc non sequitur ibidem fieri secretionem; dantur enim aliæ corporis nostri partes, quæ arteriis copiosis gaudent, in quibus tamen nulla prorsus fit secretio. Imo præter arterias, quas in dicta tunica numerosissimas & visum fere fugientes demonstrare possum, & hos nostros Ductus, singulatim notare oportet; arteriæ enim ibidem, ramorum arborum instar,*  
per



per hanc tunicam dispersæ conspiciuntur, harumque ramificationum nunquam certus observatur ordo aut numerus. Ductus vero nostri, recto tramite incedentes, sine furculis lateralibus eundem semper numerum, locum atque situm obtinent; & speciatim colore nigricante ut plurimum tinguntur. Arteriæ semper per scleroticam & corneam dispersæ; nostri vero Ductus semper corneam perforant.

Pag. 15. *Ego ingenuè fateor, me secundum tales corporis nostri partes, quæ arteriis copiosis gaudent, in quibus nulla fit secretio, offendisse; nec autem, quemquam id vidisse, aut demonstrare posse. Author mentem nostram non capit; loquor enim hic de secretionem, non vero de transpiratione. Totum enim corpus nostrum porosum esse, effluviaque inde quam plurima, imo ex ipsis oculis emanare, certo certius; hæc autem effluvia & corpuscula subtilia, ex arteriis, corneam & scleroticam*

cam percurrentibus, liquoris aquosi formam assumere non possunt, atque in oculi bulbum stillare; quandoquidem oculi partium internarum, humorum aliorumve pressio & renitentia major est, quam illa, quæ ab externo fit aëre; neque magis inde exstillat humor aquosus, quam ex arteriis, pleuram & peritonæum perreptantibus, in pectus aut abdomen aliquis depluit liquor.

Pag. 17. *Quorsum enim tot arteriæ ad uveam, quæ nullo fere indiget alimento, pertingerent, & in tot capillares dividerentur?* Invalidum prorsus hoc argumentum, idemque est, ac si dicerem, quorsum tot arteriæ cysticæ, vesicam felleam percurrentes & in tot capillares dividerentur? (innumera enim demonstrare possum) nisi humorem transmittant biliosum; & tamen ne biliquidem guttula ex iisdem stillat: imo in dicta uvea pauciores arteriæ esse non debuere, quandoquidem oculorumque tunicæ in continuo fere  
motu

motu, potissimum de die, constituti, hinc plures particulæ in auras abeunt, novæque per arteriolas accedentes, abeuntium loca occupant & pro nutrimento partim inserviunt.

Pag. 17. *Hisce rationibus non paucum roboris addunt duo seqq. experimenta. Ligata scil. arteria carotide, cujus ramus ad oculum tendit, oculus flaccescit; atque è contra, ligata vena jugulari externa, oculus in magnam molem & duritiem excrescit.* Experimenta hæc ab Authore proposita, magni ponderis nobis non videntur. A ligata enim arteria carotide oculi vigor si tantillum pereat, flaccescit tamen minime; quum arteriarum variæ anastomoses (quas habet cum arteria carotide oppositi lateris, nec non cum arteriis cervicalibus) haud permittunt flacciditatem oculo huic induci; sed vigorem fere remanere naturalem. Sic à ligata vena jugulari, magna illa oculi moles & durities non expectanda, quum reliquæ

quæ venæ jugulares, quibuscum variis anastomosibus junguntur, viis patulis faciliè cordi sanguinem suum reddunt.

Pag. 18. *Non opus itaque ad vasa Glandulæ nondum cognitæ vitiata recurrere, quemadmodum Clarissimus Author facit.* Non statui necessario recurrendum esse ad Glandulam aliquam; quandoquidem pag. 116. dixeram, me nihil certe adhuc de eo asserere audere. Brevi post editum tractatum meum, rem paulo aliter observavi, novis adhibitis experimentis, quæ Cap. de Ductibus Aquosis inferius erunt enarranda.

Interim putamus, experimenta ab Authore experientissimo proposita nihil certi probare contra nostros Ductus Aquosos; præterea Autoris experiendi methodus, displicet nimium, ut tam facile fidem ei adhiberem; quandoquidem pag. 11. hæc habet; *Rei hujus ut certior fierem, varia quidem expertus sum.*



*em. Primo stylis perexiguis & flatu  
sus sum ; sed quoniam hisce nihil  
proficiebam , eorum pertæsus , aliam  
iam excogitavi. Nimirum syrin-  
gam adeo exiguam , ut commode il-  
lorum vasorum orificiis inseri posset ,  
fabricari mihi curavi ; & ex his fo-  
raminibus ea , quæ in Ductus Nuc-  
leanos patebant , selegi. Quis un-  
quam , vel leviter saltem in Anato-  
micis versatus , concedet , syringam  
exiguam commodius in vasculum ali-  
quod immitti posse , quam quod sty-  
perexigui flatu sive peragitur ope.  
 præterea nec orificia nec foramina  
hic occurrunt , ut Author ( qua in  
opinione olim fui ) pag. 11. & 12.  
statuit , sic enim , ad mentem Au-  
toris , sanguis sub forma sanguinis  
culi bulbum subintraret.*


*Hisce itaque Experientissimo Do-  
ctori satisfactum putamus ; Sed mi-  
hi satis non potui , qui & alii ,  
nec ingenio , nec manuum dexteri-  
tate pollentes , contra nostros Du-  
ctus insurgere ausi fuerint , quum ,  
qua-*

qualis sit Oculi Ductuumve nostrorum fabrica; ipsi planè nesciant; ut pluribus demonstrare possem, si cur ejusmodi hominum genere in arenam descendere vellem. Verum sciant illi, me animi quâdam generositate semper contemturum illos & illis similes, imo nunquam (ne inutiliter tempus terere viderer) sint habitum responsum; si verò respondendum aliquid quando, curæ hoc charissimorum meorum Discipulorum relinquimus quibus haud difficile, ejusmodi refutare maledicos & malè exercitatores. Mentem tamen ipsis, ex animo, precamur saniores, manumque dexteriores, hoc si non juvat, crepent per me licet, miseris passionibus suis quas ego nunquam, quum aliter fieri non possit, in ipsis imminutas velim, imo volupe mihi erit, illis suggerere materiam, in quam dentes suorum theoninos, dicam potius caninos confringant.

# DUCTUUM AQUOSORUM ANATOMIE NOVA.

## CAP. I.

### *De Ductibus Oculorum Aquosis.*

 Uod in Mechanicis artificiosa manu paratis observamus, idem in Animalibus contingere videmus; *ut ad sui conservationem fluidis, corpora fluida, de novo continuo affundantur, ut in motu suo & bene esse & continuare possint.*

Fontium artificialium continuus saltus brevi cessaret, nisi de novo accedens aqua, primam continuo propelleret & in motu conservaret. Humoris Aquei motus cum Mechanicis comparatur. Puteorum cava brevi inanirentur, nisi per subterraneas vias de novo accederet aqua, exhaustam restituens. Clepsydrae

sydræ Norimbergensium artificiales, tantum arenæ reddunt, quantum amittunt, & hinc contingit, eas in motu suo tamdiu continuare, quæ alioquin facile subsisterent. Sic & alia quotidie oculis obvia, quibus manifeste docemur, necessario alia corpora deperditorum loca supplere debere, ne motus ille cessaret; & mole ruerent suâ.

Longe autem artificiosius in Oeconomia Animali hæc contingunt & excellentius peraguntur; ubi Summus nostri Opifex in prima animalium fabrica illa tam ingeniose observavit & perfectè, ut ne vel tantillum amittatur, cujus damnum, nobis nescientibus quidem, non statim resarciatur. Sic Saliva in Glandulis separata, statim à subsequente Saliva propulsa, prioris locum occupat, donec hæc ab alia iterum protrudatur. Pericardii capsula brevi aquâ suâ foret orbata, nisi continuo nova accedens suppleret per insensibilem transpirationem aut aliam viam amissam. Vesi-



ca fellea bilem suam non eructaret, nisi in glandulis hepaticis nova bilis materies separaretur. Urinam non redderet vesica, nisi in renibus nova urina fecerneretur. Seminis nihil darent vesiculæ seminales, nisi in testibus nova seminalis materia deponeretur, & per vasa deferentia amissi seminis locum occuparet. Quid plura? infinita alia in œconomia animalium occurrunt, quibus idem adaptari potest.

Summopere etiam illud apparet in Oculis, in quibus Humor Aqueus continuò dissipatur, & novus in ejus locum substituitur, quo perpetuo oculi vigor conservatur, & visus rectius peragitur: per quas autem vias hic humor aqueus ad oculos deferatur, nulli Anatomicorum, quod sciam, hætenus perfectè innotuit; ideoque, quæ nostra circa eum sint observata, describere nobis animus est.

Ne tamen hanc rem intactam pertransirent Anatomes Cultores, re-  
umque naturalium Perscrutatores, ne-  
Ang-  
tomi-  
corum  
error.

circa  
Hu-  
mo-  
rem  
Aque-  
um.

scio quæ non sibi imaginati sunt, obscura pro certis, falsa pro veris venditantes. *Alii* providam Naturam implorant, quam nunquam in necessariis deficere dicunt, hancque tantum humoris oculum versus ablegare, quantum necessario requiritur. *Alii* his minus contenti, alias commenti sunt vias, Arterias scilicet, quæ osculis totidem in oculi cavum hiantes, sufficientem humoris copiam darent; vel quod arteriolarum extremitates in glandulas terminantes, ibidem humorem deponant, & quod in illis glandulis peculiare novi inveniantur ductus, dictum liquorem secernentes. *Aliis* hæ viæ nimis obscuræ visæ sunt, ideoque maluere humorem hunc per Nervos deducere, statuentes hanc viam esse maximè convenientem, quoniam in defectu spirituum languidos observant oculos, humorem aqueum eo tempore non recipientes, unde vigor illis perit, & tunicæ minus tensæ apparent. *Ab Aliis* res longe aliter concipitur, qui humorem hunc

hunc ex Lymphaticis vasis stillare perhibent, quoniam humoris aquei cum Lymphatico, magna, tum respectu coloris, tum saporis, est convenientia. Horum quisque suam studet defendere sententiam, dum incerti relinquuntur filii medicorum juniores, quonam se vertant nescii.

Prioris opinionis Patroni & Naturæ magni illi adoratores vix responsum merentur, cum hoc ævo raro aliquis in tantum infaniam, ut non aliunde, quam à providente Natura hæc similiaque deducat, ideoque sicco pede illa transeunda.

Refutantur  
opiniones  
aliorum.

Ad secundum respondeo, quod, ab arteriis per tunicam sclerotidem & corneam dispersis, hunc deducere velle, nullo certo nitatur fundamento; nemo enim hoc unquam demonstravit, & licet copiosissimæ ibi inveniantur arteriæ, hinc non sequitur, ibidem fieri secretionem; dantur enim aliæ corporis partes, quæ arteriis non minus copiosis gaudent, in quibus tamen nulla prorsus

fus fit secretio. Quod Glandulas, de quibus loquuntur, spectat, eas plane fictitias putamus, & nemini (quod sciam) hactenus visas. Sic multi hodie ita de variis corporis partibus ratiocinantur, quasi omnia ex Glandulis constarent, cum tamen autopsia in multis contrarium demonstrat.

Eodem modo sese hæc res habet ac cum bile, in cysti fellea inventa quam multi clarissimi Viri crediderunt per arteriæ hepaticæ furculum, (in plurimos minores divisum) & tunicam Cystidis perreptantem, in Glandulis separatam, ibidem colligi; verum cum manifestissimè alii Ductus peculiares ex hepate oriundi, bilem cystin versus vehant, illorum opinio corruat necesse est.

Ad tertiam opinionem dico; quod nec etiam Nervi pro viis habendi per quas hic humor deferretur; nemini enim, quod ego saltem sciam, adhuc contigit liquorem nervaceum examinare, & nervis abscissis nihil prodibit humoris; quod tamen d  
bere



beret: nam læsâ oculi tunicâ & humore aqueo extracto, non raro sex horarum spatio, oculi cavum denuo repletum invenies, de quibus infra. Hinc probabile admodum foret, si tam cito regeneratur humor aquosus, idem ille etiam, subito abscisso nervo, in conspectum veniret, si à nervis procederet. In Gutta Serena, nervum obstructum compressumque libenter fatentur, spirituumque viam præclusam, attamen oculi vigor externus manet; ergo, si viæ obstructæ sint, difficile aliquis humoris alicujus transitum concipiet. Quod autem Anatomicus quidam Celeberrimus dicat; *Dari Liquidum in Nervis, quod igne concrevit*; hoc non ita facile credendum, & licet ad oculum illud demonstraret, huic tamen usui non inferviret.

Quartæ opinionis propugnatoribus rehero, ex Vasis Lymphaticis si stillaret hic Humor Aqueus; illud ipsum motui ipsius Lymphæ plane

contrarium fore ; certissimis utique experimentis jam constat, lympham moveri à circumferentia ad centrum, non contra: Valvulæ enim (quæ ubique in Lymphaticis Vasis inveniuntur) obstant, & humoris motum, à centro ad circumferentiam impediunt ; præterea Anatomicorum nemo hæc vias, quod sciam, adhucdum demonstravit.

Nostre  
opinio  
& demon-  
stratio  
Anato-  
mica.

Alia itaque nobis ineunda erit via, quâ certo experimento constabit vasa quædam peculiaria destinata esse, quibus hic humor in oculum deferatur. Diu ante hac mihi aqua hæc sit, nec concipere potui, quomodo ex perforata tunica cornea, humor aqueo extracto, paucarum horarum spatio, similis humor in ejus locum succedat, nisi viæ darentur peculiare huic usui destinatæ; quæ dum meditabar, oculos Piscis Galei cultro nostro anatomico habebam subiectos, & forte fortunâ incidi in Ductum quendam singularem, tunicam sclerotidem perreptantem, & in cornea

neam ( non longe à pupilla ) sese inferentem , quam perforabat , & stylum mediocris magnitudinis admitterebat , nec retracto stylo aqueus humor tamen effluxit ; quoniam Ductus extremitas valvulæ in modum se habebat : simili fere modo , quo pori biliarii in vesicam felleam & ureteres in vesicam urinariam , aut ductus thoracicus in venam jugularem axillaremve exeunt : Oculus autem hic , quoniam ex orbita sua erutus erat , ejus primam Ductus originem indagare non potui : interim Ductum nostrum novum , & ubi Ductus ille corneam perforat , *Tab. iv. Fig. 2.* demonstrabit. Non tamen hujus Ductus exitus , in omni animantium genere , eodem modo sese habet , sed ulterius pergit , & suis ramificationibus , uveæ partem anticam , iridisque fimbrias exornat , uti inferius clarius patefcet.

His visis , in aliorum animalium generibus , hæcce ulterius examinanda esse necessarium duxi ; ideoque

Ductus  
Novi  
in  
quam

pluri-  
mis  
Ani-  
manti-  
bus re-  
perti.

primum Oculos Ovinos perlustravi, in quibus non simplicem Ductum ut in illo piscis (Galei dicto) sed in altero ovinorum oculorum Ductus quinque, in altero vero sex observavi, superficiem tunicae sclerotidis perreptantes, & in corneam, (quam omnes perforabant) desinentes, qui colore suo atrato (quo plerunque sese manifestant) admodum notabiles erant, ad unum omnes setam immissam aut stylum admittentes. Postmodum etiam in aliis ovinis & agninis oculis hos ductus observavi sæpius.

In canibus iidem non minus facile conspiciuntur, ubi hoc tamen occurrit peculiare; quod quisque oculus non nisi duos obtineat Ductus (de quibus inspice *Tab. IV. Fig. 3.*) alterum sub musculo oculum abducente, alterum vero in opposito latere, sub adducente musculo situm. Sæpius etiam in cane vivente Ductuum horum alterum videre licuit, diductis palpebris, potissimum



mun superiore ; tumque Ductus extremitas , ubi corneam perforat , non raro conspicitur humore suo aquoso turgidulus ; quod tamen locum non habet , nisi in canibus , quibus oculi majores sunt , & extra orbitam suam aliquantum protuberantes.

Quamvis plerumque recto tramite Novi hi Ductus tunicam dictam perreptant , attamen nonnunquam (quamvis rarissimè) prope sclerotidis extremum , ubi nervum opticum tangit , intorquetur ex iis Ductulus quidam lateralis ; qui , quantum con-jicere potui , tunicam ibidem perforat , ut liquoris majorem deponeret quantitatem , vide *Tab. iv. Fig. 4.*

In Vitulis iidem conspiciuntur Ductus Novi , verum in iis tam accuratè observari nequeunt , quam quidem in dictis animalibus. Eosdem Ductus etiam Volucrum Genus obtinet , & , uti in Canibus , binos in utroque oculo deprehendimus. Neque etiam iis destituitur Oculus Humanus ,

manus, uti jam aliquoties vidimus. Ita ut nullum amplius restet ductum, quin in omni animalium genere iidem inveniantur; in quibus vulgo (quandiu sclerotidem & corneam concomitantur) colore atrato aut livescenti tincti conspiciuntur; antequam autem has tunicas tangerant, de hoc colore non participant.

Cur  
Novi  
hi Ductus  
partim  
Nigricantes  
appareant.

Unde autem Color ille, quæret aliquis: Hoc, quamvis explicatu arduum valde, non tamen omnino improbabile est, colorem hunc à tunica uvea Ductus hos novos obtinere; notum enim cuique, uveam hanc tunicam, mucagine quasi nigricante oblitam esse, hinc horum Ductuum fibræ, uveam perreptantes à particulis hujus mucaginis magis mobilibus, sensimque ulterius extra oculi bulbum pergentes (ubi nervum opticum tangunt) nigrorem suum deponunt. Non tamen hoc perpetuæ est veritatis; similem enim nigredinem aliquando observavimus circa  
exi-

exitum Ductuum Salivalium Stenonianorum, nec non punctorum lacrimalium: imo sæpissime Vas Excretorium Naribus proprium, maxima ex parte, nigricantis coloris conspicitur; quo etiam ordinario rectius à reliquo vasorum genere dignoscitur.

Quæ verò prima horum Ductuum Origo sit, difficillime in principio observare potui: varie illud tentabam, plurimas instituebam injectiones, verum successu planè infelici, nunquam enim ulterius potui hos Ductus separare, quam ad nervum usque opticum, & lineas duas tresve mathematicas supra nervum, quem comitabantur. Et quandoquidem pleraque vasa Excretoria originem à Glandulis ducunt, etiam hos ab iisdem oriundos esse, non improbabile cogitabam, nihil interea certi asserere audens. Brevi tamen post primam hujus tractatus editionem editam, casu arterias carotides, infantis primum nati, cerâ liquidiori replendo

Ductuum  
Novorum  
Origo  
unde?

plendo observavi, peracta jam injectione, tantillum ceræ unum ex nostris Ductibus subintrasse: hæc quamvis præter expectationem viderem, ulteriore examine perlustranda esse æquum duxi. Ideoque Mercurium nostrum, maximè mobilem, carotidis arteriam subintrare curavi, eoque felicissimo cum successu totum negotium absolvi.

Non enim à ramo arteriæ externo hi Ductus originem ducebant, sed ab interno, qui statim ac cranium quum perforasset, ex trunco arteriæ carotidis (intra cranium scilicet) duplex exhibat furculus, alter retrorsum, cerebri ventriculos versus, alter antrorsum per nervum opticum, quocum cranium de novo perforabat, medio in itinere in duas abiens ramificationes, duos etiam constitutebat ductus, recto tramite corneam perreptantes, Ductusque Aquosos constituentes: hocque in uno & altero jam aliquoties observavimus latere. Majorem autem rei dilu-



dilucidationem dabit *Tab. v. Fig. 1.*

Ductus autem hi in plerisque animantibus, postquam corneam perforarunt, terminum non constituunt ultimum, sed uveam tunicam & potissimum iridem aggrediuntur, in quibus iterum in varios abeunt anfractus, sed semper tamen regulari modo dispositos, ut ex eorum ostiis, porisque apertis humor prodire posset aquosus; uti *Tab. vi. Fig. 1.* explicatum dabit.

Ductuum  
ulteri-  
or pro-  
gres-  
sus.

Sed rogaret forsitan aliquis, cui bono horum Ductuum tot intorsiones, vitium capreolos quodammodo imitantes? Cur primo arteria cranium subintrat, intorquetur, iterum exit, & uveæ parte antica irideque serpentini hi Ductus continuant? Respondemus hoc summopere necessarium esse, ubi ductus excretorii à glandulis non oriuntur; hac enim via secretio peragitur, dum medio in itinere, ita intorto, omne heterogeneous deponitur & amandatur in alia ostia venosa, remanente

Cur  
intor-  
quen-  
tur  
Rami-  
ficatio-  
nes  
Du-  
ctuum?

te solummodo humore hoc aquoso. Idque non observatur tantum in hisce partibus, sed & variis aliis. Seminis enim legitima præparatio ut procedat, necessum fuit arteriam spermaticam ( licet non ita in hominibus, potissimum tamen in brutis animantibus ) in varios cincinnos, capreolos, vitium pampinos imitantes, contorqueri, ut hoc modo particulæ potissimum seminales restarent, reliquis in venas depositis. Ab iisdem arteriis furculi prodeunt intorti, testium tunicas percurrentes, quorum termini vasorum aliquot lymphaticorum constituunt principia. Quod & artis Chemicæ cultores norunt, qui spiritus subtiliores destillaturi, vasis utuntur longius extensis rostrisque intortis, ut iisdem, quod defæcatum & spirituosum est, separarent solum.

Quâ autem quantitate hic Aquosus Humor deponatur & in Oculi bulbum deferatur, difficillime exprimitur, quum vix ac ne vix quidem

dem tubuli adeo exigui hisce Ducti-  
 bus possent alligari , quin minimâ  
 capitis ( canini aut alterius animalis )  
 motione , facile rumperentur , in-  
 super partes circumjacentes læsæ ,  
 sanguinem tam copiose funderent , ut  
 impossibile videatur , Experimentum  
 tale institui posse. Quum autem ne-  
 cessario mediante insensibili transpi-  
 ratione , per poros intro foras spe-  
 ctantes , multum dissipetur ; credi-  
 bile admodum , humoris hujus gut-  
 tulas aliquot quotidie oculum versus  
 amandari , idque tamen in uno ma-  
 gis quam alio , prout , aut ab animi aut  
 corporis motu , sanguinis motus fue-  
 rit major & concitator : haud absi-  
 mili modo , quemadmodum pericar-  
 dium , quod aquæ plus minusve sus-  
 cipit , prout idem sanguis tardius ce-  
 leriusve movetur.

Cùm autem Novi hi Ductus no-  
 mine aliquo insigniri debeant , eos  
*Ductus Oculorum Aquosos* appella-  
 re visum fuit , ut hac ratione distin-  
 guerem à vasis lymphaticis , quæ  
 lym.

Qua  
 Quan-  
 titate  
 oculo-  
 subin-  
 trat  
 Humor  
 Aque-  
 us.

Quo  
 nomi-  
 ne vo-  
 candi  
 Novi  
 hi Ductus?

lympham, cum hi Ductus non nisi  
 ὑδατώδης ὑγρὸν humorem aquosum ve-  
 hant. In his præterea Ductibus ne-  
 valvulæ quidem vestigium apparet,  
 cum nullum in toto corpore occur-  
 rat vas lymphaticum, in quo plu-  
 res valvulæ non conspiciuntur, ac-  
 cedit, quod horum Ductuum tuni-  
 cæ lymphaticis multo crassiores sint,  
 ideoque, quum hi Ductus & nutri-  
 tioni & restaurationi humoris ocu-  
 lorum aquei unicè inserviant, con-  
 venientius nomen quadrare non vi-  
 detur.

Du-  
 ctus hi  
 à ne-  
 mine  
 descri-  
 pti.

Satis superque jam constare vide-  
 tur, Ductus hosce Novos in hunc  
 usque diem latuisse Anatomicos,  
 summopere tamen miror, oculatissi-  
 mum Stenonem Nova hæc Vasa non  
 observasse, quum ita studiose in  
 Glandularum oculorumque vasa in-  
 quisiverit. Aliquid tamen indicasse  
 videtur in tractatu suo de Musculis  
 & Glandulis conscripto, pag. m. 60  
 ubi hæc leguntur. *An quos seme-*  
*iterumque in cornea observavi, non*  
*sine*



*sine admiratione, pori quandam aquei humoris transmittant partem, nondum ausim affirmare: vidi quidem per poros exeuntem humorem; sed ipsine tunicæ adscribendus substantiæ, an ab inclusa aqua deducendus, non facile ante ulterius examen determinavero; quum id nunquam, nisi aliud agendo, tentatum. Hic autem pororum, non vero Ductuum fit mentio, ipsumque Authorem latuit, per quas vias hic humor prodierit.*

Rogabit forsan aliquis, an Ductuum horum cognitio aliquam adferre possit utilitatem? Resp. magnam: his enim cognitis in causas quorundam morborum Oculi altius investigare, curamque successu meliori suscipere poterimus, imprimis causam morbosæ oculi constitutionis (quam Græci Ἀρεοφίαν Ὁφθαλμοῦ, Latini, Maciem Oculi vocant) cognoscemus, eidemque feliciori curatione medebimur. Hisce præterea cognitis, Exophthalmiæ, Oculi

An utile sit Ductus hosce cognovisse?

H

Rupti,

Rupti, aut Confusi, vera manifestabitur causa; subitam etiam humoris aquei regenerationem in oculo, artificiosè aut infortunio læso, distinctius percipiemus: insuper & Proximitatè Oculi progenies clarior elucescet: quæ ut manifestiora reddantur, exemplis aliquot fumus illustraturi.

## CAP. II.

*De Historiis Ductuum Aquosorum  
Malè Affectorum.*

Ductuum  
Læso-  
rum  
histo-  
ria.

**A**nno elapso ex pueri recens nati oculo utroque, tam supra quam infra oculi globum, materiæ albicantis portio ad dimidiatam drachmam continuo effluebat, cum affectu Microphthalmio, sive Oculo Parvo conjuncto: durante hoc fluxu, oculi sensim diminuebantur & Atrophia sive Macie corripiebantur. A parentibus in consilium vocatus, malum hoc, quoniam in utero materno con-

traxe

traxerat infans, periculo non carere prædixi, factoque mali eventus prognostico, curam unà cum Chirurgo suscepi; variæ injectiones & collyria adhibita, quibus continuo materia purulenta elueretur, ne sua acredine partes circumjacentes corroderet & consumeret, sed omnia incassum; quoniam Novi nostri Ductus materia acri jam diu in ipsis claustris uterinis fuere exesi, nulla arte reparabiles. Oculi enim (secundum nostrum prognosticum) novum humorem aqueum, obseratis ductibus nostris, pro sua conservatione non recipientes, necessario minus extendi potuere; hinc vigor illorum sensim evanuit, & macie confecti, visioni haud parvum incommodum tulerunt.

Brevi post Nobilem quendam Anglum, juvenem duo de viginti annorum, visitare contigit, affectu plane contrario *Hydrophthalmiâ* scilicet, laborantem; nam uti in citato casu, oculi fuere emaciati & val-

Ductuum  
ampliato-  
rum  
histo-  
ria.

de imminuti, ita hic oculorum alter in stupendam excreverat molem. Nobilissimi hujus juvenis oculus, aliquot ante annos, gravi quodam icthi tactus, objecta sensim & sensim obscura magis videre cœpit, intolerabili insuper dolore tentatus; interim in sua circumferentia quotidie extenditur oculus, ejusque moles in tantum aucta est, ut jam altero tanto major appareat, & magna sui parte extra orbitam suam promineat: post corneam pellucidam, humor parum albicans conspicitur, visus imminuti potissima causa. Aqueus humor non clarus, sed ex parte turbatus videtur, Iridis vix vestigium apparet, dolor ipsum sæpe subito invadit, ni ab acidis & salinis abstinereat; reliqua sanus.

Percelebres aliquot Doctores Anglicanos ad ejus curam adhibuisse retulit, qui veram affectus causam nescientes, proficere nihil potuerunt diversimode enim judicatum fuit alius Catarrhum, alius Suffusionem  
aliu



alius iterum Cataractam esse credit; hinc suffimentis, fomentationibus, venæsectionibus, purgantibus patientem nostrum multum fatigarunt; sed omnia successu admodum infelici. Tandem Celeberrimus quidam Medicus à nullo alio remedio, quam à perforatione (qua mediante aquei humoris portio superflua extrahi posset) successum felicem & curam sperandam declarat. Hoc, quum periculosum nimis & patienti & amicis visum fuerit, transfretarunt, & civitatis hujus Medicum unum aut alterum consulere, quo tempore etiam ego advocor, & primo statim intuitu affectum hunc Exophthalmiam esse una cum Incipiente Cataracta vidi.

Mali hujus causa, quum non nisi ex vera Oculi Anatomia erui possit, haud difficile erit, cognitis nostris Ductibus, eam expiscari: Primo enim instanti, cum patiens noster hunc oculi ictum acciperet, his Ductibus, sed potissimum vasculis venosis, tan-

ta illata fuit vis , ut facile , magna ex parte , aut læsæ aut obstructæ fuerint hæ venulæ; hinc humores , circuitum suum ibidem absolvere nescientes , necessario humoris aquosi copiosior subsequuta est secretio : qui , quum non aliam sibi viam parare potuerit , quam per hos nostros Ductus , eos quotidie ampliavit ; transitum simul præbendo particulis viscidioribus , crassioribus & aquâ minus flexibilibus : hinc oculi bulbus quotidie debuit extendi & in tantum augeri , ut amplius orbitâ suâ contineri non potuerit ; sed antrorsum propulsus , hoc modo Exophthalmiam induxerit. Particulis humoris viscidioribus in oculi cavum delatis & varie motis , ejus latera ita fuere agglutinata , ut dictæ particulæ , facile corpus aliquod membranaceum repræsentarent , & hinc Suffusio , si-ve Cataractæ Incipientis exordium ; quædam etiam ex hisce particulis viscidis tunicæ cornæ poris , intro foras spectantibus , adeo fuere infar-

ctæ ,

ætæ, ut insensibilis transpiratio fuerit sublata. Reliquorum symptomatum causam explicare non aggredior, quum illa per se satis manifesta sint.

De mali hujus eventu nihil boni prædicere potui, quoniam hic affectus inveteratus esset & jam aliquot annos durarat; quo temporis lapsu vasorum canaliculi ita fuere dispositi, ut non alium, quam hunc vitiosum potuerint transmittere humorem. Tunicam insuper Corneam & Sclerotidem jam à longo tempore multum incrassatam & extensam, pristinam figuram recuperare posse, impossibile visum: Cataractam Incipientem tollere, tempus adhuc minus opportunum existimavi, & licet tolleretur, statim de novo regeneratum iri prædixi: ideoque corporis exercitia vehementiora vitanda esse, (ne copiosior foret humoris aquei secretio) sanguinis acrimoniam temperandam, à falsis & acidis ægro abstinendum suasi. Acus beneficio

partem aquei humoris extrahere vel-  
le , temerarium fore judicavi ; quo-  
niam paucas intra horas eadem quan-  
titate facile regenerari posset , uti  
ex sequentibus colligi poterit.

Oculi  
humor  
aqueus  
aliquo-  
ties ex-  
tractus.

Juveni Bredano , xxiv. circiter  
annorum , post Ophthalmiam per-  
tinaciorē , gravissimosque oculi si-  
nistri dolores , visus sensim dimi-  
nuitur , pupilla obscurioris redditur  
coloris , ab humore aqueo turbidio-  
re , copiosius affluente , oculi bul-  
bus ita extendi cœpit , ut paucos  
intra menses in prodigiosæ magnitu-  
dinis Hydrophthalmiam abiret ; ocu-  
lus extra orbitam suam propullulans ,  
palpebraque eundem ob molis magni-  
tudinē amplius tegere nesciens ,  
bubulum magis , quam humanum o-  
culum referret. Interea nos unà cum  
Chirurgo Civitatis Hagienſis dexter-  
rimo convenit , nostrum expetens  
& consilium & auxilium. Omnibus  
ritè perpensis , in antecessum pro-  
gnosticum institui ; ipsum nunquam  
oculi affecti visum recuperaturum :

atta-



attamen nos certo experimento novisse, humorem aqueum extrahere, & ad pristinam naturalemque redigere magnitudinem, oculumque postea oculo artificiali muniendum esse.

Hac spe quidem allectus, sed simul dubius hæsit, quærendo; numquid, operatione minus bene succedente, oculus sanus male inde affici posset; respondi, me quidem ejus plane certum non esse, sed magnam affulgere boni eventus spem. Nostræ itaque curæ, quum sese commisisset; primo pilulas aliquot hydragogas ipsi dedimus devorandas, ut ita sanguineam massam feri portione liberarem: diductis itaque palpebris, luci obverso, in pupillæ medio (ubi vasa minima) Corneam pellucidam, acus nostræ beneficio, perforavimus; Oculique globus, ab humore aqueo rivulose profiliente, statim quinta circiter parte, in sua circumferentia minor reddebatur; molemque ejus diminuere adhuc potuisssem, si leviori saltem compressione hu-

moris aquosi exitum promovissem : sed studio illud omisi , ne vim aliquam oculo jam læso inferrem , & quod simul etiam humoris aquei regenerationem exspectarem , hinc in diem sequentem alia exploranda deferre consultum.

Nec mea me fefellit opinio ; sequenti die oculus pristinam magnitudinem recuperarat ; ideoque ex vulnusculo pro secunda vice jam pertuso , oculique globo pressio , majorem extraximus aquæ portionem ; quo etiam apparuit , oculi bulbum manifestius diminutum , quam à prima pertusione. Non tamen in eo statu mansit , sed tertio die , à novo humore influxo , iterum apparuit distensus , minus tamen quam à prima punctione : ideoque in sequentem diem quartum , tertiam pertusionem deferendam judicavimus ; quo tempore , uti die secundo , à prementi interna aqua , extensum vidimus : hinc pro tertia vice cornea pertusa , vulnusculoque majori læsa  
copio-

copiosiore fudit aquæ copiam.

Interea temporis collyria vulgaria, levioribus adstringentibus conflata (compressoque iisdem imbuto externè admoto) fuere adhibita; in diæta à liquidis, falsis, acidis & aromatibus, quantum possibile abstinuit. Quinto & sexto die spes aliqua curationis affulgere cœpit; notabiliter enim oculi globus non augebatur. Die septimo & octavo sensim iterum accrevit, hinc decimo die, pertusa cornea, (ab immisso tubulo subtiliori) tantam aquei & vitrei humoris quantitatem fugendo eduximus, ut à naturali magnitudine parum saltem differret. Quo in statu per integrum triduum mansit, oculo sano interim nihil mali sentiente. Decimo quarto tamen die, naturalem magnitudinem quum iterum sensim superare inciperet; pro ultima & quinta vice (eadem methodo, uti die decimo) humores extraximus, & quidem tali cum successu, ut ab illo tempore desideratam magnitu-

gnitudinem servaret oculus toties pertusus.

Ut autem tali in statu servarem , laminam plumbeam & concavam fabricari mihi curavi , eamque intra palpebras , ad superficiem oculi affecti adaptatam ( oculorum artificia-  
lium in modum ) per aliquot dies gestavit , eaque tantum profecimus , ut oculo ita compresso , fibrisque contractis nullo modo amplius extendi potuerit. Hisce ita assuefactus , postea oculum artificialem ad-  
movimus , quem adeo dextrè applicat & gestat , ut non facile quis advertat , ipsum oculo uti fictitio.

Similem fere casum proponit *Cl. Valentini* Observ. lxx. in Ephem. German. Anni sexti. Ubi patientem introducit Hydrophthalmia laborantem , ad quam funditus curandam eradicatio oculi jam erat proposita. Tentatum tamen primò fuit , an non pertusione oculi aliquid effici posset , quod adeo feliciter cessit , ut evacuato humore malum prorsus fuerit victum.

Non



Non minus notabilem Casum notare Oculus  
Tuber-  
osus. mihi licuit in Matrona quadam honestissima Hagienſi, cujus oculi bulbum, prægreſſa gravi Ophthalmia, non adeo quidem extenſum, ſed tribus excreſcentiis, cornuum in modum, obſitum conſpeximus. Variis incuſſum adhibitis, tandem conſultum fuit, ejuſdem acus beneficio, unam ex his protuberantiis (quas ſuſpicabamur humore aqueo repletas eſſe) pertundere. Quod tanto cum ſucceſſu peractum, ut abundanter aqua promanaret, ſingulæque protuberantiæ minores redderentur. Collyrium interim leviter adſtringens adhibutum ejus incrementum impedire non potuit; ſequenti enim & tertio die iterum propullulare tubercula vidimus, ideoque idem, quod ante, perforandum judicavimus, hocque tam feliciter iterum præſtitum, ut peractâ hæc operatione, naturalem jam magnitudinem & formam non ſuperaret oculus affectus, diuque in tali ſtatu manſerit: poſtmodum tamen ex  
ipſius

ipsius ore accepi , prominentiam dictam bis terve adhuc fuisse pertusam , copiosamque effluxisse aquam. Hoc autem incommodo se jam plane liberatam vivere affirmat.

Humor  
aqueus  
ex ocu-  
lis ex-  
tractus.

Canis unoculo , inflicto prope iridem vulnere , humorem aqueum rivulose promanantem extraxi , & cornæ jam flaccidæ de sequenti medicamento applicui ,

*Rx. Album. Ov. Conquassat.*

*Bol. Armen.*

*Aq. Plantag.*

Hujus mixturæ oculo læso per intervalla applicui tantillum , canisque interea loco obscuriori servatus , eadem adhuc vesperâ oculi vigorem recuperavit , & tertio , post institutum experimentum die , æque ut ante vidit *μονόφθαλμος*. Idem experimentum in quamplurimis aliis quadrupedibus postmodum institui , modo cæsim , modo punctim oculi tunicam perforans & semper successu felici. Nec ita pridem illud ipsum publicè coram multis celebravi , cum even-

eventu itidem desiderato, nihil aliud subinde applicando, quam sequentis mixturæ tantillum,

℞. *Aq. Rosar.*

*Alb. Ov. Conquassat.*

*Bol. Armen.*

*Caphur.*

quibus paucorum dierum spatio restitutum visum conspexerunt plurimi. Nec necesse habui, medicamenta multo labore parata in usum adhibere; ratione enim & experientiâ jam didiceram, incassum ad medicamenta, olim pro secretis habita, confugere, qualia fuere Aqua elicta ex Foliis Chelidoniæ per M. B. cum admista Caphura: Aqua item Vitrioli Martis mysteriose præparata, aliaque olim Cl. Th. Bartholino communicata à Domino Burrho. Chelidonium etiam speciatim huic usui inservire voluere Veteres, eo quod crediderint; *Hirundines*, oc-  
*cæcatis pullis*, visum restituere suâ Chelidoniâ potuisse, sed quum nunquam ejus generis herba in nidis hi-  
run-

rundinum reperta sit , hæc pro fragmentis potius habenda censemus. Verum non aliud medicaminis genus necessarium magis esse putavi , quam quod mucagine quadam labia vulneris oblinire , & viam quodammodo præcludere valeat , ne aqua de novo progenita per vulnus elaberetur : dein , & quo inflammatio arceri & levi adstrictione extrema vasorum apertorum claudi possint ; quibus indicationibus medicamentum nostrum absolutissime respondet. Methodum reliquorum oculi humorum restituendi consulto prætereo , cum de Humore Aqueo tantum hic loci agere decreverim.

Subi-  
taneæ  
humo-  
ris a-  
quei  
rege-  
nerati-  
onis  
ratio  
reddi-  
tur.

Quis , quæso , jam humoris tam subito regenerati viam nobis monstraret , nisi Novos Ductus nostros in usum adhibeat ? Quibus manifestissime probatur , non medicamento-  
rum vi hunc humorem regenerari , sed à novo humore secreto & per hos Ductus delato , oculi bulbum repleri , naturalemque figuram & ma-  
gnitu-



gnitudinem recuperare Ne tamen quis putet, hanc humoris aquei restitutionem in quadrupedibus tantum, aliisve brutis animantibus locum habere, expertus dico, etiam in Oculis Humanis læsis eandem valere, & successu non minus felici præstari posse. Quod jam observationibus & historiis quibusdam ostendere non gravabimur.

Quinquennis Puellæ sinistra palpebra superior, instrumento quodam pungente ita læsa fuit, ut ea non modo ad latitudinem sesquilineæ mathematicæ scissa fuerit, sed & pungens instrumentum per corneæ tunicam adactum, exituro humori aqueo viam paraverit, qui copiose effluxit, genam patientis madefaciendo. Vocabatur Chirurgus, ut oculo, visu jam destituto, medicinam faceret, qui visus restitutionem impossibilem pronunciavit: interim itur ad nos, nostrum expetitur consilium; curavi primo, emplastro glutinoso ut labia vulneratæ palpebræ

Hu-  
mor A-  
queus  
restitu-  
tus  
in  
puella.

I

addu-

adducerentur , oculo læso medicamento supra præscripti , ( & toties cum successu in vulneratis canum oculis adhibiti ) singulis bihoriis tantillum applicari jussi , loco obscuriori quietam se teneret patiens , expresse mandavi : Alimenta liquida fumeret , ne duriorum masticatione ( qua oculi sæpe solito magis moventur ) vis aliqua inferatur , aut commotio ; His ita præscriptis , & diligenter observatis , paucorum dierum spatio restitutam vidimus patientem , remanentibus solum & in palpebra & in cornea exiguis cicatricibus , quæ tractu temporis in tantum disparuerunt , ut jam non nisi leve post se relinquant vestigium.

Alia  
Histo-  
ria.

Antè aliquot menses cuidam Puellæ Hagiensi , duodecim annorum natæ , oculorum alter , in pupillæ limitibus , assulâ adeo graviter læditur , ut aqueus humor statim ex oculo emanaret , & tam copiose , ut plane flaccidus appareret , cum dolore haud levi & inflam-

flammatione subsequente : parentes multum attoniti , Chirurghi alicujus opem implorant : hic , quia non diu ante ex ore nostro historiam prædictam hauserat , idem applicuit medicamentum , observatis iisdem , quæ & ibidem memoravimus : quibus triduum intra oculo vigor rediit , duarum septimanarum spatio vulnus plane consolidatum , & patiens sanitati restituta fuit , cum hoc solummodo remanente incommodo , quod cicatrix , ad pupillæ meditullium sese non nihil extendens , in causa sit , ut , dum oculum deorsum movet ( assulâ enim inferior pars magis læsa fuit ) aliquod inter videndum sentiat impedimentum , objecta tam distinctè non dignoscendo ; à qua tamen eam sensim immunem fieri sperare licebit , ubi cicatrix ( quod vulgo fieri solet ) tractu temporis evanuerit.

Generosissimi Officiarii oculi cornea pellucida margine acutioris vitri ita læditur , ut aquei non tantum

Separata  
Humo-  
ris vit  
rei parte  
visus re-  
stitutio.

portio , sed & vitrei humoris pars per corneam fissam exiret , propriâ tunicâ adhuc inclusa , in oculi superficie convexa hærente. Vocatus judicabam dictum humorem propul-  
sulantem auferendum esse ; quodque acus nostræ beneficio feliciter adeo peractum , ut , post adhibita collyria adstringentia & glutinosa , non nisi leve cicatricis remanserit vestigium , & qui antea objecta fere omnia ut fissa & per medium divisa videre solebat , jam ferè ut olim eadem distinguit perfectè.

Alia Hi-  
storia.

Haud absimilem affectum videre licuit in juvene septendecim circiter annorum , cujus oculo læso applici-  
tum fuit Collyrium ,

*Rx. Mucilag. Sem. Psyl. & Cydo-  
neor. Aq. Rosar. Extract.  
Croc.*

*Album. Ovi Conquassat.*

*Sief Alb. &*

*Spirit. Vin.*

*M.*

Quo



Quo solo , calidè adhibito , sensim melius habere cœpit , tandemque restitutus fuit patiens.

Sunt , qui *Ufu Catechu* ejusmodi usus Catechu in Vuln-ribus Oculorum. oculorum vulnera restitui posse affirmant , idque feliciori successu , quam quidem ullo alio medicamine , quodque confirmatur à *D. Hagendornio* *Miscell. Med. Physic. Ann. 9. & 10.* sequenti exemplo. Ancilla , inquit , casu quodam rupturam oculi experitur , quâ humor oculi aqueus tam copiose effluxit , ut oculi figura , quæ ante globosa , jam collapsa appareat , cum hæmorrhagia , partium vicinarum tumore & intolerabili dolore. Accersitus Chirurgus *Collyrium* immittit ex *Aq. Ros. Album. Ovi & Bolo Armena*. Externe *Epithema* applicat ex *Tutia , Bolo Armena , Caphura , Croco , cum Aq. Fœnic. Euphrag. Rosar. paratum* ; Verum cum levamine fere nullo ; tandem supradictus *D. Hagend.* in consilium vocatur , qui pulvisculum immisit concinnatum ex *Catechu , Myrrha*

& *Sacch. Cand.* qui per vices in oculum immittitur : unde elapso paucarum horarum spatio, sanguinis humorisque aquei fluxus cessavit : Postmodum hic pulvis aquis quibusdam ophthalmicis junctus, calidè in oculum instillabatur, sicque oculus pristinam figuram recuperavit.

Oculi læsi restituntur subinde sine applicatione medicamentorum. Sed quid Catechu? quid Chelidonium, de qua ante, aliaque medicamenta varia memorabimus? Expertus novi, loco saltem obscuriori servato animali, (post cornæ læsionem, & humoris aquei expressionem) decem horarum spatio, oculo humorem redditum fuisse, & nuperrime adhuc in Theatro nostro Anatomico publicè idem demonstravimus in cane, cui ex vulnerato oculo tam copiose effluxit Humor Aqueus, ut flaccidus appareret oculus læsus; observatum tamen, elapso sex horarum spatio, oculi bulbum humore suo iterum repletum fuisse, idque sine ulla medicamentorum applicatione. Non diu ante, ex eodem

dem hoc cane , non solum Lienem , sed & Renem alterum per inflictum vulnus extraximus , ligatisque vasis sanguineis abscidimus , & ad cicatricem vulnera inflicta facile perduximus ; post triplex tamen hoc institutum experimentum , hodiè adhuc bene videt & valet canis.

Sed , ut redeamus ad Oculos læfos ; ipsum Galenum non latuit , Oculos ita vulneratos restitui posse : *Cæterum* , inquit alibi , *incredibile quiddam , nec fieri vulgo solitum , in puero vidimus , qui stylo in pupillæ loco fuerat compunctus ; nam quum statim effluxisset aquosus humor , tum pupilla ipsa minor est reddita , tum tota Cornea apparuit rugosior. Cæterum sanatus postea recte videt , collecto scilicet , paulatim in eo , qui effluxerat , humore.* Et si fides habenda Historiæ Byzantinæ Scriptoribus , testantur hi , Imperatores Constantinopolitanos quosdam , quorum oculi pungente instrumento ( qua de causa , super-

vacaneum hic dixisse) ita lædebantur, ut aqua efflueret: brevi tamen postea oculorum & vigorem & præter expectationem visum recuperasse.

Ita ex fide dignis accepi, nebulonis cujusdam, ob grave aliquod crimen, judicis mandato, oculum unum atque alterum fuisse pertusum. Quo facto, visu privatus carceri fuit inclusus; sed quod mirabantur omnes, paucos intra dies, sine ullo medicamentorum ope, lucem non tantum aspicere, sed distincte videre coepit.

Vulnus pupillæ sanatum vide apud *Tulpium* Lib. I. Cap. 30. Sagitta, inquit, decidens ex altiori loco, discidit cujusdam equitis filio tam latè pupillam: ut effunderetur non tantum aqua, oculo inclusa: sed concideret quoque membrana uvea, hebescente inde usque adeo visus acie, ut ne admotum quidem candelæ conspiceret lumen: Inter medicamenta adhibita primas tenuisse ait, Collyria  
cum



cum anodyna, tum exsiccantia: quibus similiter usque adeo benedixit Deus, ut inducta vulneri cicatrice, brevi succreverit iterum aqua deperdita: & pulsa caligine redierit rursus, gratissimum visus officium: verum naturali imbecillius: ob cicatricem, uveæ, à vulnere, relictam.

Notabilis etiam prostat casus apud D. Joh. Muys Practicum Arnheimensem, in Praxi Chirurgica Rationali, Dec. 1. Observ. 7. Ubi Juvenem proponit, globulo sclopeti minore, iridem inter & pupillam ita læsum, ut magna sui copia humor non tantum effluxerit aqueus, sed materia insuper visa fibrosa candicansque, vulnus obturans, & præter inflammationem tumoremque, livore conspicuum oculum, acidum acrimoniamque temperantibus feliciter tamen restituit.

Hæc si minus verisimilia videantur, testem adduco *Josephum Zambeccarium*, qui de Doctore quodam *Nerio* narrat sequentia: *Canis*, in-

quit , binos oculos , scalpello Chirurgico , quo venas aperire solent , dextrè confodit , & ex iis totum humorem aqueum expressit , ita ut oculi , tanquam duo sacculi vacui , corrugati manserint : Cane deinde sub solius beneficæ naturæ tutela relicto , post sex horas , & breviori forsân tempore , ipsius oculos repletos fuisse , & ad statum naturalem redusse ; cicatricis nota solum remanserat , & canis lætus & alacer erat , ac si nullo affectus fuisset incommodo , & quod pluris interest , cæcus non manebat , & acutè videbat.

Idem Experimentum in variis aliis canibus , cuniculis , Indicis porcellis & agno rursus tentavimus , semper omnes intra paucas horas felicissime sanati sunt , & adeo incolumes evaserunt , ut ne unus quidem ex ipsis ex inflicto vulnere cæcus remanserit.

Hæc autem , quæ Neriùs expertus est , verissima sunt , sed locum saltem habent in oculis , quibus pun-  
gente

gente acu , aut alio quopiam instrumento , sed tenello , vulnera infliguntur exigua ; si vero majusculum fuerit vulnus , intimiusque adactum instrumentum pungens aut secans , sanandi methodum , quam supra proposuimus , observare præstabit.

### CAP. III.

#### *De Anatomia Humoris Aquei.*

**S**anguine bene disposito , Ductibusque nostris rite constitutis , continuo hic Humor Aqueus , dum spiritus artus nostros regit , oculum versus amandatur , quo sine visionem peragi impossibile quidem. Cum itaque tanta ejus sit præstantia , in humoris hujus naturam ulterius inquirere lubet. Cogitaram alioquin huic Tractatui jam finem imponere ; verum succurrebat , Humorem Aqueum ; eo modo , quo proposui , a nemine adhuc , quod sciam , examinatum esse : ideoque hunc intantum

Hu-  
moris  
Aquei  
cogni-  
tio ne-  
cessaria.

Etum transmittere non potui ; utpote summæ & utilitatis & necessitatis ; ut tanto melius ; & feliciori cum successu , in affectibus quorundam oculorum , medicamenta possumus adhibere : præ cæteris autem illa medicamenta examini nostro subjiciemus , quæ vulgo Ophthalmica audiunt , ut ( iisdem diversimodè Humori Aqueo junctis ) videamus , qualis particularum inter se sit consensus aut dissensus ; quamvis præter hæc nonnulla alia in eundem Humorem sumus instillaturi ; ut ex varia eorum miscela , vera inde resultet Humoris Aquei constitutio.

*Exper. I.*

Humorem Aqueum ex diversis animalium oculis extractum , clarum semper invenimus , aquâ tamen vulgari minus limpidum , consistentiâ suâ ferè convenientem cum albumine ovorum exagitato ; quamvis animalium adulatorum humor consisten-  
tiæ



tiæ semper erat crassioris & coloris magis opaci, juniorum vero animalium humor, fluidior conspiciebatur & coloris magis pellucidi. *Saporem* quod spectat, insipidum eum ferè deprehendimus, nisi quod aliquantulum de falsedine videbatur participare, quam tamen magis in adultorum, quam juniorum animalium humoribus gustavimus. *Odorem* si examines; humorem hunc recens extractum, inodorum percipies; si vero per aliquot dies in vitro fervetur, eodem ferè modo nares offendit, atque albumina ovorum in vitro per octiduum servata, quæ foetore nares ferire solent.

Qualis  
sit Co-  
lor, Sa-  
por &  
Odor  
Humo-  
ris A-  
quei.

### Exper. II.

Inter medicamenta Ophthalmica primæ considerationis erunt aquæ quædam stillatitiæ, ideoque *Humori Aqueo* affudi *Aquam Rosaceam*: verum hi liquores non miscebantur, nisi igni leniori admoti: quo tantillum de pelluciditate sua remittebant & colo-  
rem

Aquæ  
Oph-  
thalmi-  
cæ exa-  
minan-  
tur.

rem sublividum repræsentabant: addito *Vitrioli Cyprei* pulvere, color paulo magis cæruleus evasit, cum mixti particularum secessione.

Vitriolum quid faciat?

Hisce cum superadderem *Vitrioli Albi* pulverem, ex cæruleo iterum pellucidior clariorque reddita fuit miscela, remanente tamen partium secessione. Eundem mistionis ordinem observavi, cum *Aquis Fœniculi & Euphragiæ*; verum nihil peculiare, præter ea, quæ dicta sunt de *Aqua Rosarum*, observare potui.

### Exper. III.

Perscrutaturus, num cum *Aqua Plantaginis* eodem modo sese res haberet, quemadmodum compereram cum aquis *Rosarum, Fœniculi & Euphragiæ*; hanc observavi differentiam, quod *Aqua Plantaginis* cum *Humore Aqueo* minime se misceri pateretur; quamvis cum utroque adjecto *Vitriolo* eadem, quæ supra, observaverim.

Ex.

*Exper. IV.*

Certus esse volui, utrum hæ præcipitationes admittance solius *Aquæ Rosarum* cum *Vitriolo* uno & altero contingerent; Verum hæc nihil mutationis subiit, quam quod *Vitriolum* cum aqua bene fuerit mistum, sine ulla particularum secessione: idemque etiam observare licuit, cum *Vitriolum* cum *Aqua Fœniculi* compo-  
nerem.

*Exper. V.*

Ut explorarem misturam *Aquæ Euphragiæ* cum *Saccharo Saturni* & *Humore aqueo*, observavi primo, Aquam cum dicto *Saccharo* bene misce-  
ri, sed lactei coloris evadere: verum addito *Humore Aqueo*, Humor in coagulum abiit, & liquidum, quod ante lacteum, iterum limpidum evasit; ut autem viderem, quid eveniret, si hisce *Oleum Tartari per deliquium*

*liquium* affunderetur , observavi ex  
ejus admistione, coagulum illud ite-  
rum ex parte dissolvi ; liquorem ve-  
ro (cui innatarat coagulum dictum)  
lac tenuius referre.

*Exper. VI.*

Succus  
Cheli-  
doniæ.

Quod magnarum virium *Chelido-*  
*nia*, in affectibus oculorum nonnul-  
lis habeatur , *Humorem Aqueum*  
ejus succo admiscere volui ; sed leni  
ignis calore statim partium subsequen-  
ta fuit secessio: hisce addidi Vitrioli  
pulverem , verum nihil inde muta-  
tionis subiit mistum. *Chelidonia*  
*Succum* etiam seorsim examinavi  
verum igni admotus eandem patieba-  
tur secessionem. Solo autem *Succo*  
*Chelidoniæ* si inspergatur *Saturni*  
*Saccharum* , statim hæc exacte in-  
ter se miscentur : huic misto si ad-  
datur *Spiritus Vini* , eadem mixtura  
manet , exactissime unita.

*Ex.*



## Exper. VII.

Ut scirem , qualis inter Lac & Humorem Aqueum esset convenientia , primo *Lac Vaccinum* miscere cum *Humore Aqueo* institui. Quæ facillime inter se miscebantur , verum , ex admisto Vitriolo , statim coagulum album fuit secretum , sero suo ( quod saporis expers erat ) innatans. Simul etiam idem tentavi experimentum cum *Lacte Muliebri* , recenter mulcto ; verum hanc observavi differentiam , quod admistione Vitrioli , particularum quidem subsequuta sit secessio , nulla tamen coagulatio.

Lac  
Vaccinum &  
Muliebri ex-  
amini  
subjici-  
tur.

## Exper. VIII.

Alicui pariter *Humori Aqueo* affudi *Vinum album Gallicum* , dulce ; cuius affusione notavi , Humorem Aqueum non dissolvi , sed viscidum magis reddi , & parum saltem de

Vinum  
Album  
Galli-  
cum.

K

natu-

naturali suo statu recedere. Idem contingit, si *Humori* dicto affundatur *Vini Spiritus*, ex quo mutatio ab omni parte similis deprehenditur. Eidem *Oculi Humori* si addatur *Spiritus Vini Caphuratus*, non magis quam à vino aut spiritu vini alteratur.

### Exper. IX.

Spiri-  
tus Sa-  
lis Ar-  
monia-  
ci.

In aliquam *Humoris Aquei* portionem instillavi *Spiritum Salis Armoniaci*, quo dictus Humor statim fuit dissolutus, & cum Spiritu intime junctus: addito *Metallorum Croco*, mansit mixtura, sine ulla partium turba.

### Exper. X.

l'Eau  
de la  
Reine.

Ut viderem, quid eveniret ex admixtione *Humoris Aquei* cum *aqua Reginae Hungariae*, (l'Eau de la Reine d'Hongrie) observavi, hæc bene inter se conjungi; Humor enim  
Aqueus

Aqueus statim fluidior fuit redditus, & intime Spiritui junctus: Hisce admiscui *Vitrioli* pulverem, quo non quidem in coagulum abiit humor; sed particularum aliqua subsequuta secessio, quæ particulæ fundum petiere, remanente tamen spiritus & humoris fluiditate.

## Exper. XI.

*Humori Aqueo* affudi tantillum *Tincturæ Croci*, quæ statim exacte <sup>Tin-ctura Croci exami-</sup> *Humori* jungebatur: hisce addidi pulverem *Aloës*, *Sacchari Albi*, *Hepatis Antimonii*; attamen mansit mixtura, sine particularum perturbatione: tandem superaddidi *Vitriolum Cypreum*, & statim partium conspiciebatur secessio. <sup>natur.</sup>

## Exper. XII.

Exploraturus, quid mutationis observarem inter *Tincturam Opii* & *Humorem Oculi Aqueum*; vidi hæc <sup>Tin-ctura Opii.</sup>  
K 2 bene

bene inter se misceri ; additione *Spiritus Salis Armoniaci*, *Tincturæ Croci* & *Sacchari Canti albi* ; mixtura in eodem statu permanfit, fine ulla particularum feceffione aut præcipitatione : fuperaddita hifce *Tutia*, non tamen mutabatur mixtura, quamvis *Tutiæ* pulvis vafis fundum peteret.

*Exper. XIII.*

Olei Caphuræ  
examen  
infti-  
tuitur.

Ut examinarem, quâ *Oleum Caphuræ* & *Humor Aqueus* inter fe convenirent, vidi *Oleum* illud *Humori* fupernatare : additione *Spiritus Vini*, *Oculi Humor* quidem parum diffolvebatur, fed maxima pars fub forma filamentorum petiit fundum, globulis interim quibufdam oleofis per tenuiorem *Humoris* portionem fluctuantibus.

*Exper. XIV.*

Separatim examinavi *Oleum Caphuræ*



*phuræ Saccharo Albo* exceptum, <sup>Sac-</sup>  
 & cum *Spiritu Vini* mistum : qui- <sup>charum</sup>  
 bus observavi, *Oleum* quidem in <sup>Al-</sup>  
 exiguos admodum globulos divisum, <sup>bum.</sup>  
 non tamen in totum dissolutum fuisse : addito hisce *Humore Oculi A-*  
*queo* humorem partim dissolutum,  
 partim vero filamentorum quorundam adinstar ad fundum præcipitatum conspexi.

### Exper. XV.

Exploraturus, qualisnam mutatio <sup>Aloë</sup>  
 sequeretur ex miscela *Humoris A-* <sup>cum</sup>  
*quei* cum *Aloë* in tenuem pulverem <sup>Sac-</sup>  
 redacta; notavi, hæc principio qui- <sup>charo.</sup>  
 dem bene convenire, sed brevi post  
*Aloë* quodammodo in coagulum  
 abire : at additione *Sacchari Cantii*  
*Albi* intimius iterum conjungi : separatim vero si misceatur *Humor*  
*Aqueus* & *Saccharum Cantum Album*, nulla mixturæ perturbatio accedit.

## Exper. XVI.

Metal-  
lorum  
Crocus  
exami-  
natur.

Si vero misturæ *Humoris Aquei* & *Sacchari Canti Albi*, addatur *Metal-  
lorum Crocus*, particularum exigua-  
rum inde subsequetur præcipitatio;  
sed additione *Vitrioli Cyprei* Humor  
Aqueus totus fere coagulatur, & ca-  
seosus quasi redditur; remanente,  
cui innatabat, feri aliqua portione,  
sed admodum tenui.

## Exper. XVII.

Sac-  
cha-  
rum  
Saturni.

Ut examinarem *Humorem Aqueum*  
mistum cum *Saccharo Saturni*  
(igni non admotum) notavi totum  
ferè in coagulum album abire, &  
tantillum saltem feri restare. Sepa-  
ratim vero si examinetur *Saccharum*  
*Saturni*, *Vino* junctum, bene hæc  
inter se misceri liquidò constabit.  
Similiter & *Saturni Saccharum* cum  
*Aqua Rosarum*, optime conjungi-  
tur.

Ex-

## Exper. XVIII.

*Humor hic Aqueus ex admisto Saccharo Saturni in coagulum mutatur. Additione Olei Tartari per Deliquium lactescit & ferè totum dissolvitur. Separatim vero si examines Oleum Tartari per Deliquium cum Humore Aqueo mistum, videbis Humorem Aqueum tenacem reddi & incrassescere, albuminis ovi non agitati instar; si vero addatur Vitri Antimonii pulvis, Humor Aqueus iterum magis dissolvitur.*

Olei  
Tarta-  
ri per  
Deli-  
quium  
exa-  
men.

## Exper. XLX.

*Quod Oleo Tartari contingit, idem etiam observabis ex admistione Olei Sulphuris per Campanam & Humoris Aquei, principio quidem conspicietur liquor lacteus, sed brevi in coagulum transit Humor Aqueus. Eademque ferè observantur, si Humori dicto instillentur guttulæ ali-*

Oleum  
Sulphu-  
ris.

quot *Spiritus Nitri* ; quo iterum primo lactescit Humor , sed statim in coagulum transit ; remanente , in qua fluctuat , tenui aquâ : hisce si addatur *Olei Caphuræ* tantillum , coagulum ferè in totum dissolvitur.

### Exper. XX.

Cerussa.  
fa.

Ut notarem , num *Cerussa* cum *Humore Oculi Aqueo* posset jungi ; vidi , principio Humorem in coagulum abire ; postmodum vero , ubi partes diutius paulo agitaram , eundem iterum tenuiorem reddi , & lactis formam induere.

### Exper. XXI.

Vitriolum.  
lum.

*Vitrioli Cyprei* pulvis si inspergatur *Humori Aqueo* , Humor hic partim in coagulum abit ; partim vero , si agitetur , in tenuem aquam transit. Eidem Humori si addatur pulvis *Vitrioli Albi* , mistura in totum mutatur & in coagulum album transit.

Ex-



## Exper. XXII.

Ut certior fierem, quî *Humor* di-  
 ctus & *Vitri Antimonii* pulvis sese  
 jungerent; notavi itidem, *Humo-*  
 rem partim coagulari, coagulumque  
 flavescentis coloris evadere; partim  
 vero tenuioris aquæ formam repræ-  
 sentare. Idem observatur, si *Hu-*  
*mor Aqueus Metallorum Croco* ad-  
 misceatur. Ubi coagulum itidem fla-  
 vescit, sed aqua secreta ex flavo ni-  
 gricantis coloris conspicitur.

Vi-  
trum  
Anti-  
monii  
exa-  
mini  
subji-  
citur.

## Exper. XXIII.

Hæc Experimenta quum non suf-  
 ficerent, ulterius Humorem Aqueum  
 examinandum esse necessarium duxi;  
 Ideoque Humoris hujus drach-  
 mas quinque retortæ indidi & leni  
 igne destillationem institui; vix igni  
 incalescebat vitrum, quin Humor  
 in coagulum album, sed tenuioris  
 consistentiæ, abiret; & brevi post

Destil-  
latione  
exa-  
mina-  
tur Hu-  
mor A-  
queus.

in plurimas bullulas (instar smegmatis Hispanici aquâ agitati) mutabatur: dissipatis bullulis, iterum coagulum apparuit; sed crassius quam ante, & majoris consistentiæ. Aqua autem, quæ guttatim in vas recipiens stillabat, limpida erat & admodum pellucida: destillationem ad siccitatem continuavi, & aquam destillatam observavi pendere drachmas tres cum semisse, saporis & odoris expertem: Caput mortuum vero pendebat grana viginti duo, quod colorem ex obscuro flavum repræsentabat, cujus partes omnes tenaciter inter se cohærebant; exceptâ exiguâ earum portione, quæ friabilis, in pulverem facile redigi poterat. Odorem spirabat empyreumaticum, & falsedo ejus perfectè linguâ potuit dignosci. Hoc autem Caput Mortuum aquâ si facile dissolvi posset, necessario particulæ ejus salinæ aquâ istâ absorberentur; quâ iterum evaporatâ, forte aliquot grana, substantiæ plane salinæ post evapora-

porationem restarent ; verum quum observarem , hoc Caput Mortuum , particulis suis tenacibus & viscidis tanquam vinculis firmissime teneri , vix operæ pretium judicavi , illud Experimentum instituere.

Hisce ita demonstratis , jam manifestum redditur , quibus particulis constet Humor Oculi Aqueus: *Primo* enim aquam in se continet admodum limpidam & pellucidam : *Secundo* , particulis scatet viscidis & tenacibus: *Tertio* , sal in se continet atque acidum: *Quarto* , particulas insuper habet terrestres : *Quinto* , non destituitur suo spiritu volatili. Hac itaque methodo via patebit , quâ varia medicamenta in Affectibus Oculorum , qui dependent à vitiosa Humoris Aquei constitutione , sint præscribenda & applicanda ; quâque , præter jam usu recepta , quisque ingeniosus facile alia invenire poterit , quæ Humorem Oculi bene constitutum præservare , & malè affectum corrigere valebunt.

## CAP. IV.

*De Fonte Salivali Novo hæcenus  
non descripto.*

**P**ræter quatuor Glandularum Salivarium , totidemque Ductuum paria , novum in lucem protrahimus Fontem Salivalem , Glandulæ Nostræ jam descriptæ adsitum , casu potius quam arte , nuperrime nobis detectum. Videndo enim , à latere quarti paris Glandulæ , aliam occurrere Glandulam , itidem conglomeratam , sed acinis multo minoribus conflata , & Glandulæ Nostræ parte sui aliqua esse subjectam , cogitare coëpi , hanc ab altera esse diversam , & vase aut vasculis excretoriis fortè non esse destitutam.

Neque etiam aliter inveni ; re enim exactius examinata , Glandulam hanc , priori contiguam , & intermediâ membranulâ quasi continuam repperi ; ex eademque Ductus

modo



modo tres, modo quatuor (quorum singuli distinctas habebant ramificationes) prodire excretorios; hosque non raro colore atro donatos, ostiis suis, gingivarum tunicam perforare, Salivamque in os exspuere observavi, uti ex *Tab. VI. Fig. 2.* colligi potest. Naturalem vero magnitudinem indicabit *Tab. VI. Fig. 3.*

Quod autem Glandulæ hujus spectat vasa, sive illa sanguinea fuerint, sive nervosa aut lymphatica, de iis nihil dicam, quandoquidem ab eodem ramo (quo focia sibi Glandula ramificationes habet) suis exornatur furculis.

Usum ipsi adscribimus eundem, quem reliquis Glandulis Salivalibus; ita tamen, ut singularis videatur utilitatis; quum hæc, obstructâ forte sibi fociâ Glandulâ, Salivæ modicam, & solito majorem quantitatem secernere & in os exspuere posset.





Atque ita novo invento, numerum

rum Glandularum, Ductuumve Salivalium adaugemus, novoque propterea nomine insigniendos censemus. Convenientius autem nomen, præter **FONTEM SALIVALEM** imponere non potuimus, idque unicè hanc ob rationem, quod ex hac Glandula tres quatuorve Ductus, tanquam totidem fonticuli, prodeant.

In Subjecto Humano eadem detegere nondum potui, quandoquidem jam ab aliquo tempore cadaveris humani partes, Salivam deponentes examinare non licuerit: meminì tamen, me olim ostia quædam, hisce non absimilia in cadavere humano notasse, de quibus hodie nihil certi asserere auderem.

**FINIS.**







# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ I.

### Fig. 1.

Warthoni Glandulam & Ductum  
Salivalem exhibet ex Homine,  
nunquam antè delineatum.

- A. B. *Glandula cum Ductu & Rami-  
ficationibus Warthonianis.*
- C. *Ostium Ductus, ubi in os exit.*

### Fig. 2.

Stenonis Ductum Salivalem de-  
lineat ex Homine.

- A. *Glandula Parotis.*
- B. *Ductus cum suis Ramificationi-  
bus per Glandulam dispersis.*
- C. *Ostium Ductus.*

# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ I.

### Fig. 3.

Warthoniani & Bartholiniani  
Ostium commune demonstrat  
ex Ove.


- A. *Ductus Warthonianus.*
- B. *Ductus Bartholinianus.*
- C. *Ostium Commune.*

### Fig. 4.

Bartholini Glandulam Novam  
repræsentat ex Homine.

- A. *Glandula Warthoniana.*
- B. *Ductus ejus cum suis Ramificationibus.*
- C. *Glandula Bartholiniana.*
- D. *Ductus ejus, qui non semper in Homine occurrit.*

Fig 1







# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ II.

### Fig. I.

Glandulas & Ductus in situ  
naturalis notat.

- A.B. *Arteria Carotis, & Vena Jugularis cum suis Ramificationibus.*  
C. *Nervus Recurrens.*  
D.E. *Glandula & Ductus Stenonianus.*  
H. *Glandula & Ductus Bartholinianus.*

# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ III.

### Fig. I.



Glandulæ Nostræ Ductum Ostiumque monstrat, in situ naturali.

- a. *Glandula Nova oculo adsita.*
- b. *Ductus ejus.*
- c. *Ostium prope dentem molarem secundum.*
- d. *Glandula Parotis.*
- e. *Ductus Stenonianus.*
- f. *Ostium ejus.*

### Fig. 2.

Glandulæ Ductusque Novi Ramificationes exprimit, naturalis magnitudinis.

- A. *Glandula Nova.*
- B. *Ductus Novus.*
- C. *Oculus, cui hæc Glandula adsita, in sinistro latere.*







# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ III.

### Fig. 3.

Eandem Glandulam aliter figuratam proponit.

A. *Glandula Nova.*

B. *Ductus Novus.*

### Fig. I.

Arteriæ Ductusque Salivalis Ramificationes delineatas refert,  
ex Glandula Parotide  
Canina.

A. *Truncus Arteriæ à Carotide oriundus.*

b. b. b. b. *Ejusdem Arteriæ Ramuli.*

C. *Ductus Salivalis.*

d. d. d. d. *Ejus Ramificationes.*

# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ IV.

Fig. 1.

Tonfillæ five Amygdalæ De-  
lineatio exhibetur.

A. A. *Tonfilla Vitulina.*

B. *Sinus majores minoresque in Ton-  
sillæ medio.*

Fig. 2.

Ductus Novus Aquosus mon-  
stratur ex Galeo Pisce.

A. *Oculus.*

B. *Nervus Opticus.*

C. *Ductus Novus.*

D. *Locus, ubi corneam perforat.*

E. *Stylus ibidem immissus.*

F. *Styli exitus per læsam corneam.*

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3. A





Fig. 4.







# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ IV.

### Fig. 3.

Ductus Oculi Aquosos ostendit  
ex Cane.

- A. A. *Oculus Sinister.*
- B. *Pupilla.*
- C. *Nervus Opticus.*
- d. d. *Ductus Novi Aquosi.*
- e. *Arteriola multis Ramificationi-  
bus Sclerotidem & Corneam  
tunicam perreptans.*

### Fig. 4.

Ductus Peculiares, ex Aquosis  
oriundos, oculis subjicit.

- A. *Oculus.*
- B. B. *Ductus Aquosi.*
- c. c. *Ductus Peculiares.*


# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ V.

### Fig. I.

**Cranium Caninum repræsentatur**, ferrâ resectum, cerebroque destitutum, ut Ductuum Novorum Origo (naturalis Magnitudinis) conspici posset atque Progressus.

- A. A. *Ramuli Arteriæ Carotidis, cranium perforantes, quorum*
- B. B. *Ramificationes postici, constituunt surculos, cerebri ventriculos petentes, sed*
- C. C. *Antici, componunt principium Ductuum Novorum intra cerebrum, quemadmodum*
- D. D. *Eorum progressum extra cranium, oculis subjicit.*







# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ VI.

### Fig. 1.

Ductuum Novorum Terminum  
exponit.

A. A. A. A. *Tunica cornea separata.*

B. B. *Uvea.*

C. C. *Ductus Novi, partem corneæ, integram adhuc, perforantes, , ut*

d. d. d. d. *Ramificationes ejus, Iridem potissimum exornantes, conspici possent.*

### Fig. 2.

Novum Fontem Salivalem demonstrat.

a. *Ductus Stenonianus.*

b. *Ostium ejus.*

c. *Glandula Nostra Nova.*

d. *Ductus ejus.*

e. *Fons Salivalis, cum quatuor vasculis excretoriis.*

# Figurarum Explicatio.

## Tabulæ VI.

Fig. 2.



Fontis Salivalis Novi Magnitudi-  
nem Naturalem exhibet

- a. *Glandula Nostra cum Ductu.*
- b. *Ostium, ubi gingivam perforat.*
- c. *Fons Salivalis Novus.*
- d. *Quatuor Ostia à totidem vasis ex-  
cretoriis oriunda.*

Fig. 2.



Fig. 3.







# I N D E X

## Tractatus Primi,

### CAP. I.

#### *De Ductu Salivali Novo.*

<b>N</b> on omnia Veteribus cognita fuisse Anatomae docet.	pag. 1
Saliva Veterum.	3
Veterum Opiniones recensentur.	4
Warthoni Nova Opinio.	8
Ductus ex Homine.	8
Ductus Stenonianus.	9
ex Homine.	10
Ductus Bartholinianus.	10
Idem in Oribus aliter constitutus.	13
Glandula Sublingualis constitutio in Homine.	13
Glandularum Salivalium situs naturalis.	15
Ductus nostri Novi.	15
Occasio inventi.	15
Ductus Novi Origo.	18
Glandula Nova Magnitudo.	18
Figura & Vasa.	19
Experimenta in Canibus.	20
Ductus hic Novus ante fuit incognitus.	21
Vocatur hic Ductus, Salivalis Superior Alter.	22

### CAP. II.

#### *De Saliva.*

Salivae in Glandulis Secretio quomodo?	23
L 5	Expe-

# I N D E X.

<i>Experimentum.</i>	24
<i>Modus Secretionis explicatur.</i>	25
<i>Requisita Secretionis.</i>	27
<i>Sanguinis dispositio.</i>	28
<i>Cur Sal saliva non impediatur Secretionem?</i>	29
<i>Utilitas hujus Secretionis.</i>	29
<i>Quo tempore Secretio copiosior fiat?</i>	30
<i>Cur nocte Secretio fiat minor?</i>	31
<i>Unde copiosissima Saliva Secretio?</i>	32
<i>Intempestivi Mercurialium usus noxa.</i>	34
<i>Cur copiosa in Febris, Melancholia, &amp;c.?</i>	35
<i>Critica Saliva Excretio aliquando Salutaris.</i>	37
<i>Quare Saliva non per Ductus Pancreaticos ex- cernatur?</i>	37
<i>Salivationem promoventia.</i>	38
<i>Sternutatoria quid faciant?</i>	39
<i>Unde Frequens Sputatio in Angina?</i>	40
<i>Quare post Oscitationem Frequens Sputum?</i>	40
<i>Quomodo aliquibus rivulose ex ore prodeat Sa- liva?</i>	41
<i>Naturalis Saliva constitutio.</i>	41
<i>Saliva Anatomia.</i>	42
<i>Lue Venerea affecti Saliva examini subjicitur.</i>	44
<i>Saliva ulterius examinatur.</i>	45
<i>Saliva tanquam Universale Menstruum est.</i>	46
<i>Quibus particulis constet disquiritur.</i>	47
<i>Quartana Laborantis vitiosa Saliva.</i>	48
<i>Saliva vitiosa.</i>	49
<i>Lactea.</i>	49
<i>Unde?</i>	

# I N D E X.

Unde?	50
<i>In Calcem excrescens.</i>	51
<i>Saliva Efficacia in Curandis quibusdam Affectibus externis.</i>	52
<i>Cur Spumosa &amp; tenax saepe reddatur Saliva?</i>	54
<i>An aliqualis sit Differentia Saliva in diversis Ductibus secreta?</i>	55
<i>Qualis sit Humor, qui in Ductibus Buccarum, Palati, &amp;c. secernitur.</i>	56
<i>Tonsillae quid sunt?</i>	57

## CAP. III.

### *De Historiis Ductuum Salivalium Male Affectorum.*

<i>Ductuum Salivalium cognitio admodum necessaria Chirurgis.</i>	59
<i>Historia apud Aquapendentem.</i>	59
<i>Hildanum.</i>	60
<i>Galenum.</i>	60
<i>C. Stalpart vander Wiel.</i>	61
<i>Lue Venereâ infecti Historia.</i>	61
<i>Quid Parotidis Exulceratio mali efficere valeat?</i>	62
<i>Ductus Salivales à Tumoribus compressi.</i>	63
<i>Læsis Glandula Ductibus, non semper Fistula subsequitur.</i>	63
<i>An Ductui vulnerato Cantherium applicare conveniat Actuale?</i>	65
<i>Historia ubi in Fistulam transit Ductus.</i>	65
<i>Alia Historia apud H. Roonhuise.</i>	66
<i>Ductus</i>	

# I N D E X.

<i>Ductus Lachrymalis Obstructi Historia.</i>	68
<i>Kerckringii Observatio, ubi in Saccum transie-</i> <i>rat Ductus</i>	71
<i>Ductu leso, non semper formatur Saccus, licet</i> <i>Ostium claudatur.</i>	72
<i>Ductus Salivalis Obstructus.</i>	74
<i>Defensio Ductuum Aquosorum.</i>	79

## Tractatus Secundi.

### C A P. I.

#### *De Ductibus Oculorum Aquosis.*

<i>Humoris Aquei motus cum mechanicis compa-</i> <i>ratur.</i>	95
<i>Anatomicorum error circa Humorem Aqueum.</i>	79
<i>Refutantur Opiniones aliorum.</i>	99
<i>Nostra Opinio &amp; Demonstratio Anatomica.</i>	102
<i>Ductus Novi in variis Animantibus reperti.</i>	103
<i>Cur Novi hi Ductus partim Nigricantes appa-</i> <i>reant?</i>	106
<i>Ductuum Novorum Origo unde?</i>	107
<i>Ulterior Progressus.</i>	109
<i>Cur intorquentur Ramificationes Ductuum?</i>	109
<i>Qua quantitate Oculum subintrat Humor A-</i> <i>queus?</i>	111
<i>Quo Nomine vocandi Novi hi Ductus?</i>	111
<i>Ductus hi a nemine descripti.</i>	112
<i>An utile sit Ductus cognovisse?</i>	113

### C A P.



# I N D E X.

## C A P. II.

### *De Historiis Ductuum Aquosorum.*

<i>Ductuum Læforum Historia.</i>	114
<i>Ductuum Ampliatorum Historia.</i>	115
<i>Oculi Humor Aqueus aliquoties extractus.</i>	120
<i>Oculus Tuberosus.</i>	125
<i>Humor Aqueus extractus ex Animantibus.</i>	126
<i>Subitanea Humoris Aquei regenerationis ratio redditur.</i>	128
<i>Humor Aqueus restitutus in Puella.</i>	129
<i>Alia Historia.</i>	130
<i>Separata Humoris Vitrei parte visus restituitur.</i>	132
<i>Usus Catechu in vulneribus Oculorum.</i>	133
<i>Oculi læsi subinde restituntur sine applicatione medicamentorum.</i>	134

## C A P. III.

### *De Anatomia Humoris Aquei.*

<i>Humoris Aquei cognitio necessaria.</i>	139
<i>Qualis sit Color, Sapor &amp; Odor Humoris Aquei?</i>	141
<i>Aque Ophthalmica examinantur.</i>	141
<i>Vitriolum quid faciat?</i>	141
<i>Humor Aqueus cum Saccharo Saturni miscetur.</i>	141

# I N D E X.


<i>cum Succo Chelidonia</i>	144
<i>Lac Vaccinum &amp; Muliebre examini subji-</i> <i>tur.</i>	145
<i>Spiritus Salis Armoniaci Humori additur.</i>	146
<i>Humor Aqueus &amp; l'Eau de la Reine commiscen-</i> <i>tur.</i>	146
<i>Miscetur prater ea Humor Aqueus cum Tin-</i> <i>ctura Croci.</i>	147
<i>cum Tinctura Opii.</i>	147
<i>Oleo Caphura.</i>	148
<i>Saccharo Albo.</i>	149
<i>Pulvere Alcëtico.</i>	149
<i>Metallorum Croco.</i>	150
<i>Saccharo Saturni.</i>	150
<i>Oleo Tartari per deliquium.</i>	151
<i>Oleo Sulphuris.</i>	151
<i>Cerussa.</i>	152
<i>Vitriolo.</i>	152
<i>Vitro Antimonii.</i>	153
<i>Humor Aqueus destillatione examinatur.</i>	153

## C A P. IV.

<i>De Fonte Salivali Novo hætenus non de-</i> <i>scripto.</i>	156
--	-----

# F I N I S.







ADENOGRAPHIA  
CURIOSA  
ET  
UTERI FOEMINEI  
ANATOME NOVA.

*Authore*

ANTONIO NUCK, Med. Doct.

*In Academia Lugduno-Batava Medicinæ Anatomicæ  
Professore, & Collegii Chirurgici Præside.*

Accedit in hac nova Editione

DISSERTATIO  
ANATOMICO-MEDICA  
INAUGURALIS,

DE

MOTU BILIS CIRCULARI  
ejusque morbis,

OLIM

*Publicè proposita à Clarissimo VIRO*

MAURITIO VAN REVERHORST,

*h. t. Anatomes Professore Hagæ-Comitis.*





*D. met de Penninge sculp.*

*Lugd: Batav: Apud Samuelem Luchtmans.*





ILLUSTRISSIMIS;  
NOBILISSIMIS, AMPLISSIMISQUE  
ACADEMIÆ LUGDUNO-  
BATAVÆ

CURATORIBUS,

D. J A C O B O,  
BARONI DE WASSENAER,  
Domino de Obdam , Hensbroek,  
Spierdijk , Wochmeer , Zuydwijk,  
Kernhem , &c. Equestris Hollandiæ  
Ordinis nomine ad Confessum Cel-  
sissimorum Fœderati Belgii Ordini  
Deputato ; Militiæ Equestris  
Præfecto ; Urbis Willemstadii , Clun-  
dert , &c. Gubernatori , Aggerum  
Rhenolandiaë Adseffori.

D. CONRADO VAN BEUNINGEN,  
J. C. Reipublicæ Amstelodamensis  
Viro Consulari , apud Potentissimos  
Reges, Fœderati Belgii Exlegato.

D. CORNELIO TERESTEYN VAN  
HALEWYN, J. C. Senatori Urbis  
Dordracenæ , ejusque vice Supremi  
Fœderatarum Civitatum Concilii  
Adseffori. Curiaë Hollandiæ quon-  
dam Senatori.

*Eorumque Collegis Magnificis,  
Reipublicæ Leidenfis*

# CONSULIBUS,

D. JOANNI VAN BANCHEM,  
Præsidi.

D. DANIELI VAN ALPHEN, J. C.

D. JACOBO VROMANS.

D. CORNELIO WITTENS, J. C.

NEC NON

*Consultissimo Prudentissimoque  
VIRO,*

D. JOANNI VANDEN BERG, J. C.  
I. I. D. D. Curatoribus à Secretis.


*Salutem & Felicitatem  
precatur*

ANTONIUS NUCK.

DE-



## DEDICATIO.



Umma solet Viatoribus  
& Geographis esse volu-  
ptas , si Terras novas ,  
Maria & Flumina Ma-  
crocosmi incognita ape-  
rire , & aperta delineare

valeant ; ad quæ mercator impiger , ut  
sibi opes quærat , anhelans excurreret :  
sed , quâvis adhibitâ diligentîâ , semper  
superfuerunt Terræ & Maria Incognita.

Idem in Microcosmo locum habere ,  
multiplici experienciâ edocti affirmare  
auderemus. Quæ & quales in eodem  
superfunt Terræ ! quas laboriosus , & in-  
defessus Indagator detegere hætenus  
non potuit : qui Fluvii & Aquarum Tra-  
ctus in eodem latitant Microcosmo !  
quæ subtilissimis invenire , & maximè  
lynceis videre non licuit : ita ut hâc ra-  
tione Hospites adhuc videamur in pro-  
pria Patria.

## DEDICATIO.

Dat tamen hora quæ hora negat, & quæ labore improbo sæpe perfici nequeunt, auspiciatò subinde, & viâ faciliiori perscrutanti patent.

Illud ipsum nobis, *Mecænates Optimi*, nuperis contigit annis: sæpe viribus penè exhaustis Microcosmi interiora perlustrare cupientes, passim vias, quas patulas sperabamus, occlusas non tantùm, sed tot spinis obsessas invenimus, ut inquirentibus vix possibile videretur ulterius progredi. Tandem, bonis avibus, eò usque, sed novis & iteratis aggressionibus, pervenimus; ut Terras non tantùm Incognitas, sed varias Aquarum Scaturigines, & Flumina amplissima, velis quasi expansis, pernavigare liceat.

Quas autem inde nobis comparavimus opes, non mercatoriam sapiunt lucri cupiditatem, sed longè utiliores; quippe ad Sanitatem promovendam, quâ nihil proficuum magis esse potest, unicè conducunt, & utriusque valetudinis, tam secundæ quàm adversæ, fundamenta ita lustrant, ut remedia, partibus affectis admota, eventu agant certiori.

Quum



## DEDICATIO.

Quum jam naturæ legibus sit sancitum, Macrocosmi Scaturigines, quotquot sunt Aquarum omnes, ad suum centrum, Oceanum scilicet, moveri: quid mirum, *Viri Illustres*, & hanc laborum nostrorum messem, ad *Vos* quam citissimè avolare? ad *Vos*, quos jure merito, tanquam beneficum suum Solem & centrum unicum veneratur Scriptor. Tam alta enim in nobis beneficiorum Vestrorum impressa profitemur vestigia, ut eadem, deleri nescia, grati animi nostri, & debitæ observantiæ, perpetuum præbere debeant testimonium.

Hoc opus ut in Vestrum, *Viri Benefici*, patrocinium recipiatis, nosque porro solito Vestro favore complectamini, unicè obtestamur. Deum Omnipotentem supplices oramus, ut *Vos* diutissimè fospitet, certi cum Vestra incolumitate Academiae non tantum, sed & Ecclesiæ, imo Reipublicæ felicitatem conjunctam esse. Scripsi Lugd. Batav. Tertio Non. August. A. C. CIO DCXCI.

# P R Æ F A T I O.

**N**E cramben, non tantum  
his, sed pluries recoctam  
apponere videar, & aliis  
jam diu traditis, repetitio-  
ne molestâ, Lectorum ani-  
mos fatigem; satius esse du-  
xi, varia hic proferre, quæ Anatomicis  
nec usâ nec demonstrata fuere, & propter  
molestissimam eorum indagationem, hæte-  
nus aut omissa aut neglecta.

Multum interea nos debere fatemur  
Viris illis Clarissimis, qui Vasa quædam  
Lymphatica, primum detecta, publicis  
scriptis etulgârunt: inter quos laudem  
sanè egregiam merentur Th. Bartholinus  
Danus, Olaus Rudbeckius Suecus, &  
Jolivius Anglicus. Verè quotquot fue-  
runt, ex brutis animantibus tantum ea-  
dem eruere consti sunt; parum solliciti  
de Cadaveribus humanis, in quibus ta-  
men, quanto inven'ionis major est neces-  
sitas, tanto etiam ea detegendi major est  
difficultas.

Non

## P R Æ F A T I O.

*Non desuit tamen Cl. Bartholinus labore improbo eadem prosequi ; sed opus arduum esse hisce conqueritur verbis ( cap. 2. Hist. Vas. Lymph. ) Quum publicè privatimque complura hominum cadavera , anatomico cultro dividerem , quamquam anxia de Vasis Lymphaticis cura volveretur , non potui tamen , nescio quo oculorum fascino , ulla accuratiùs distinguere Tandem fibrillas aliquot notavit , ab hepate productas : nec non vas unum aut alterum lymphaticum circa ramum mesentericum & splenicum , non sine animi sui lætitia , observavit. Verùm Lymphaticorum Historiam hætenus distinctè non fuisse propositam , sequentibus indicat. Quid plura ? nobis in præsentì ad amici curiosi requiem satis visum , orbi Literato significare , eadem Vasa Lymphatica in humano circulo & claudi & detegi posse. Alii , quibus aut pinguis otium , aut majus frequentiusque cum natura commercium , nostris in homine inventis , ultimam imponant manum , nulli laudem auctam invidemus , nullos ex gaudii hujus possessione*  
ex-

## P R Æ F A T I O.

excludemus, sit palma in medio relictâ, modò nobis prima inventi gratia, ex merito, ut confidimus, relinquatur.

*Nobis tamen, (quod absque arrogantia dictum velim) adeo felices esse contigit; ut non tantùm in vivisectionibus brutorum animantium, eorumque cadaveribus, sed & in omnibus ferè, quotquot nobis offeruntur, cadaveribus humanis, eadem sine notabili detegere valeamus difficultate.*

*Rei hujus veritas ex sequentibus pagellis constabit; quæ, præmissâ Adenographiâ Novâ, Vasorumque Lymphaticorum Ortu atque Structura; Uteri Ovaria, Arteriæ Magnæ & venæ Cavæ portiones, nec non Vasa, Emulgentia vulgo dicta, unâ cum Renibus repræsentabunt, ex Subjècto Humano extracta. Quas partes, Lymphographiæ nostræ constituentes partem, simul exhibere necessarium judicavi, quòd propter mutuum Vasorum Lymphaticorum contactum, talis sit consensus atque connexio, ut fabrica eorum separatim pertractari ferè nequeat.*

*Uteri*



## P R Æ F A T I O.

*Uteri autem , partiumque annexarum faciem posticam exhibere placuit ; ut Vasorum Lymphaticorum Ortus & Progressus , quod aliàs fieri vix potest , clariùs conspiciatur. Quomodo autem viscera dicta suis exornentur Vascularibus Lymphaticis , ex circumferentia ad Saccum Chyliferum , tanquam ad suum centrum sint tendentia , digito quasi notatum videbis.*

*Onus hocce , humeris fortè meis impar , & perscrutanti tædiosum molestumque , lubens tamen eâ suscepi spe ; ut animi quâdam alacritate , devoratis tot tædiis , & superatis tot laboribus , Reipublicæ Anatomicæ & Medicæ sim profuturus : ut hisce nostris inventis , morborum variorum facilius daretur investigatio , medicamentorumque , pro restituenda Sanitate , certior applicatio.*

*Lymphographiæ , quod offertur , specimen , ubi Lectori non ingratum percepero , ad alias transiturus sum partes , non minus quàm hæ , Lymphaticis Ductibus superbientes. Et ne quispiam dubitet partium hic oblatarum , aut in posterum offerendarum , fabricam talem revera existe-*

## P R Æ F A T I O.

*existere , illi structuram illarum , non uno modo præparatarum , in ædibus meis dabo conspiciendam.*

*Unicum, mi Lector, adhuc monendum habeo: me hoc in opusculo, ubi Anatomicum ago , singularem Latinitatis curam non adhibuisse. Materia enim ipsa , nec temporis angustia talia permisere. Nihil curo maledicorum quorundam mores , qui, ut linguam venenatam acuant , ea etiam carpunt , quæ non capiunt. Tu verò , Benevole Lector , pro solito tuo candore , judica ; si erratum alibi , & nonnulla , præ festinatione nimia , & absentiae culpâ , minus prudenter hinc inde occurrant inspersa ; Hominem me esse cogita ; Vale.*

IN  
ADENOGRAPHIAM  
CURIOSAM,  
ET  
UTERI FOEMINEI  
ANATOMEN NOVAM  
CLARISSIMI VIRI  
ANTONII NUCK,

*Medicinæ Anatomicae Professoris  
ordinarii in alma Academia  
Lugduno-Batava.*

**S**tate viri, Medica quibus Artis gloria cordi est,  
In tenebris vobis emicat alma dies.  
Nuccius ignotos Microcosmi detegit Orbes,  
Fluminaque & fontes, viraque prata notat:  
Glandiferas toto dispersas corpore syzvas,  
Et quo quaque modo, quodque revolvat opus;  
Pinea quas falso sibi dotes arroget arbor,  
Quæ Mentis vacua est, & ratione caret:  
Quas puri latices irrorent undique terras,  
Et quæ contineant interiore sinu:  
Fæmineos Uteri saltus, mirabile mundi,  
Et sacrum, ut Tempe Thessala, delictum,  
Pan-

*Pandit, & obscuros antiquis Patribus agros,  
Quorum ex fecundo flammula fonte micat,  
Qua valido incensas mentes rapit impete, & unde  
Progenies hominum continuata fluit:  
Hec blandam Venerem videntes inter Amores  
Luce in odorifero Myrteaserta tegunt.  
Inde mamillarum duo pulvinaria monstrat,  
Interius miris conglomerata modis:  
Harum non Prisco, nostro non hactenus aeo,  
Quam Natura dedit, fabrica nota fuit.  
Desine, Tiphii, tuos posthac memorare labores,  
Cum nova pars terrae, te praeunte, patet.  
Plurima adhuc restant, oculis incognita nostris,  
Quae nec longa dies, nec tua cura dedit.  
Nuccius aeternae subjectum nobile Mentis  
Rimatus, totum perspatiatur opus;  
Et nihil intactum manibusque oculisque relinquit,  
Vestigans minimas undique particulas.  
Quantum Mens agilis pigro sublimior Orbe est,  
Tantum anteit meritis noster Apollo tuis.*

D. LIEBERGHEN.

ADE-



# ADENOGRAPHIÆ

## CAPUT PRIMUM.

DE

*Glandulis in genere.*

**I**Nter tot admiranda,  
 machinam humanam  
 componentia, corpu-  
 scula occurrunt, variæ  
 magnitudinis, globosæ  
 ferè aut ovalis, & ut plurimum de-  
 pressæ figuræ, quæ Græcis Α'δένος,  
 Latinis *Glandulæ* vocantur, qua-  
 rum primitiva vox Glans videtur,  
 significans fruges quercinas, fagi-  
 nas & arboreas omnes, putamine  
 tam duriori, quàm tenuiori investi-  
 tas, has Anatomici hodierni vocant  
*Glandulas Conglobatas*.

Glan-  
 dulæ  
 quid  
 sint?

Occurrunt præterea & alia cor-  
 pora, planiformia magis, inæqua-  
 lia, figurâ irregularia, ex minoribus  
 glandulis conglomeratis firmiter  
 A inter

Earum  
 Diffe-  
 rentia.

inter se cohærentia , & communem membranâ tectâ , *Glandularum* , secundum *Conglomeratarum* nomine ordinari convenientia. De quibus infra.

Glandulis hisce , prout in variis Microcosmi partibus conspiciuntur , varia Rerum Anatomicarum cultores imposuere nomina ; alia quippe Pineales , quædam Pituitariæ , Maxillares , Amygdalæ , Parotides , Salivales , &c. vocatæ fuere quarum Historiam , rem licet arduam , sed maximè necessariam , eâ quâ potero brevitate , exponam non enim idem cum Clarissimo Lindano sentio , ubi inquit ; *Glandularum Historiam post Hippocratem meditari velle , tantundem esse ac Iliada post Homerum*. Qui enim ex Veterum scriptis , sive Arabes fuerint , sive Græci , Glandularum fabricam usumque eruere conantur , vehementer quidem , meo judicio , errant ; verum incognita hæcce Veteribus , aut nullius usus fuisse habita , expressis verbis Magnus Fernelius

Et stru-  
ctura  
Veteri-  
bus fuit  
incog-  
nita.

nelius profitetur ; qui postquam  
duum generum proposuerat Glandulas ,  
Densiores scilicet & Molliores ,  
statim concludit hisce verbis ;  
*Quas singulatim recensere , fastidiosum magis ,  
quam utile putavi ; sic neque figuram earum aut magnitudinem  
prosequi commodum est.*

Restitutionis suæ primordia , Qui primi glandulas examinare coeperint.  
glandulæ tam Conglobatæ , quam Conglomeratæ ,  
Clarissimis Viris , *Wirtzungo* pariter ac *Warthono* ,  
nec non acutissimo *Stenoni* , debent ;  
qui glandularum non tantum Figuram & Magnitudinem ,  
verum etiam vasorum egressum ingressumque demonstrarunt ;  
& glandularum ima quamvis non perlustraverint ,  
usumque verum ipsis ( loquor de Conglobatis ) non adscripserint ,  
non possumus tamen , quin eorum in perscrutando diligentiam maximopere extollamus.

Clarissimus *Malpighius* structuram Glandularum Conglobatarum  
curiosè quidem proposuit , sed , ut

pace tanti Viri hoc dicam , longè aliter earum fabrica nobis fuit oblata. Sive enim vasorum lymphaticorum introitum exitumve examinemus , sive glandulæ interiora perscrutemur , passim quædam occurrent , quæ Anatomicorum Filii nondum viderunt , aut saltem scriptis suis necdum communicârunt.

Glandularum totius corporis series,

Præterea in eo deficiunt , quotquot fuerunt Anatomici , quòd glandularum seriem , in machina humana , necessariò tamen servandam , nemo rectè tradiderit. *Warthonus* plurimas quidem proposuit , sed multas intactas reliquit , uti sequens Catalogus , præter jam cognitæ , etiam quæ nostræ inventionis sunt ( à supremo vertice ad infimum usque pedem ) notans varias , demonstratum dabit.



*Glandularum tam Conglobatarum  
quàm Conglomeratarum  
Catalogus.*

1. Glandula Pinealis.
2. Glandulæ Plexûs Choroidæi.
3. Glandulæ cerebri substantiam  
Corticalem constituentes.
4. Glandula Pituitaria.
5. Glandosa membrana Canthi ma-  
joris & oculo externè ad-  
sita.
6. Glandula Innominata.
7. Glandulæ Aurium sive meatûs  
auditorii.
8. Glandula Subpalpebralis.
9. Glandula Parotis.
10. Glandulæ Labiales supernæ &  
internæ.
11. Glandulæ Maxillares internæ  
& externæ.
12. Glandulæ Amygdalæ dictæ,  
sive Tonsillæ.
13. Glandulæ Hypoglottidis.
14. Glandulæ Uvulares.
15. Glandulæ Linguales.

# 6 ADENOGRAPHIA

16. Glandulæ Palatinæ.
17. Glandulæ Occipitales.
18. Glandulæ Cervicales.
19. Glandulæ Laryngis five Thyroidis.
20. Glandulæ Oesophagææ.
21. Glandulæ Supra-scapulares.
22. Glandulæ Sterni.
23. Glandula Thymus.
24. Glandulæ ad bifurcationem Venarum Subclaviarum locatæ.
25. Glandulæ Axillares.
26. Glandulæ Mammarum.
27. Glandulæ Submammillares.
28. Glandulæ Pulmonum.
29. Glandulæ Diaphragmatis.
30. Glandulæ Jecoris.
31. Glandula Cystica.
32. Glandulæ Venæ Portæ ad con-cava hepatis locatæ.
33. Glandulæ Lienis.
34. Glandula Pancreas.
35. Glandulæ Ventriculi supernæ & infernæ.
36. Glandulæ Renes Succenturiati dictæ.

37. Glandulæ Intestinorum.
38. Glandulæ Mesentericæ.
39. Glandulæ Mesocoli.
40. Glandulæ Lumbares.
41. Glandulæ Omentales.
42. Glandulæ Renum.
43. Glandulæ Iliacæ.
43. Glandulæ Sacræ.
45. Glandulæ Inguinales five Cru-  
rales.
46. Glandulæ Testium.
47. Glandulæ Prostatae.
48. Glandulæ Uteri.
49. Glandula Musculi Sartorii.
50. Glandulæ circa Flexuras Cu-  
biti & Genu.
51. Glandulæ Manuum.
52. Glandulæ Pedum.
53. Glandulæ Subcutaneæ.

Quum jam enumeratæ hæ glandulæ, figurâ suâ, & magnitudine multum discreparent, seculi hujus Anatomici eas in *Conglomeratas* & *Conglobatas* distinxerunt, nec defuerunt, qui novam formarunt divisionem, & Conglomeratis Con-

Nova  
glandu-  
larum  
divisio.

globatisque addiderunt *Conglutinatas* & *Congregatas*. Accuratiores verò eas dividunt in *Vesiculares* & *Vasculosas*, per hæc Conglomeratas & illas Conglobatas intelligendo. Verùm Conglobatas, de quibus speciatim mihi agendi erit animus, pro Vesicularibus non esse habendas, ex sequentibus fiet manifestum; ubi priùs, sed breviter, proposuero Glandularum quarundam Conglomeratarum fabricam.

## CAPUT SECUNDUM

### *De Glandulis Conglomeratis vulgò dictis.*

**G**landulæ, pro Conglomeratis vulgò habitæ, sunt eæ, quæ glandularum minorum congeriem componentes, communi involvuntur tunicâ, & singulæ earum vasculum emittunt excretorium, quæque iterum canalem componunt, per quem liquor fluit in notabilem ali-

Glandulæ  
Conglomeratæ  
quid  
sint?



aliquam cavitatem aut extra corpus. Quales sunt *Glandulæ Innominatæ*, *Parotides*, *Pancreas*, *Mammæ*, &c. quæ, & omnes ejus naturæ, nihil aliud sunt, quàm textura minutissimorum vasorum, ex tenuissimis arteriis conflatorum, sanguinem variis particulis gravidum, vehentium, in duo desinentium vascula, quarum alia venosa sunt, sanguinem admittentia venosum, alia excretoria, modò proposita.

Hæcce, ut magis manifesta red-  
dantur, experimentis aliquot erunt  
elucidanda: ablata membranâ, quâ  
quævis glandula Conglomerata ve-  
stitur, & immisso, tum per ductum  
excretorium, tum per dictarum  
glandularum arterias, liquore ali-  
quo, ope cujusvis syringæ; observa-  
mus, Glandulas Conglomeratas à se  
invicem recedere; vascula earum  
tenella, glandulas componentia, li-  
quore injecto repleti, turgida magis  
reddi, singulasque glandulas in al-  
tum elevari.

Experi-  
menta  
glandu-  
larum  
conglom-  
eratarum  
structu-  
ram  
determi-  
nentia.

Et speciatim  
mammarum  
mulierum.

Ut reliqua præteream , glandulæ Mammarum mulierum Conglomeratæ etiam pro exemplo esse possunt. Non quidem nostrum propositum est , mammarum mulierum hic proponere Anatomen , nec earum Magnitudinem , Figuram & Numerum , ut Anatomici solent , describere , neque etiam necessum judicavi Situm illarum proposuisse. Ubi enim mammæ sitæ , nemo nescit. Utinam , inquit Vir quidam Literatus , nescirent multi ! sanè non tam immaturi raperentur in militiam Veneris , quæ sicuti adolescentium corpora solvit , ita & celerrimè senescere & creberrimè ægrotare facit. Apage ergo tales , quæ istis corruptelarum illecebris in propatulo habitis adolescentulos illiciunt atque irretiunt. Rarò namque non ex illectu lectus.

Sed ad rem. Certò credimus , glandulas hæc Mammarum Conglomeratas , vasculorum minimorum esse compagem , ductusque earum

earum arteriosos , cum excretoriis , canaliculos componere continuos. Notum , glandulas jam propositas originem suam debere arteriis duplicibus , tam externis , ab arteriis axillaribus oriundis , per mammas infinitis ramificationibus disseminatis : quàm internis , à ramo subclavio natis , intra cavitatem thoracis porrectis ; quæ dum ad medietatem ipsius perveniunt , musculos inter unam & alteram costam perforant , & in mammis pluribus intorcionibus nodos Glandularum Conglomeratarum componunt. Eædem istæ arteriæ , quemadmodum & venæ , alias constituunt ramificationes , partim variis in locis ipsum Os sternum perforantes , & cum vasis oppositi lateris aliquot anastomoses componentes , uti ex aëre infuso constat : partim descendunt , & in musculis rectis , cum epigastricis ascendentibus , non rarò multiplici anastomosi uniuntur. Ex hisce jam arteriis illæ , quæ glando-

sam

sam mammarum substantiam sub-  
ingrediuntur, & glandularum ima  
constituunt, omnem ferè fugiunt  
oculorum aciem, nemoque illarum  
terminum facilè inventurus est;  
nisi tincturam quandam, paucis-  
simis inter Anatomicos cognitam,  
in vas injiciat arteriosum, cujus par-  
ticulæ eò usque propelli possunt,  
ut Vasorum Galactiferorum, sive  
Tubulorum Lactiferorum, subeant  
canaliculos, ad oculum conspicuos.

Ut itaque totum hocce nego-  
tium felici cum successu absolve-  
rem, aliud experimentum, non mi-  
nus jucundum, quàm utile institue-  
re placuit. Papillam videns, variis  
foraminibus, totidem ductibus ex-  
cretoriis perviam, eandem cum an-  
nexa mamma omnem liquorem la-  
cteum comprimendo expuli, ex iis-  
demque unum ex magis patentibus  
mihi selegi, in quem Mercuri-  
um nostrum, eâ quâ potui dexteritate,  
injeci; & statim, jucundo planè  
spectaculo, observavi, non tantum

Du-  
ctum  
gala-  
ctife-  
rorum  
consti-  
tutio.

Ductus



Ductus Galactoferos sive lacteos, ramorum arborum in modum expansos, distinctè repleti, sed unum atque alterum ex hisce ductibus minoribus, eò usque Mercurium nostrum admisisse, ut in vascula arteriosa, dictis lacteis continua, transferit.

Idem hocce experimentum satis comprobat, Ductus hosce Lactiferos valvulis esse destitutos, meraque figmenta esse eorum, qui credunt eosdem variis in locis valvulis donatos esse, sic enim liquorem Mercuriumque injectum facile excluderent, cùm ferè semper liber ipsis concedatur transitus. Hoc verò observavi peculiare, vasculorum dictorum quædam, variis in locis angustata & arctiora, liquori injecto quodammodo obstare; quod tamen à valvulis non dependet, sed substantiæ mammarum adiposæ duriusculæ, quâ Tubuli Galactoferi nimium aliquando comprimuntur, adscribendum. Imo in tantum, ut  
secre-

secretum lac , si crassiusculum , ob vias angustatas, diutius sæpe in ipsis ductibus hærens , longiore morâ vitium capiat , mammaeque variis modis malè afficiat.

Quum nemo Anatomicorum, Tubulorum Lactiferorum veram dederit descriptionem , aut delineationem, non ingratum nos facturos speramus , si multiplici experientiâ observata hîc communicemus. Statim ac , dum ex quavis glandula vasculum excretorium egreditur, tria, quatuor vel quinque coëuntia componunt truncum minorem; ex totidem glandulis lateralibus , & quidem diversis in locis similes canaliculi exeunt, qui simul juncti, tandem vas constituunt excretorium, notabilis magnitudinis , haud absimile ductui pancreatico , non quidem ita longè extensum , sed amplum satis: ubi accedit ad papillam, quam antequam subingrediatur, iterum angustatur, & ubi per eandem cursum suum absolvit, adeo angustatur.

angustum redditur , ut vix minoris formæ fetam admittat. Quodque summopere necessarium erat , ne lac , in ipsis glandulis secretum , & vase excretorio exceptum , involuntariè continuò exiret , sed propter loci hujus angustiam tam diu aservari posset , donec ab infante , ubera materna premente , facili negotio egeratur. Ductûs lacte repleti delineationem vide *Figur. 1.*

Demonstratis primis ductuum excretoriorum , sed minorum , unâ cum vase excretorio majori , principiis , haud difficilè conceptu erit , præter delineatum , quamlibet mammam , septem , octo , novem (nam certus numerus non occurrit) similes habere ductus excretorios , tantam lactis vehentes copiam , ut sufficiens , etiam gemellis , præbeant alimentum. Qualis horum Ductuum sit series ; *Figura 11.* demonstrabit : quæ non quidem omnes delineatos proponit , sed tantum eorum tres , in tertia mammæ parte  
(de

(de reliquis idem esto judicium)  
distinctè delineat.

In quibus præterea venit observandum , Ductus hosce , antequam papillam attingant , anastomosibus inter se junctos esse , ut lac in mammis secretum , & in tubulis hærens (obstructo fortè poro papillari uno aut altero ) per vias laterales in alios papillæ Ductus , & adhuc patentes , transire & excerni posset.

Spiri-  
tuum  
neces-  
sitas in  
lactis  
secre-  
tione,

Ductus autem hi Lactiferi soli non sufficiunt ad lac secernendum , sed simul necessarium fuit , per nervos numerosissimos , ex nervis thoracicis oriundos , copiam spirituum affluere , lactis secretionem promoventium. Constat enim , obstructis compressive nervis , humorum secretionem , aliis in partibus , aut lentè procedere , aut planè cessare. Idem etiam hîc locum habere necesse erit , ubi enim eadem causa idem effectus esse potest. Spiritibus hisce ductuum poruli redduntur patentiores , lactis copiosior & cele



celerior secretio promovetur , ejus acrimonia , si fortè adfuerit , iisdem temperatur , & cum lacte misti , gratum ipsi conciliant saporem. Quod reliquum erat spirituum ( copiosissimi enim affluunt ) partim in venosa , partim in vasa redit lymphatica : sive enim spiritus immediatè sanguini venoso , sive primo humori lymphatico admisceantur , res eòdem ferè recidit , namque ipsa vasa lymphatica , variis in corporis partibus , lympham suam in vasa venosa eructant.

Non deerant hîc Antagonistæ , credentes , Ductus hosce Lactiferos , à sanguine & spiritibus , tantam lactis copiam accipere non posse , quin simul alii ductus in consensum trahendi , aliunde venientes , hosque deducunt , vel à ventriculo , vel à ductu thoracico. Duo sunt , ut reliqua minoris momenti præteream , quæ pro ventriculo militare videntur. *Primò* dicunt , purgantium vim statim ad mammas , post aliquot horas ,

Lac se-  
cerni-  
tur à  
sanguine  
Chylo  
gravidò.

B      rapi.

rapi. *Secundò* ; si de tinctura croci fumat nutrix , intra semi-horæ spatium lac è mammis fundi , odorem , saporem & colorem croceum referens. Verùm hæc , nostro iudicio nihil planè probant ; neque si aliorum mentorum partes mobiliiores & volatiliores , in ipso ventriculo , facilè à reliquis sequestrantur , & per vias ordinarias in sanguinem delatæ , per insensibilem transpirationem partim exeunt , odoremque assumptorum quodammodo spirant. Quid quæso , obstaret , cur non & medicamentorum particulæ volatiliores , eodem modo , imò celeriori cursu moverentur , & odorem , saporemque lacti imprimerent ? Colorem verò proprium ordinariò deponunt , & si aliqualis observatur quemadmodum illud haud impossibile , ut rarum contingens erit habendum. Si cui præterea subitaneum medicamentorum motum transitumque eorum in massam sanguineam , examinare volupe fuerit ,  
atten-

attendat modò , quid Balnea , tam humida , quàm sicca , Fomentationes , Cataplasmata , quid Epicarpia , Illitiones mercuriales , quid Apophlegmatizantia , & quæ hujus naturæ alia sunt , valeant.

Neque etiam majori cum fundamento , ex ipso Ductu Thoracico , quamvis via illa foret brevissima , immediatè lac eliciunt. Nemo enim unquam ejusmodi ductus demonstravit , quorum tamen inventio admodum facilis esse deberet. A simili hîc argumentari liceat : si tenelli vasorum lacteorum ductus , per mesenterium dispersi , chylumque ducentes admodum mobilem & volatilem , facili negotio inveniantur ; quid , quæso , obstaret , cur viæ tales , tantam lactis copiam , & crassiusculam adhuc vehentes , conspectui sese non darent ? Verùm nullo experimento , dexterrimè licet instituto , hoc unquam detectum. Imò Mercurius noster , qui aliàs in ejusmodi rarò fallere solet , injectâ

Ductus  
Thora-  
cicus ,  
an cum  
mam-  
mis ha-  
beat  
com-  
mer-  
cium ?

priùs convenienti loco & tempor  
ligaturâ , vias hæc , quas obscura  
vocant & cæcas , invenire non po  
tuit. Vidi quidem sæpiùs , vascu  
quædam Ductui Thoracico latera  
liter inserta , particulas quasdam  
Mercurii nostri admittentia ; verùm  
illa non Lactea , sed Lymphatic  
erant , uti renitentes Valvulæ , par  
tesque glandosæ , à quibus illo  
rum origo , ad oculum monstra  
bant.

Ex hætenus allatis haud diffici  
lè concludimus , lac ab ipso san  
guine separari , copiosissimisqu  
spiritibus irrorari. Ipsam verò se  
cretionem eo in loco fieri , ubi arte  
riarum extrema , Glandulas Mam  
marum subeuntia , Ductuum Gala  
ctoferorum principia constituunt  
tantumque admittunt partes la  
cteas à sanguine sequestrandas  
Hæc autem contingunt , ubi omni  
rectè disposita , sanguis legitimè m  
stus , & tenella ista Ductuum Vascu  
la , nec aperta minùs , nec constrict  
nimi



nimis. Aliàs enim Lactis loco, lymphæ, serum, aqua falsa, aut alii vitiosi humores egrediuntur: vel motus sanguinis, si concitator fuerit, vel Papillarum ab infante pressio vehementior, sanguinem per Mammillas effluxisse, & in aliis, fluxûs menstrui tempore, menstrua per easdem vias evacuata fuisse, observatum.

Si intemperies adfuerit sanguinis acida, faciliè Mammæ, à Lacte coagulato, Tubulos Lacteos obstruente eosque distendente, intumescunt; quodque acidum tractu temporis corrosivum redditum, non rarò tumores cancriferos, ulceraque Mammarum depascentia producit. Si verò prævaleant particulæ terrestres, tumores generantur, quos scirrhus vocant. Quid autem aër ad hæc valeat frigidus humidusque, victus itidem acidus austerusve, vitæ intemperantia ingluviesque, otium, vita sedentaria & melancholia, Præctici passim observant.

Sanguinis vitiosa constitutio afficit mamas.

## CAPUT TERTIUM.

*De Mammarum Papillis*

Papil-  
larum  
Anato-  
me no-  
va.

**O**ccasione Mammarum, incidit & illam Mammæ partem, quam *Papillam* vocant, oculo anatomico hætenus nondum benè fuisse perlustratam, ideoque perquam necessarium fore, eandem paulo accuratius examinare, texturamque ejus inspicere. Longè enim inter hæc differt Mammarum Papillarumque structura. Mammarum jam exposuimus, Papillarum verò exponendam habemus.

Illarum  
fabrica  
exte-  
rior.

Præter vasa sanguinea & nervosa, ab iisdem ramificationibus, quibus mammæ exornantur, oriunda & tegumenta, communia vulgo dicta, cutim, in antica Papillæ parte, variis foraminibus pervia notamus, cujus pori patentiores constituunt extrema ora Tubulorum Lacteorum. Osculorum horum numerus incertus plerumque occurrit, modò enim quinque, sex, septem

septemve , in aliis iterum novem , decem , undecimve numerantur , eaque iterum eundem in exitu ordinem non observant ; aliquando enim hæc ostiola circulum componunt minorem , in ambitu suo , sex septemve ostiolis pertusum , nullumque foramen , præter dicta , in ejus centro conspicitur. Subindè circulus occurrit major , sed figuræ ovalis , similiter , ut prior , sed decem undecimve ostiis pervius. Non rarò ostium majus in centro conspicitur , minoraque alia in circumferentia videntur. Uti *Figuræ* III. IV. & v. demonstrabunt.

Interior Papillarum substantia, Papillarum substantia interior. non vasculosa est , qualis Mammillarum , jam proposita ; neque etiam vesicularis , uti aliqui fortè crederent ; sed fibrosa , cum structura Glandularum Conglobatarum , inferiùs recensenda , ferè conveniens. Hocce ut exactiùs examinarem , expresso priùs omni sanguine lacteque , hinc illinc in ipsis tubulis hæ-

rente, Papillam flatu turgidam reddidi, inflatamque aëri libero tam diu exposui, ut siccatam oculo, non ita quidem nude, sed speciatim microscopio armato, ad lubitum examinare licuerit. Mox duplex fibrarum series mihi oblata, altera ex fibris majoribus retiformibus composita, altera itidem fibrosa, sed delicatissima, exiguis admodum, & variæ formæ foraminibus pervia, ubique fibris majoribus firmissimè annexa. Harum structuram, ob regularem, quem fibræ minores observabant, ordinem, planè stupendam reperi, nec memini, me unquam in aliqua microcosmi parte similes detexisse. Fibras autem tam majores, quàm minores, undiquaque Papillarum integumento firmiter annexas vidi, & si alibi dictarum Fibrarum origo quærenda, nullibi rectiùs, quàm ab hoc involucro deducenda foret. Texturam hanc fibrosam notabunt *Fig. VI. VII. & VIII.*

Dete-



Detectâ itaque hoc modo fibrosâ Unde  
 Papillarum substantiâ, facilè conci- flacce-  
 pimus, unde flaccescant eædem, & scant  
 ex contactu puerorumve suctione & ite-  
 iterum erigantur. Præter enim co- rum e-  
 piam spirituum, continuo affluen- rigan-  
 tium, ut ex exquisito illo sensu tur Pa-  
 apparet, Arteriolæ Papillares (dum pillæ in  
 suctio peragitur) sanguinem, per Lactan-  
 modum extravasationis, copiosius tibus?  
 evomunt, & fibrarum interstitia di-  
 stendendo in tantum replent, ut  
 Papillæ, duplo triplove naturali  
 majores appareant; ad quod non  
 parum facit, continua frequensque  
 Papillarum humectatio, quâ, ope  
 salivæ infantis irrorantur, hinc fi-  
 bræ partes cutaneas constituentes,  
 relaxantur, & relaxatæ faciliùs ce-  
 dunt. Tumidæ manent, quamdiu  
 venarum ostia, à sanguine inter fi-  
 bras hæce hærente, notabiliter pre-  
 muntur, verùm suctione cessante,  
 & in ablactatione spiritus parciùs  
 influentes, venarum apertionem,  
 ostiolorumque refectionem, pro-

pter minorem renitentiam , cauſare debent, hinc ſanguis ille, venas hæſce ſubiens , Papillam iterum detumefcere facit. Colorque intenſè rubicundus , ob minorem ſanguinis preſſionem , pallidiuſculus redditur.

Papillarum  
mala,  
unde.

Sanguis hicce , diutius in Papillis hærens , acrimoniam concipit, poroſque cutaneos perfringens, ejus particulæ acriores impetum faciunt in partes cutaneas, eaſque fiſſuris dolorificis deformes reddunt, hocque incommodum faciliùs introducitur, ſi ipſum lac fuerit acidius , lactantiſque infantis ſanguis intemperie laboret ſalinâ, aut acidâ. Cujus ſaliva vitiata ſeſe inſinuans in poros , partes cutaneas profundius diſjungit , malumque notabiliter augetur ; ſi denudatas mammæ aër ambiat frigidior acriorve, cujus injuriis particulæ aëreæ altiùs penetrantes , moleſtiſſimam matri inducunt ſenſationem.

D E G L A N D U L I S ,  
C O N G L O B A T I S  
V U L G O D I C T I S .

C A P U T P R I M U M .

*De Glandularum Membranis.*

**A**d Glandularum Anatomem, Membrana-  
necessaria erat Membrana-  
rum, rum, Glandulas  
Glandulæ substantiam Con-  
ambientium, cognitio, quæ Gland-  
ulæ aliquam conciliaret firmitu-  
dinem, earumque substantiam, intra globa-  
certos quosdam terminos, coerce-  
ret. tas am-  
rien-  
tium,  
inspe-  
ctio A-  
nato-  
mica,

Membranæ tales duplices nobis  
occurrunt, altera exterior, interior  
altera. Exterior tenuior, totam in-  
cludens Glandulam, in plerisque  
subjectæ membranæ firmiter adeo  
adhæret, ut sæpe, non sine dilacera-  
tione, à subjacente Membrana possit  
separari, in aliis verò laxior ejus est  
adhæsiō, & separatio facilior. Fibris  
potissi-

potissimum constat circularibus , principio & fine carentibus , excepto vasorum circa ingressum , quo fibrarum illa series turbari solet. Vasa habet quadruplicia , duo adducentia , - & totidem abducentia , de quibus infra , ubi de Glandulæ interiori substantia , cui hæc vasa etiam competunt.

Unde autem Membrana hæc originem trahat , difficillimè explicatur ; an ab expansa peritonæi portione , ut aliqui fortè crederent , mihi verisimile non videretur , quia in variis corporis nostri partibus , Glandulæ conspicuæ , in quibus tamen peritonæum ( quod solummodo viscera abdominis includit ) non occurrit. Imò in ipsis artubus Glandulæ occurrentes , simili teguntur Membranâ , quali eas tectas invenimus in abdomine. Probabile magis videtur , Membranam hanc texturam esse vasculorum minimorum lateralium , tam egredientium quàm ingredientium.

Sepa-



Separatâ exteriori Membranâ, quod difficulter in nonnullis peragitur, occurrit altera crassior compactiorque, Glandulæ substantiam immediatè ambiens, vasis tam inferentibus, quàm efferentibus præprimis perforata. Cæteroquin adeo angusti ejus pori occurrunt, ut aër, vi licet per vasa infusus, per poros tamen Membranæ ordinariò non exeat, cui rei haud parum confert Membrana exterior, modò propofita. Variis donata est fibris, longitudinalibus, circularibus & obliquis, semet infinitis locis, sed ordine planè irregulari, tangentibus. Vasa itidem obtinet tam inferentia, quàm efferentia, ab iisdem ramificationibus, quibus exterior Membrana, oriunda.

Memoratæ hæ Membranæ, licet ordinariò albicantes, æquales & læves conspiciantur, non rarò tamen ab humoribus, intus stagnantibus, coagulatis & induratis, superficiem acquirunt tuberosam & inæ-

Membrana-  
rum  
varie-  
tas un-  
de?

inæqualem , gratusque aliàs Glandulæ color, faciem assumit , præ nimia flavedine , rubore aut nigredine , notabiliter deformem. Et speciatim Glandulæ Laryngis Pulmonumque, tali nigrore, in Tabacifugis tinguntur , uti multiplici experientiâ nobis constar.

## CAPUT SECUNDUM.

### *De Glandularum Textura interna.*

Glandularum structura interna, ut nova, designatur.

**N**e, dum nucleum quærimus, in cortice hæreamus, Glandularum interiora perlustrare juvabit. Diu, fateor, in illa fui opinione; Glandulas hæc nonnisi vasorum minimorum complicatorum esse acervum, regulari tamen modo ita dispositum, ut variæ ramificationes arteriolarum implicatarum, præter venas, tandem in duo, tria, vel plura abirent vascula pellucida, lymphatica vulgò dicta, eaque Glandularum quasi excretoria esse. Sed res longe

longè aliter nobis visa , idque occasione subjecti humani , ante biennium violentâ morte extincti , cujus Historiam paucis enarrabo.

Vir quidam , triginta circiter annorum , Baccho , sed potissimum Cerere, delectari solitus , post prandium cum quodam alio rixas movet, & verba statim in verbera mutat. Sed irritatus Antagonista, sclopeto , globulo plumbeo onusto, rixarum motoris , alterius lateris, abdominis musculum rectum ita trajicit , ut intestini ilei pars ilico per vulnus exiret , & extra abdomen pendula conspiceretur; sauciatus hoc modo graviter patiens , vitam cum morte eâdem horâ commutare fuit coactus.

Inspecto abdomine , vasa lactea, centum fortè in locis , chylo adhuc turgida ( quod rarissimum in subjecto humano videre contingit ) conspeximus , mesenteriique Glandulas , succo quodam tumentes, perlustravimus. Sciendi cupidi, quale

Glan-  
dula-  
rum  
mesen-  
terii  
examen  
novum.

quale inter lactea & Glandulas c-  
ctas esset commercium , vasculu  
aliquod , ab intestino exiens , plur  
mis valvulis intro foras spectant  
bus conspicuum , per tubulum a  
ligatum , nostrum injecimus Mercu-  
rium ; præter omnem expectatio-  
nem , jucundissimo tamen spectacu-  
lo , vidimus , ab injecto mercurio  
lacteum vas non tantum reple-  
sed Glandulam , in quam recta vi  
tendebat , aliam figuram & supe-  
ficiem aliam inde acquirere ; e-  
planiformi quippe in magis globu-  
sam , ex superficie æquali & lævi  
in asperam & plurimis tuberosis ca-  
pitulis rotundis donatam abire , d-  
quibus consule *Figur. ix.*

Hocce tanquam insoliti qui  
considerans , ludentem potius ad-  
miratus sum naturam , & injectio-  
nis vi , Glandulæ stamina fibrasque  
intermedias læsas fuisse , faciliù  
credidi , quàm ut revera cavernula  
quædam , quas meus formârat Mer-  
curius , intus in ipsa Glandula la-  
tita



titarent. Sed iterato experimento, in alia intestini mesenteriique parte, eundem videns successum & fabricam eandem; aliis etiam in subjectis, Glandularum mesenterii fabricam, altiori examine perlustrandam necessarium duxi.

Hinc Equina, Bovina, Canina & varia ejus naturæ alia, Theatri nostri fuere subjecta, atque ubivis Mercurius noster eundem in currendo observavit ordinem, & viam eandem; Glandulæque passim, uti de subjecto humano dictum, figuram mutabant & superficiem. A quo tempore certissimis ratiociniis conclusi, Glandulas mesenterii non constituere vasorum complicatorum nexum, sed substantiam earum potius fibrosam esse muscosamque.

Inde à simili argumentari ita cœpi; si Glandulæ mesenterii globosæ ex substantia fibrosa muscosaque conflatae sunt; quid ni & aliarum partium Glandulæ, non quidem chylo, sed succo lymphatico irrorari soli-

Glandularum Conglomeratarum examen in brutis institutum.

Ex diversis corporis partibus Glandulæ examinatae.

C

tæ,

tæ , eandem haberent fabricam  
Ideoque Mercurius noster in auxi-  
lium iterum venit ; qui Glandula  
quidem subintravit , sed , renitenti-  
bus haud parum valvulis , nuspiam  
tam perfectè & regulariter Glandu-  
larum texturam ob oculos posuit  
Ac proinde aliâ methodo parte  
hasce aggrediendas esse putavi ; vi-  
dens itaque , in nonnullis subjecti  
partibus , Glandulas quasdam duûm  
generum habere vasa lymphatica  
alia scilicet egredientia , alia ingre-  
dientia ; hasce potissimùm eligen-  
das esse succurrit , quòd valvularum  
structura hîc nullo modo obesse  
posset. Et qui in promptu erat Mer-  
curius , celeri cursu iter suum ab-  
solvit , Glandularumque illarum ca-  
vernulas & cavitates ita replet , ut  
vix locus superesset , qui Mercuri  
nostri partem non admitteret , &  
præcisè cum Mesenterii Glandulis  
non conveniret , licet quoad for-  
mam externam ( quemadmodum  
omnes Glandulæ solent ) quodam-  
modo

modo differre viderentur. Uti *Figuræ* X. XI. XII. notabunt.

Non tamen in hisce acquiescendum, sed alio experimentandi modo Glandularum structura perscrutanda erat. Ideoque expulso & expresso omni Glandulæ liquore, vasque lymphatico ex Glandula prodeunti ligatura injecta, per oppositi lateris vas lymphaticum, Glandulam subintrans, flatum immisi, & ligato etiam hoc vase, Glandulam flatu distentam reddidi, aëri calidiori expositam siccavi, siccataque inspexi; animo examinandi, utrum talis inde exurgeret fabrica, qualis Mercurio præparata Glandula fuit visa.

Re itaque propiùs inspectâ, & quatenus oculo nudo examinari potuit, hanc illarum fabricam inveni. Præter membranam ambientem, statim fibrosam earum detexturam, diversas fibrillarum, inter se cohærentium, formantem species & formas. Exteriores, im-

Aliud  
Glandulas  
examinandi  
experimentum.

mediate sub tunica investiente locatæ (cui & firmiter fibræ annectebantur) tot extremitatibus; quæ totidem capitulis, eandem membranam regulari ordine tangebant, ut spatia intermedia, succo lymphatico ordinariò repleta, inæqualem redderent tunicam, plurimis hemisphæriis tuberosam. Quæ immediate subsequiebantur fibræ, Glandulæ interiora respicientes, vario componebant angulos, aliæ enim hexagonæ, aliæ pentagonæ, alia aliûs formæ, prout cum reliqua textura fibrosa maximè convenirent. Reliquæ fibræ, ad centrum usque, diversas series non componebant, sed eundem irregularem servabant ordinem, aliæ enim erant majores, aliæ minores, nonnullæ longiores, quædam breviores, ubi vis tamen firmissimè inter se coherentes, muscumque arboreum ferè repræsentantes. Ita ut Glandula (aliàs Conglomeratæ dictæ) non malè *Vasculosæ*, & *Conglobatæ*

Mu



*Muscosæ* vocari possent. Muscosarum delineationem vide *Fig. xiii.*

An verò singulæ fibræ, muscosam Glandulæ substantiam componentes, cavæ sint, interdum dubitavi; verùm post exactum examen institutum, nunquam potui detegere, fibras hasce canaliculis esse pervias; sed omnes, quotquot aderant (exceptis vasis sanguineis) cavitatibus esse destitutas. Imò oculus, microscopio licet armatus, nullo modo easdem invenire potuit, quamquam vitri ope, implicata hæc fibrarum textura, distinctè aliquin fuerit proposita, uti *Fig. xiv.* indicabit.

Sed notandum hoc loco venit, Glandularum hanc compagem, non ubivis eodem modo sese habere, verùm in nonnullis laxiorem, in aliis strictiorem observari; prout majori minorive lymphæ copiâ Glandulæ fuerint distentæ. Colore insuper multum Glandulæ variare solent; quædam enim grysei

Qualis  
fibrosa  
sit Glandularum  
structura?

Texturæ  
fibrosæ  
diversa  
constitutio.

(uti ordinariò) aliæ flavescentis nonnullæ nigricantis, nec deficiunt quæ coloris apparent. variegati quæque colorum diversitas à vari humoris, naturalis vel vitiosi, constitutione, diversimodè Glandula hæc tingente, unicè dependet.

Glandularum  
Conglobatarum  
morbi.

Eædem hæ Glandulæ liquor quidem naturaliter turgent diaphano limpidoque, sed non rarò in succum viscosum eundem mutatum vidimus, Glandularumque interstitia materiâ tartareâ fabulosâque repleta & obstructa conspeximus. Totidem aliquando extraximus arenulas, quot cavernulæ inter fibrillas occurrerent notabiles, & subinde totam calculosam vidimus Glandulam, dum succi vitiosi copiosiore affluxu arenularum latera continuâ pressione propiùs ad se accedentes, unum quasi corpus formare incipiunt. Harum præterea superficiem inæqualem asperamque semper observavi, Glandularum peripheriam tuberosam ad unguem æmu-

æmulantem: malum autem hoc frequentius invadit Glandulas œsophageas, nec non ad asperæ arteriæ bifurcationem locatas, quibus difficilis non rarò inducitur respiratio; uti notabili etiam Historiâ confirmat *Clariff. Kerckringius Spicileg. pag. m. 64.* & quas nos, nuperrimè adhuc, ex subjecto humano extraximus Glandulas calculosas *Fig. xv. xvi. & xvii.* indicabunt. In brutis autem animantibus, tali modo malè affectas Glandulas, observare necdum licuit.

## CAPUT TERTIUM.

### *De Glandularum Conglobatarum Vasis.*

**P**ræter huc usque detectas fibras, <sup>Quæ-  
nam  
vasa  
Glandu-  
læ habe-  
ant?</sup> varias adhuc vidi alias, ab una ad oppositam Glandulæ partem exporrectas, quarum nonnullæ rectilineæ ferè, aliæ ab eadem deflectentes, angulos componebant obli-  
C 4 quos.

quos. Incertus conjicio fibras d  
ctas, vasa esse aut sanguinea au  
nervosa. Sed quia sæpius jam ob  
servâram, quamvis Glandulam a  
minimum simplicem, frequente  
duplicem, & non rarò triplicem  
quadruplicemve, accipere ramifica  
tionem arteriosam, à vicinis arte  
riis oriundam; ex iisdem unam mi  
hi selegi, Mercurio nostro replen  
dam, quique etiam facilem statim  
inveniens viam, arteriolam hanc  
variis ramificationibus per Gland  
ulæ texturam conspicuam argen  
teamve reddidit; neque etiam so  
ciæ defuerunt venæ, in totidem  
furculos minores scissæ; quorum  
tamen vasorum sanguineorum nu  
merum superant nervuli numero  
sissimi, latera dictorum vasorum  
associantes. Quales autem arterio  
larum sint divaricationes, Glandu  
læ interiora perreptantes, ex *Fi  
gura* XVIII. colligi potest.

Sed aliud vasorum genus, quo  
quævis Glandula Conglobata su  
per-



perbit, *Lymphaticum* intelligo, examini erat subjiendum. Pro recepta penè habetur Anatomicorum opinionone; Vasa Lymphatica ductus esse admodum tenues, pellucidos, simplici tunicâ donatos, & plurimis nodulis, qui totidem valvulæ sunt, conspicuos. Verùm non ubivis tali modo constituta sunt illa vasa, neque eadem omnium est subtilitas: quò enim Lymphatica sunt majora, eò tunicæ eorum sunt constanteriores; quoque propius accedunt ad Saccum Chyliferum, Ductum Thoracicum, vel venam subclaviam axillaremve, eò plus roboris eorum membranæ habent.

Membrana, Vasculum Lymphaticum componens, externo oculo examinata, pellucida est & tenuis, nihilque peculiare (quoad structuram) ob partium tenuitatem sensibus externis offert. Verùm microscopio examinata, texturam præbet infinitorum globulorum, majorum minorumque, contactu

mutuo inter se cohærentium; quorum nonnulli ductulos aliquot, sed irregulares, arearum in modum, componere videbantur, variis anastomosibus inter se junctos; hi autem tractus, an vascula fuerint, nec ne, pro certo affirmare non ausim. De quibus vide *Fig. XIX.*

Ductus  
Thora-  
cicus  
ope  
Micro-  
scopii  
exami-  
natur.

Oculo eodem modo armato, & Ductûs Thoracici Membranam examinavi, quam ejusdem ferè naturæ cum præcedente reperi, exceptò, quòd illius globuli paulò majores, racematim pluribus in locis inter se cohærentes, distinctiùs apparuerint. Et aspectus fuit gratior, ubi Membranam hanc, in duplicem tunicam aut laminam divisam, summâ diligentia inspicerem. Exterior enim manifestissimè corpusculorum, tam orbicularium, quàm ovalium, racematim hinc inde connexorum, præbebat texturam. Interior verò, ejusdem ferè fabricæ, eadem, sed minora & obscuriora magis offerebat. Unam & alte-

alteram *Figura* xx. & xxi. delineatam offert.

Quum itaque vasorum Lymphaticorum, Lacteorumque structura sit eadem, commodissimè hoc tempore inquirere potui, utrum loco intermedio, inter Membranam scilicet unam &, alteram modò propositam, Muscus ille occurrat, quem *Nobilissimus Bilsius* se ibidem invenisse gloriatur. Verum nuspiam mihi tale quid oblatum; sed membranas arctè adeo inter se unitas fuisse observavi, ut nec Musco, nec simili quid ibidem daretur locus. Hinc pro certo concludere auderem, talem Muscum in rerum natura non dari, sed planè imaginarium esse.

Valvulas Vasa Lymphatica ob-  
 tinent Semilunares, & in quovis loco, ubi valvulæ conspiciuntur, numerum non excedentia binarium; triplicatas enim & quintuplicatas, quales in venis non rarò conspiciuntur, hætenus notare non licuit.

Ne-

An Bilsii Muscus inter Lymphaticorum tunicas invenitur?

Quales sint Lymphaticorum Valvulæ?

Neque etiam necessarium esse judicarem ; quia angustiora hæc & tenuiora vascula duplici Valvulâ haud difficilè clauduntur.

Valvularum harum substantia, nudo oculo inspecta, cum vasis lymphaticis, ejusdem naturæ videtur, verum microscopio examinata, notabilem præbet differentiam. In tenuissima enim valvulæ Membrana fibræ innumeræ conspiciuntur, ab una in oppositam partem exporrectæ, quæ quasi totidem furculos & fibras motrices repræsentare videntur, ut iisdem contrahi & relaxari hæc valvulæ possent. Corpuscula insuper orbicularia, hinc inde fibris dictis annexa notavimus, uti *Fig. xxii. & xxiii.* indicat.

Valvulæ quid agant ?

Dilatationi pariter ac constrictioni destinatas esse Valvulas, haud obscurè conjicere licuit, ex Valvula Ductûs Thoracici nuper inspecta ; hæc enim, præter fibras modò propositas, in extrema valvulæ ora, aliûs naturæ fibrillas obtine-



tenebat , partim cruciariâ figurâ in sese incumbentes , partim secundum longitudinem extensas , & vicinis valvulæ partibus annexas. Hæ , quasi totidem exigui muscoli (eodem ferè modo , quo fibræ valvularum tricuspidum & mitralium) majori vi ductûs thoracici viam potuere dilatare , & angustare , idque propter usus summè necessarios. Valvulæ hujus ductûs thoracici delineatio offertur *Figurâ* xxiv. & xxv.

Quæritur hîc ; *Utrum Vasa Lymphatica Glandularum Conglobatarum sint Excretoria.* Rei hujus difficultatem *Clarissimus Malpighius* Vasa Lymphatica an Glandularum sint excretoria? indicat , in nuper edito de Glandulis tractatu ; dum inquit : *An præter exposita sanguinea vasa & nervos , aliud vasorum genus , à glandulis promatur , quod vicem excretorii vasis habeat , indagandum venit.* Ut autem in re tam difficili , in qua nec cultri opus , nec separatio haberi potest , ob substantiæ friabilitatem ,

tem , & partium exiguitatem , faciliùs incedamus , datis quibusdam sensatis observationibus conjecturando procedemus.

Quid tamen nos hac in re præstiterimus , enarrabimus lubenter. Videns Glandulas Mesenterii , lactea obtinere & inferentia & efferentia , & pari modo aliarum partium Glandulas lymphatica habere & adducentia & abducentia , cogitavi , lymphatica illa Glandularum excretoria esse non posse , quòd aliunde originem ducant , & Glandulæ dictis lymphaticis nonnisi transitum concedant , uti ex *Fig. xxvi.* patebit.

Lym-  
phæ  
transi-  
tus per  
Glan-  
dulas  
eum ne-  
cessa-  
rius?

Non tamen frustraneus censendus est lymphæ , per Glandulas hæscæ , transitus ; sed credendum potiùs , lympham eò , duplici modo , subtiliorem reddi. *Primò* ; quatenus particulæ ejus , arctiùs adhuc unitæ , in muscosa illa Glandularum substantia disuniantur , & in plures particulas minores abeant. *Secundò* ; à

dò; à spiritibus, copiosius per nervos in Glandulas affluentibus, sanguini reaffundendis. Frequentes autem hîc accedere spiritus, vel ex eo manifestum, quòd numerosos insertos videamus nervos, imò multò plures, quàm qui Glandularum sensui inserviunt. Idem etiam patet, in subjecti vivi vase lymphatico læso, lymphamque stillante, notabiliter inde emaciari corpora, ut taceam, quid periculi subsit, si, in Paracentehesi instituta, major extrahatur lymphæ copia, licet jam extravasata, quàm par est. Hæc autem lymphæ & spirituum miscela, adeo erat necessaria, ut hi sine lymphæ accessione (pro spirituum vehiculo inserviente) & illa sine spirituum adminiculo (motum lymphæ promovente) in sanguinem redire non possent.

Interim non diffiteor, Glandulas <sup>An</sup>propositas <sup>nun-</sup>vasorum lymphaticorum <sup>quam</sup>scaturigines esse non posse; <sup>Lym-</sup>etenim plus quàm semel observavi, <sup>phatica</sup>  
origi-  
nem ex.  
tam

Glandu-  
lis habe-  
ant?

tam arctum inter lymphatica & arterias esse connexum, ut inflatâ arteriolâ, simul lymphaticum Glandulæ alicujus flatu fuerit distentum, ejusque lymphæ sæpe sanguinea, & loturæ carnis instar tincta nobis sit visa.

Summopere tamen necessaria esse illam vasorum lymphaticorum in Glandulas insertionem, exinde concluderem; quòd vas lymphaticum furculos subinde emittat laterales, dum principalior ejus ramulus Glandi tantum incumbat, ramulorum exeuntes iterum excepturus: uti ex *Fig. xxvii.* videre est.

Verum ut eo rectius omnis lymphæ, Glandulam pertransitura, spiritibus irroretur, providus nostris Conditor ubivis ferè lymphaticam sub ingressum in plures abire ramificationes, & plurimis itidem exire ramulis voluit uti satis distinctè *Figura xxviii.* explicat.

Glandu-  
larum

Imò Glandularum utilitas tanta videtur, ut nullum Lymphaticum cur-



cursum suum absolvere possit, quin <sup>utilitas</sup> Glandulas in transitu salutare sem- <sup>singu-</sup> per necesse habeat, uti potissimum <sup>laris</sup> apparet illis in locis, ubi nusquam Glandulæ apparent, lymphatica tamen conspiciuntur; quæ per vias, Anatomicis nondum notatas, &, ut ita dicam, cæcas, Glandulam aliquam (quam tamen ut propriam non obtinent) quærant, eructentque in eandem, lympham, cum alia lymphæ aliunde prodeunte, commiscendam, & communi vase effe- rente, versus cisternam chyli, aliumve locum propellendam. Uti *Figurâ* XXIX. videre est.

Nonnunquam Glandulæ, ad <sup>vas</sup> concava hepatis, portæ, adsitæ, un- <sup>lym-</sup> dequaque, & anticè & posticè, plu- <sup>phati-</sup> rimis lymphaticorum ramificatio- <sup>cum</sup> nibus exornantur, Glandulasque <sup>notabi-</sup> ingressæ, tantam iisdem tradunt <sup>le ad</sup> lymphæ copiam, ut inde canali fa- <sup>hepa-</sup> tis amplo Glandula egrediatur, <sup>tis con-</sup> lymphamque suam in aliam Glandulam, sibi vicinam, eructet; quam <sup>cava.</sup>

D vis

vis hæc posterior Glandula , præter  
 vas hocce amplum , aliis adhuc ir-  
 roretur vasculis lymphaticis , aliun-  
 de lympham accipientibus : potif-  
 simum illud in subjecto bovino  
 conspicuum , ex quo glandularum  
 harum , lymphaticorumque natura-  
 lis magnitudo delineata exhibetur  
*Fig. xxx.*

Hiscæ ita positæ , certò constare  
 videtur , vasa lymphatica Glandu-  
 larum , ut vocant , Conglobatarum ,  
 excretoria non esse ; sed omnes  
 quotquot sunt ejusmodi Glandu-  
 læ , ab aliis partibus , aut vicinis  
 aut remotioribus , tanquam à pri-  
 mis fontibus , suos habere canali-  
 culos.

## CAPUT QUARTUM.

### *De prima Vasorum Lymphatico- rum Origine.*

Lym-  
 phati-  
 corum  
 Origo.

**Q**uifnam primus Vasorum Lym-  
 phaticorum sit exortus , nemo  
 hætenus detexit ; sed Anatomico-  
 rum

rum etiam dexterrimorum fatigavit animos ; idque non sine ratione : prima enim illorum principia adeò sunt subtilia , ut cultro non tantùm tractari nequeant , visumque penè fugiant ; verùm injectiones subtiliores ( cujuscunque etiam fuerint naturæ ) imò Mercurium nostrum , aëremque infusum , propter valvulas obstantes vix admittant.

Interim variè hîc sentiunt Anatomici. Quidam nervos constituunt Vasorum Lymphaticorum principia ; alii glandulas minores ; alii membranas ; nec deficiunt , qui à tendinosa musculorum parte eadem deducunt. Sed missis aliorum sententiis , dicam modò , varia me hanc circa speculationem molitum fuisse , variis experimentis ( irritò licet ordinariò conatu ) varia tentasse , casuque tandem nonnulla detexisse , quæ lucem hîc adferre possunt.

Anatomicorum  
sententiæ , de  
Origine  
Lymphaticorum.

Ante triennium mundando lie-  
ni Vitulino intentus , omnique  
D 2 fan-

Experimenta,  
quibus

dete-  
gitur  
Lym-  
phati-  
corum  
Origo.

sanguine , aquæ tepidæ ope , jam  
eloto , copiosum in arteriam sple-  
nicam infudi aërem , & , spiritus  
fortiùs adacto , non tantùm plu-  
res mas exiguas in superficie lienis  
vidi elevari vesiculas , sed ex iisdem  
vesiculis vasa prodire Lymphatica  
flatu etiam turgida , & lienem per-  
reptantia vidi , & quò diutiùs ar-  
teria fuit inflata , eò majorem no-  
tavi vasorum numerum , ita ut , hâc  
arte , per inflictum Vasis Lympha-  
ticis vulnus aër immissus , & mem-  
brana linealis ferè tota lymphaticis  
ductibus obfessa fuerit visa.

Ab eo tempore conjicere cœpi  
Vasorum Lymphaticorum princ-  
ipia ab arteriarum furculis emanare  
idque aliquandò intermediâ Ves-  
iculâ , aliquandò deficiente Vesiculâ  
immediatâ ab ipsa arteria , venave  
uti sequenti Experimento mani-  
festum redditur. Pulmonis humani  
( jam antè eloti ) Vasa arteriosa co-  
pioso aëre distendens observavi , e  
externa pulmonis superficie Vascu-  
prod



prodire lymphatica , varias anastomoses cum vicinis lymphaticis componentia , de quibus aliàs , Deo volente , pluribus.

Tertium observare licuit in testiculo virili , ex cujus tunica vaginali (inflatis priùs venis , spermaticis dictis) vas unum aut alterum lymphaticum egredi notavi ; idque toties cum successu institutum , quoties flatus diligentius fuerit immissus. Eundem tamen successum , hoc in loco , ab arteria spermatica inflata non habuimus ; quòd arteriola illa exigua admodum sit , & àër infusus eò usque penetrare non possit , ut primam Vasis Lymphatici originem subeat.

Sed si arctè adeò dicta vasa inter se cohæreant , quid obstat , *cur sanguis sub forma sanguinis non subintret vasa lymphatica ?* Resp. Hoc necessariò non sequi ; sic enim nulla in toto Microcosmo fieret secretio ; omnes enim humores , (excepto chylo) ab arteriis , tanquam à

Cur  
sanguinem ad-  
mittant  
Lymphatica ?

D 3

pri-

primo fonte , dependent. Insuper demonstratu haud difficile , angustissimos arteriarum canaliculos excludere ob pororum formam omnes particulas heterogeneas & transitum præbere liquori lymphatico. Simile iudicium esto de spiritibus in cerebro , salivâ in Glandulis salivalibus , lacte in mammis , bile in hepate , urina in renibus , &c. Mercurius noster , licet admodum mobilis , in arteriam splenicam injectus , nullo modo lymphatica , lienem perreptantia subingreditur , quum tamen infusus aër haud difficulter eas distendat : contrà , variis aliis in partibus nihil planè valet aër , in quibus tamen Mercurius noster facilem viam invenit.

Lympha  
sanguinea  
unde ?

Interim non diffiteor , vasa illa lymphatica lympham subindè vehere rubicundo colore tinctam , loturæ carnis instar se habentem. Hoc autem nunquam contingit in statu naturali , verum post nimium & ir-

& irregularem sanguinis motum. Vel in quibus humidum (ob defectum alimenti) deficit; quâ occasione plerique humores vitiantur, & colore præternaturali tinguntur. Quid mirum itaque, hisce in casibus lympham reddi sanguineam?

## CAPUT QUINTUM.

*Veterum & Neotericorum circa  
usum Glandularum Congloba-  
tarum Lymphaticorumque  
sententia rejicitur.*

**H**actenus itaque observata lu-  
ce meridianâ clarius demon-  
strant, Veteres & Recentiores cir-  
ca usum partium præscriptarum  
maximoperè errâsse. Dicebant e-  
nim illi destinatas esse Glandulas;  
Primò: *Pro vasorum divisionibus  
firmandis*, quum tamen in quàm-  
plurimis vasorum divaricationibus  
nullæ conspiciantur Glandulæ, in  
quibus etiam multum obessent, san-  
gui-

Anato-  
mico-  
rum  
opinio-  
nes circa  
Glandu-  
las Con-  
globatas  
& Lym-  
phatica,  
an sint  
alicujus  
valoris?

guinis motum retardando. *Secundò* : Pro humoribus superfluis , præsertim serosis , quia spongiosæ & raræ sunt Glandulæ , imbibendis , & inde vulgò *Emunctoria* vocantur. Sed quis rei absurditatem non concipiet , qui mente attentâ saltem attendat , exigua esse corpuscula Glandulas ; multum humoris excipere nescia , & ubi acceperint , eas statim morbosas reddi , hincque tot tumores , scirrhi , bubones , nodi , scrophulæ , cancri , &c. *Tertiò* : Pro partibus humectandis ad faciliorem motum , vel aliàs ad prohibendam siccitatem. Motum iis non facilitari , vel ex eo manifestum , quòd variæ corporis partes , in continuo ferè motu constitutæ , nullis ditentur Glandulis , ut Cor , musculi intercostales , musculi abdominis , &c. Quibus etiam partibus , quia non adsunt , siccitatem inducere non possunt. *Quartò* : Ut succum nutritium nervis minirent. Nervis nihil Glandulæ , sed hisce



hifce illi aliquid miniftrant, uti ligaturâ manifeftum, injectâ enim nervis ad Glandulas tendentibus, tonum earum perire, & ufu fuo deftitui, obfervabis : *Quintò* : Nonnulli *Fontes Pinguedinis* voluere Glandulas. Verùm in multis, etiam faniffimis, nulla circa Glandulas occurrir pinguedo; ergo ex ejufmodi fonte pinguedo non erit eruenda.

Denique probabiliter ftatuunt; *Glandulas cribra effe, hoc modo conformata, ut dum ex arteriis in venas per capillaria tranfit fanguis; liberatæ à fanguinearum amplexibus ferosæ partes, caloris vi, per convenientes fibi poros expellantur in capillaria Lymphaticorum.* Neque horum opinionem veritati effe confonam, vel ex eo probatur, quòd origo Lymphaticorum in Glandulis non fit quærenda, fed ex aliis partibus, quod jam demonftravimus, & demonftrandum erit ulterius in fequentibus.

## CAPUT SEXTUM.

*De Renum Vasis Lymphaticis.*

Renum  
Lym-  
phatica  
nova.

**E**xpositâ jam Glandularum, vulgò Conglobatarum, nobis *Muscosarum*, Lymphaticorumque doctrinâ; progredimur ad visceris aliqujus, Renis scilicet, vasa lymphatica, de quibus Anatomici nihil planè tradidere, aut obscurè admodum de iis locuti sunt. Quatuor vasorum genera jam dudum enumerârunt, sed de quinto, Lymphatico, altum apud Authores est silentium. Unicus, quod sciam, *Cl. Th. Bartholinus* Cap. de Renibus eorum mentionem facit his verbis: *Lymphatica vasa ad Renes quoque Lympham immediatè, ob viciniam deducere, in historia vasorum Lymphaticorum dubitabam.* Mox subjungit hæc verba. *Lymphæ ductus Renibus assignat Bellinus, accuratiori manu aliquando ostendendos.* Videmus hîc, *Cl. Bartholinum* dubium hæ-

hærere, &, quod planè impossibile. Lympham suam ad Renes deducere. Et *Cl. Bellinus* accuratiorem spectat manum, quæ eadem distinctiùs proponat.

Non hîc proposui, omnium Renis partium Anatomem exhibere, sic enim à scopo longè aberrarem, & Lymphographiæ meæ transcendere metam: verbo dicam, quinque nobis in Renibus occurrere vasorum genera, quorum *duo* sunt *inferentia*, ut arteriæ & nervi, aliaque non admittimus, quæ enim aliqui cæca vocant, liquorem ex ventriculo vel intestinis immediatè in Renes deferentia, hæcce in rerum natura non dari, sed fictitia esse, certò credimus: & *tria efferentia*, ut venæ, ureteres, & vasa Lymphatica; inter quæ tamen tale occurrit commercium, ut uno malè constituto, reliqua sua patiantur incommoda.

Quadriennium est, ex quo, Renum circa fabricam occupato, inter

ter alia in conspectum veniebant  
furculi duo exigui, aliquando tres  
quatuorve vascula pellucida, lym-  
phâ turgida, vasis emulgentibus in-  
cumbentia. Hinc præter humanos  
etiam porcinos, bovinos, leporinos  
& caninos examinare cœpi Renes  
& ubivis vascula observavi lym-  
phatica, ex concava Renis parte  
exeuntia, non tamen eundem cur-  
sum servantia; modò enim supra,  
modo infra venam emulgentem  
viam dirigebant, & diversis in locis  
anastomosi juncta, rectâ, ut tunc  
credebam, in chyli receptaculum  
tendebant. Postmodum rem altiùs  
examinans notavi, illud locum qui-  
dem habere in subjecto canino,  
vide *Fig. xxxi.* sed in humano,  
intermediâ glandulâ, lympham in  
saccum deferri chyliiferum.

Quis sit  
Lym-  
phati-  
corum  
ortus  
in Re-  
nibus?

Magna autem occurrit difficul-  
tas, circa Ortum vasorum lympha-  
ticorum ex visceribus exeuntium,  
& speciatim, ex Renibus, de quibus  
sermo est. Dixi antè, quomodo aë-  
ris



ris infusione in vasa sanguinea, aliarum partium detexerim lymphatica, eademque arteriarum esse vasa continua. Hic idem aër viam iterum invenit, & quidem primò in Rene cujusdam apri. Inflatâ enim arteriâ emulgente, aër in lymphatica transiit, eaque distendit; Inflatâ verò ejusdem nominis venâ, aër lymphatica non subiit. Contrâ in subjecti cujusdam juvenilis Rene, flatus per venam immissus, etiam lymphatica distenta reddidit, in arterias verò, non item. Hinc non obscure concluderem, arteriarum emulgentium extremitates, vasorum lymphaticorum constituere principia, quamvis præcisè locum, ubi arteriolæ faciem suam deponunt, & lymphatici vasis formam assument, notare non licuerit.

Postmodum plùs quàm semel observavi, ex iisdem arteriis vasa venosa tubulosque renales originem etiam ducere, talemque inter hæc atque illa vascula esse unionem, ut  
Con-  
sensus  
inter  
vasa  
Renalia  
sinu-  
laris.  
 inflatâ

inflatâ arteriâ venâve, flatu non tantùm distenderentur lymphatica, sed aër copiosius etiam in ureterem immisus (ligatis antè venâ arteriâ emulgente) etiam vasa subierit lymphatica. Successum hujus vidimus magis optatum, si primum vasa illa venosa & arteriosa cerâ fuerint repleta: hoc enim modo ureter vacuus aërem immisum copiosius admittit & facilius in lymphatica transmittit.

De quibus sermo est lymphaticis, eadem numerosissimis gaudent valvulis, impredientibus, ne lymphamotu retrogrado versùs Renes, à quibus eorum origo, redire posset. Hocque ubivis locum habet, ubi vasa lymphatica in quavis alia corporis parte conspiciuntur.

Præter detecta jam lymphatica ex sima Renis parte prodeuntia, jam aliquoties ex gibbosa etiam superficie exortus vasorum lymphaticorum nobis fuit observatus.

Ex gib-  
bosa

Exigui enim furculi lymphatici in  
du-

duplicem truncum abibant , quo-  
 rum alter superiora versùs , alter  
 versùs inferiora Renis dorsum per-  
 reptabat , factoque versùs vasa  
 emulgentia flexu , glandulam subin-  
 grediebatur , ex qua iterum rectà in  
 capsulam chyliferam tendebat. Uti  
 ex citata *Figura xxxi.* manife-  
 stum.

Renum  
 parte  
 Lym-  
 phatica  
 nova.

Morbosa quædam Renum con-  
 stitutio , magis adhuc meum con-  
 firmat inventum. Hydatides nam-  
 que variæ , in Renum substantia vel  
 etiam superficie non rarò conspi-  
 cuæ , digito quasi idem demon-  
 strant , quales etiam vidit *Theodo-  
 rus Zwingerus Ephemerid. Ger-  
 man. Dec. 2. ann. 6. p. m. 544.*  
*Ren sinister* , inquit , *ex tunicis evo-  
 lutus* , *exterius sex Hydatidibus con-  
 situs fuit* , *quarum una & maxima*  
*ovum Columbinum æquans* , *ad la-  
 tus vasorum emulgentium appensa* ,  
*coloris lividi* , *ejusdem cum vena*  
*emulgente fuit* ; *cætæræ verò turgen-  
 tes vesiculæ* , *hinc inde positæ* , *nuce*  
*avel-*

Renum  
 Hyda-  
 tides  
 unde ?

*avellanâ maiores & minores fuerunt, omnes transparentes & pellucidæ. Ejusdem ferè naturæ Renes malè affectos viderunt Clariss. Wilius Path. Cereb. Cap. ix. p. n. 417. & Carolus Piso in Tractatu suo, De Colluvie serosa Observ. 94 p. 359.*

*D. Laurentius Wolfstrigelius Cystitin notabilem Reni adnatam, a magnitudinem pilæ lusoriæ, subflavescente sero turgidam vidit, cujus historia & delineatio videre est, in Ephem. German. Dec. I. ann. I. observ. 43 Et casum haud absimilem notavit ac delineavit D. Georgius Segerus, ex cadavere quodam, cujus externa Renis superficies, circa extremitatem superiorem, vesica pellucida sero repleta apparebat. De quibus vide Dec. I. ann. 2. Observ. 23.*



## CAPUT SEPTIMUM.

*De Ovariorum Uteri Lymphaticis.*

**P**ost Renes, etiam Testes Fœmineos, Ovaria dicta, inspiciendos habemus; quòd lymphatica vasa copiosissimè ex iisdem prodeant. Summopere aliquando sum miratus, ex tam exiguæ molis corpore, adeo copiosos & amplos exire ductus Lymphaticos, quum tamen arteriolam obtineant admodum tenuem. Ubi namque simplex subingreditur ovarium vasculum arteriosum, ibi quadruplici, aut quintuplici ramo exeunt lymphatica notabilis magnitudinis. Hinc ingratum me facturum non spero, si hujus partis structuram paulò accuratius perlustrem.

Notissimum est, Ovarium variæ magnitudinis continere ovula, eademque continuò debere nutriri, aut succo quodam irrorari. Sed difficultas est; per quas vias nutrimentum

Ovula  
in Ovariiis quâ  
nutriantur?

E

mentum tale ad ovula deferatur, quum arteriæ visibiles non conspiciantur: quæstio hæc minùs difficilis occurret; si attendamus, pleaque arteriarum vasa capillaria, non sanguinem, liquorem illum rubicundum, vehere; sed lympham potius, jam à reliquis sanguinis particulis separatam, transmittere. Crassiuscula enim capillaribus venarum in itinere erant tradenda, ut eò intimiùs reliqua penetrare, & oculorum interiora subire lympham posset: uti Experimentis, Mercurio ritè præparato, Tincturisque coloratis manifestum redditur.

Neque hîc obstare debet arteriæ spermaticæ teneritas, ac si illa lympham tam copiosam non veheret. Hæc enim cum ipsa arteria hypogastrica, tot in ovario componit anastomoses, ut, licet arteriæ spermaticæ non adessent, non tamen partium nutritio aut ovulorum fecundatio cessaret, sed sanguis per arterias hypogastricas tantum ad-

vectus,

vectus, huic ufui infervire poffet. Rectius tamen procedit, fi à duplici fonte, arteriâ fcil. hypogafttricâ & fpermaticâ, procedat; fic enim duo illi rivuli variis in ovarii locis concurrentes, majorem humori lymphatico imprimunt vim, & intimius ad interiora pergunt.

Hæc ut felicius procedant, notandum, varias hîc occurrere arteriarum intorfiones (capreolorum vitium inftar implicatas) quæ arteriolarum divaricationes ita difponunt, talesque formant poros, ut nonnifi certum aliquod genus particularum transmittant. Partes interea craffiores, vafa venofa; & tenue superfluum Lymphatica fubingreditur, relictis iis, quæ, vel pro nutritione, vel ovuli fecundatione inferviunt. Pro varia tamen fanguinis constitutione, diverfimodè ovula illa moventur; fpeciatim verò, dum poft congressum, fanguinea maffa, à fermento feminali notabiliter agitur,

E 2

talem-

talemque ipsis ovulis introduci  
motum ; ut illa, quæ antè vix con  
spicua , jam caput exserant , & te  
admiranda includant.

Quid autem pororum diversa va  
leat constitutio, aliàs diximus, &  
confirmatur Experimento sequenti.  
Sumatur Charta Emporetica , oleo  
olivarum madida ; huic si affunda  
miscelam ex aqua & oleo : oleum  
tantùm trajicitur cum nonnullis  
ex aquæ particulis tenuioribus. Si  
verò charta priùs aquâ fuerit ma  
defacta : affusæ miscelæ parte  
aqueæ citò transibunt, remanenti  
bus omnibus oleosis.

Animal  
ex ovo  
generari  
Experi  
mento  
proba  
tur.

Occasione ovulorum incidit  
non obscurè nos antè indicâsse , i  
iisdem latitare foëtûs primordia  
quam opinionem libenter ample  
ctimur , & eò usque defendimus  
donec quispiam aliis ratiociniis &  
experimentis certioribus contra  
rium demonstraverit. Experimen  
tum interim , nuper institutum  
egregiè hîc pro eo militare videtur.

tu



tur. Cani foeminæ, tertio post congressum institutum die, extraxi, per vulnus abdomini inflictum, sinistri lateris cornu (cujus ovarium jam duobus ovulis majusculis notabiliter conspicuum erat) inter vaginam & ovarium, medio loco, ligaturâ arctiori constrictum, reposui, vulnusque intra octiduum ad cicatricem perduxi.

Vigesimo primo, post ligaturam injectam, die, canem, cultro Anatomico examinandum, inspicio, & quod ante hariolatus eram, etiam plenè perspexi. Sinistri cornu pars (inter ligaturam & ovarium) duplici foetu erat obsessum; altera verò portio (ligaturam inter & vaginam) planè vacua nobis visa: quod manifestissimè probat, ovula ulterius, quàm ad ligaturam, propelli non potuisse, & in ipsis ovulis, aurâ feminali foecundatis, foetus quærendos esse, non verò in semine virili. Oppositi lateris cornu itidem inspecto, tribus foetibus (sed

E 3

regu-

regulariter dispositis ) distentum reperi. Notandum interea , unius atque alterius lateris foetus jam consumptos, & in materiam purulentam pene conversos esse ; cujus rei causam hætenus distinctè concipere non potui.

Lym-  
phati-  
corum  
Ovarii  
descri-  
ptio  
nova.

Sed redeamus , unde digressi fuimus , ad Vasa scilicet Lymphatica. Observavimus modò tribus , modò quatuor , subinde etiam quinque ramificationibus ab ovario exire , cumque iisdem alia , sed minora ( & rariùs conspicua ) conjungi. Ex ovariiis prodeuntia , illa ampla sunt , & sæpe superant crassitiem in Tab. cit. delineatorum. Multiplici valvulâ sunt conspicua , & variis in locis dum vasis spermaticis hederæ instar eadem amplectuntur , anastomos junguntur , donec tandem simpliciter aut duplici ductu , sed satis amplo saccum subintrent chyliiferum. Ut *Fig. xxxi.* distinctiùs notabit.

Eorum  
insulæ  
neces-  
sariæ.

Aliquando , medio itinere , insulas ex vasis lymphaticis formatas vidi eodem

eodem ferè modo , quemadmodum in ductu Thoracico frequentes occurrunt.

Propositæ modò anastomoses vel insulæ , summæ erant utilitatis ; ne particulæ obstruentes , & mediâ viâ hærentes , lymphæ viam facilè præcluderent , sed lymphæ mobilis per ductus laterales , & vasa lymphatica patentia delata , cursum absolveret.

Præter vasa Lymphatica , tùm Renum , tùm Ovariorum , proposita , alii occurrunt Rivuli lymphatici , quorum nonnulli aortæ & arteriæ Iliacæ incumbunt : alii iterum , in opposita parte , cavæ venæque iliacæ contiguitate juncti sunt. Hi autem atque illi ab inferioribus partibus oriundi , Glandulam ingrediuntur , inde ex priori in secundam , & aliquando in tertiam , & sic porro in quartam ( nam certus Glandularum numerus non ubique occurrit ) feruntur , & vel soli , vel aliis anastomosi juncti , lympham

Arteriæ  
Iliacæ  
& venæ  
cavæ  
Lymphaticæ.

E 4

suam ,

suam , in chyli saccum , tanquam in communem cloacam , evomunt. De quibus consule *Fig. xxxii.*

Hocque non tantum in homine, sed & in brutis animantibus ( in quibus primum illud detexi ) locum habet , cum ea tamen differentia ; quod Glandulæ hîc adeo numerosæ , ut in subiecto humano, non occurrant , verum ordinariò unica in quovis latere ( sed major ) vel duæ minores conspiciuntur.

Unde  
Lym-  
phatica  
Iliaca  
ortum  
ducant ?

Unde autem vasa hæc lymphatica originem ducant , haud difficilè demonstrarem ; sed de iis, Deo volente, alio in Tractatu, ubi, præter hæc , etiam de lymphaticis artuum ( à quibus verus illorum ortus ) agere animus erit.

Quæ  
mala,  
Ovarii  
Lym-  
phati-  
cis, sæ-  
super-  
veni-  
ant.

Quum jam summa demonstratorum eluceat utilitas , sic eadem sua patiuntur incommoda. Longum nimis foret , omnia enarrare mala ab his fontibus & fluminibus oriunda. Quoties quidem prima lymphaticorum principia subtilissima non



non transmittunt lympham crassiusculam , & ita totam sanguinis diathesin invertendo , cachecticam dispositionem inducunt ? quoties partes glandosæ , lymphâ crassiori infarctæ , vel terreâ gypseave materiâ obstructæ , omnem impediunt lymphæ transitum ? quoties lymphatica , ad crepaturam usque obstructa , per poros suos non transmittunt laticem serosum ? quoties eadem non crepant , lymphamque , pleno gurgite , in abdominis cavum eructant , & ita ascitis incurabilis causæ existunt ?

Quid ! an non sterilitatis causa sæpe latitat in lymphâ illa crassiuscula , tenellas ovulorum partes obstruente & comprimente , dum subtilissimi sanguinis spiritus , ipsumque fermentum feminale virile , frustra in partes obstructas arietant , vix ullam ipsis inducere mutationem valentia ? quoties denique obstructa lymphatica , tubas perreptantia , in magnam molem

assurgentia , & pondere suo latera eorum prementia , ovulorum in tubos impediunt introitum ; talesque casus frequentiores sunt , quàm Medici practici autumant , uti Historiis aliquot , capite sequenti , sumus illustraturi.

Sed notandum hîc venit , uterum cum annexis , Tabulâ citatâ notatum , facie inversâ demonstrari , ut eò distinctiùs , quodvis vas lymphaticum , in conspectum prodiret ; cùm aliàs eadem nunquam accuratè in sensus incurrant. Et licet naturali magnitudine minor exsculptus conspiciatur , quisque tamen , rerum Anatomicarum studiosus , haud difficulter , partes singulas distinguere poterit.

An Uterus ipse Lymphatica obducatur ?

Mirabitur fortè aliquis , cur nulla corporis Uteri addiderim vasa lymphatica. Nolim hîc , credat curiosus , lymphaticis illud esse destitutum. Non certè ; statuendum potius , partem hanc , æquè ac alias , suis exornari canaliculis lymphaticis.

Ideo

Ideo tamen nec addidi , nec deli-  
neavi ; quòd hætenus , eâ , quâ par  
erat , accuratione illa detegere non  
potuerim. Nihil autem æri inci-  
dendum censui , quod multiplici  
experientiâ non constaret , & quo-  
vis tempore demonstrare valeam.

Ne quis autem de rei hujus veri-  
tate dubitaret ; Uterus bovinus hoc  
loco vices supplere debuit ; in quo  
copiosa adeo , & tantæ magnitudi-  
nis occurrunt , ut cuivis sedulò in-  
quirenti facili negotio appareant.  
Et quamvis pars antica suis gau-  
deat ductibus lymphaticis ; posti-  
cam tamen ( quæ lumbos respicit )  
repræsentare placuit ; utpote va-  
sculis majoribus distinctius exor-  
natam. Dextri occurrunt eadem , &  
sinistri lateris , exiguis principiis  
oriunda , numerosissimisque val-  
vulis conspicua , tandem truncum  
componunt duplicem , notabilis  
magnitudinis , qui uterum linquens ,  
rectâ pergit in lymphatica ilia-  
ca , & inde in chyli cisternam.

Ute-

Uteri hnjus delineationem vide  
*Fig. xxxiii.*

Ureterum  
constitutio,  
& calculi in  
iisdem.

Circa *Ureteres*, quos Authores à renibus ad vesicam, æqualiter, (sed malè) extensos delineant, hoc observavi, & perpetuæ veritatis esse jam toties notavi; illos nunquam, tam in sexu masculino, quàm, foemineo, ubivis esse æquales; sed tribus, quatuorve, & aliquando quinque in locis angustatos conspici; speciatim verò, circa illorum exitum in vesicam, uti *Fig. xxxii.* monstratum dabit. Hinc ratio jam desumenda; cur calculi nephriticorum, sæpe hæreant in itinere, per ureteres faciendo, & patientes, potissimum si calculi latera habeant acutiora, tantos percipiant dolores, uti non ita pridem in variis observavimus. Ureteris propterea partem unam & alteram ita præparavimus, ut quisquis, facili negotio, colligere possit, quo modo, hoc casu, ureteres afficiantur. Uti *Figuræ xxxiv. & xxxv.* demonstrabunt.



bunt. Quæ præter calculos (tam circa primam ureteris angustiam, quàm ultimam ejus coarctationem) hærentes, etiam vasa proponunt renalia, Adducentia; arteriam scilicet & nervum: nec non Abducentia; venam nimirum, ureterem, & vasa lymphatica.

Si fibræ, ureteris membranas <sup>Quid calculum propellat?</sup> componentes, cedere satis nesciant; calculi, incrustationibus novis obducti, incrementum sumunt, ureteremque adeo obturant, ut omnis per hanc viam urinæ transitus denegetur. Ubi verò cedentes fibræ calculos minores transmittunt, & fortiori urinæ pressione, vi sibi viam facientes vesicæ vacuum subeunt, cum urina excludenda, non rarò expelluntur.

Sed observatum sæpius, calculos <sup>Calculorum Generatio in vesica.</sup> ejusmodi, mole suâ quidem parvos, sed, ob materiæ unionem compactiorem, in vesica hærrere, calculorum futurorum nucleum constituere, cui facilè incrustationes lapideæ,

pideæ , tanquam stratum supra stratum superveniunt. Hocque iterum facilius accidit vitam sedentariam agentibus , quorum urina tardiùs in renibus secreta , diutiùs in vesica moram nectit ; dum particulæ ejus , ex sale volatili urinoso , spiritu limpidissimo , oleo fœtido , & terrâ fatuâ compositæ , nucleoque dicto junctæ , molem calculi adaugent.

Experi-  
mento  
confir-  
matur.

Nucleus itaque talis , aut aliùs naturæ corpus aliquod terrestre , plerumque adesse debuit , ejusmodi poris donatum & superficie , cui particulæ ab ipsa urina secretæ , adhærere & calculi incrementum promovere possent. Ut autem hæc certò magis constarent , experimentum aliquod instituendum erat. Inciso vivi animalis ( canini v. g. ) hypogastrio , per vulnus inflictum vesica extrahatur , dein per ejusdem vesicæ membranas , secundum ductum fibrarum , instrumento acutiori , in fundo læsas , globulus im-

immittatur ligneus ; mox , contractibus se fibris , vesica per vulnus abdomini antè inflictum repellenda , vulnerisque ratio habenda. Animal primo biduo tristiùs quidem , sed brevi post alacriter vivere & comedere incipit. Globulus autem vesicæ jam inclusus , vix aliam animali causatur molestiam , quam quòd vesicam ad excernendam urinam frequentius stimulet.

Hoc in statu animal per aliquot septimanas fervetur : hinc , inspecto abdomine & vesicâ , jucundo planè aspectu observamus ; globulum dictum exiguis calculis , quasi totidem crystallis , esse incrustatum : uti hisce diebus , felicissimo cum successu in Amphitheatro domestico D. D. Studiosis fuit propositum , demonstratumque. Particulam ligneam ex vesica extractam , vestitu calculoso indutam , nobisque intercuriosa servatam *Fig. xxxvi.* repræsentabit. Dissimili haud modo ( si parva magnis comparare liceat )  
quo

quo saccharum tantum album bacillis suis adhærere videmus. E hoc quidem modo calculus in renibus primùm genitus, bacilli instar, nucleum constituit, postmodum verò in vesica, particulis calculosis, cum urina aliàs excernendis, obducitur, & in monstrosam tractu temporis, non rarò, magnitudinem excrescit.

Ubi verò ejusmodi nuclei deficiunt, rariùs calculi vesicæ formantur, quoniam corpora non adsunt quibuscum particulæ hæ heterogeneæ jungi possunt. Hinc non tantùm nucleus talis, aut globus ligneus, sed varia alia, nucleorum instar se habentia, calculorum fundamentum constituere valent. Ut casus sequentes egregiè probant.

Historia  
rara.

Adolescens, inquit *Nobilissimus Tulpius*, pag. m. 204. temerarius fretus juvenili robore, ivit, in India Occidentali, venatum Urum sive taurum sylvestrem: ferox profectò, & indomitum animal. Verum



rùm venatione infelicitèr succedente , ictus fuit graviter à tauri cornu ; transeunte vulnere , per peritonæum , usque in vacuum vesicæ urinariæ.

Cujus dilaceratæ tunicæ , plurimum ubi colligerent puris ; immisit illis Chirurgus , detergendi causâ ampliorem turundam , concinnatam ex complicatis filis. Evenit autem , sive ægri incuriâ , sive curantis negligentia , ut turundam hanc in se attraxerit vesica , obducens eam primùm mucosâ , dein verò concreto calculo.

Unde occludi paulatim vulnus ; emingi continenter pus ; & collum vesicæ urgeri tam perenni mejendi difficultate ; ut inde moveretur non levis suspicio latitantis alicujus calculi. Quem etiam tandem ipsi exscîdit Lithotomus , æquantem magnitudine pugnum humanum : & continentem in se turundam illam , quam diximus Chirurgus clanculùm fuisse subductam.

F. Libe-

Liberatus hoc modo juvenis ponderosâ hâc mole , evasit ilicò inextricabile illud periculum , quod ipsum aliàs , miserandum in modum confecisset.

Alia.

Alius , citato haud absimilis , casus oblatus *Clarissimo* p. m. Collegæ , *D. Lucae Schachtio* : cùm attotitus videret , manu *dexterrimi Lithotomi* nostratis , *D. N. Smaltzii* p. m. per inflictum vulnus , calculi loco , extrahi duas fistulæ tabacinæ partes , callosâ crustâ notabiliter obductas. Quibus oblatis referebat examinatus patiens ; se ante annos aliquot , post Lithotomiam , tunc temporis etiam institutam , pruritum vulneris , nondum consolidati , sensisse molestum , partemque læsam adeò irritantem , ut fistulâ tabacinâ , quam fortè ad manus habebat , vulneris latera exploraverit , & fricaverit pruriginosâ ; hancque fistulæ fractæ partem , vesicam urinariam subingressam , in illum usque diem , ibidem hæsisse affirmat.

La-

Lapidis Bezoartici generatio, Lapidis Bezoartici generatio. hîc lucem adferre poterit : hunc enim eodem ferè modo , principia sua aliquot duxisse , sæpius observatum. Et qui nuper mihi à spectatissimâ quâdam Matronâ fuit oblatus , pro specimine inservire poterit. Hic , figuræ oblongioris , centro suo abscondebat bacillum , rotundum , oblongum , ab una ferè ad alteram lapidis partem extensum , cui variæ incrustationes lapideæ , diverso colore ( flavo potissimum , albo & sanguineo ) tinctæ adhærebant. Et quæ omnium extrema , eleganti lævitate conspicua fuit , colore etiam tali , quali ordinariò Lapis Bezoar orientalis donatus esse solet. Lapidis hujus delineationem , unâ cum bacillo , & particulâ , incrustationes repræsentante , videre licet *Fig. xxxvii.*

## CAPUT OCTAVUM.

*De Lymphaticis Ovarii , &c.  
male affectis.*

Lym-  
phatici  
in Ova-  
rio ma-  
le affe-  
cti hi-  
storia.

**V**irginis , viginti quatuor circiter annorum , hypogastrium , magis ac magis in tumorem abit , quo non parum suspecta fuit habita , & quidem potissimum , quod nullum cachexiæ adesset signum ; sed color faciei floridus maneret. Inexpectatò illa in alium morbum incidit ( cujus historiam hîc referre , nihil ad rem ) & brevi diem obit suum.

Aperto cadavere & abdomine inspecto , ut reliqua præteream , gravidam eam fuisse , primâ fronte credebam , ob corpus uteriforme , pelvim occupans , nobis oblatum. Sed oculo propiùs admoto , illud , versùs sinistrum magis latus protensum , & ab utero , benè alioquin in hoc constituto , planè distinctum vidi.



vidi. Ovarii quippe sinistri lymphaticum, mirum in modum extensum, saccum formârat, adulti hominis caput æquantem, lymphæ, admodum claræ & tenuis, pintas ad minimum duas continentem, ipsum ovarium destruentem, & tubæ latera adeo prementem, ut nec styli nec flatûs, per hanc viam, ad uterum daretur aditus. Vide *Fig. xxxviii.* Hæc autem alio morbo ni fuisset extincta, diu adhuc superesse potuisset. Malum interea hocce, quod chronicum esse solet, pro incurabili esse habendum, ex sequentibus fiet manifestum.

Mulier triginta sex annorum bene disposita, à congressu cum marito peracto, ingravidationis percepit indicia, & quæ antè, aliquot jam pepererat liberos, eodem modo se affectam persentit; hac saltem cum differentia, quòd venter solitò magis extenderetur, & jam ad prodigiosam magnitudinem veniret, quodque tamen patienter

Alia  
Histo-  
ria.

tulit ; potissimum quum obstetrix & mulieres vicinæ , prognosticum facientes , pro certo haberent , eam si non geminos , fortè tergeminos in lucem edituram.

Illam interim benè coloratam , de nullo urgente symptomate conqueritur , nisi quòd spiritum (ob diaphragma nimis pressum) cum difficultate duceret ; & urinæ aliquā incontinentiā laboraret ; quæ tamen incommoda alacriter superare conata , non immemor , gravidis haud rarò eadem supervenire.

Elapsis itaque novem mensibus , partûsque tempore instante , ex improviso dolores parturientem apprehendunt , & modicâ aquarum mole elapsâ , foetum sanissimum in lucem edit , foetumque unum aut alterum adhuc sequuturum , nulla adstantium dubitabat ; quòd venter in monstrosam ferè magnitudinem elevatus , parum saltem ab ejus extensione remiserat. Post lochiorum fluxum , viribus recuperatis  
ad

ad ordinaria redit munia , ventre non minus elevato , ac si octo vel novem mensium gravida foret.

Decimâ octavâ à partu septimanâ me conveniens , opem meam implorabat , nescia quid mali esset. Quos consuluerat Doctores , alii Asciten , alii Tympanitidem constanter affirmabant. Verùm intelligens , ipsam (balance examinatam) ponderare centum quinquaginta & quatuor libras : ante conceptionem verò , nonnisi centum & triginta ponderâsse , eamque interea temporis obesiozem non fuisse redditam , certò concludere potui ; non Tympaniticum , sed Hydropicum esse affectum , nullo tamen modo Asciten : experienciâ enim didiceram , illas , quarum facies colore grato est rosea , quæ satis benè comedunt , bibunt , alvum deponunt , urinamque sine notabili molestia excernunt ; quarum corpora nec purgantibus , nec diureticis , nec diaphoreticis multum auscul-

F 4      tant,

tant, quemadmodum & hæc: illas, inquam, ordinario affectu Uteri, Tubarum, vel Ovariorum laborare hydropico, lymphamque, peculiari sacculo inclusam, nullâ arte extrahi posse.

Suasi itaque, diætam regularem continuò servandam, malumque hocce incurabile patienter esse ferendum. Illa consilium meum negligens, medicum adit circumforaneum, qui certam ipsi pollicetur curam; quamque etiam aggreditur; sed præscripta varii generis medicamina, malè admodum, cedere videns, patienti, viribus haud parum jam attritæ, prudenter valedixit.

Neque hoc satis esse credebat patienti; relicto circumforaneo, Chirurgum quendam adiit sciolum, & de sua encheiresi, ut solet, satis gloriosum. Hic fronte severâ, habito examine, paracenthesin abdominis instituendam suadet: quamque etiam, sine longiore mora, sequenti die instituit, sed infelicissimo cum suc-



successu. Aquæ enim , ex sacco membranaceo exeuntes , parcè admodum prodière , sed abdominis viscera potius inundârunt. Accrescentibus ilicò symptomatibus , tri-duum intra fuit extincta. Pluribus Historiam hanc prosequi non potui , quòd cadaver inspicere non licuerit. Manifestè interea docemur , multùm præstare ejusmodi patientes intactas relinquere , quàm , certissimo interitu , mortis horam accelerare.

Plures hujus generis casus referre possem , quos studio prætereo , in praxi mea olim observatos : & hoc ipso tempore nonnullas novi , eodem malo laborantes , nullâ arte restituendas. Notabilis tamen Historia , à Clarissimo D. *Drelincurtio* , Collega honorando , communicata , hîc adjungenda erat.

Die vigesimo Junii , 1681. Do-  
micella 35 annorum , vigesimo æta-  
tis anno viro nupta , quatuor inter-  
ea pepererat filios , & filias totidem.

Tertia  
Histo-  
ria.

Partûs temporibus prodigiosam aquarum quantitatem excernere solita, potissimum partu ultimo, quod fuit 27. Februarii 1678.

Quo die, elapsis aquis, filioque satis vegeto in lucem edito, geminum restare creditum fuit; sed eo non prodeunte, doloribusque, in modum novorum conatuum, continuantibus, vocor. Permagnum & inæqualem in sinistro inguine percipiens tumorem, judicavi testiculum finistrum, tumore scirrroso obfessum, & consequenter malum esse incurabile. Brevi notabiliter adeò venter ejus inflatur, ut extensus magis, quàm tempore graviditatis appareret: & ab eo tempore, ad oculum apparuit, tumorem in majorem assurrexisse molem; usque dum quarto Maji 1681 vitam cum morte commutaret.

Ope paracenthesios, quadraginta ex abdomine extraximus aquæ pintas; &, separato testiculi finistri tumore, testis insuper pendeat  
libras

libras decem. Tumor erat tuberosus , inæqualis admodum , & totus compositus infinitâ globulorum quantitate , coloris variegati , & consistentiæ diversæ.

Examine distinctiùs instituto , notatum fuit ; testiculum hunc monstruosum , originem sumere , ex vesiculis seminariis , ad illam magnitudinem accretis ; quarum aliæ humorem serosum , & limpidum continebant ; aliæ humorem serosum ex flavo nigricantem , sed mobilem , & leviori attactu , exstillantem : aliæ serum glutinosum & mellicum non absimilem ; aliæ iterum liquorem gelatinosum , crassiusculum , attamen transparentem capiebant. Denique aliæ erant gypseæ & grumosæ , aliæ coriaceæ , & totaliter scirrhosæ , atque ut totidem ganglia conspicuæ , aut ut tot lupi durissimi.

Omnes inter se cohærebant fibris duriusculis , coriaceis , firmiterque peritonæo annexis. Quædam  
nuci,

nuci, aliæ ovo columbino, nonnulla Gallinæ ovo æquabantur; sed inter illas ternæ conspicuæ erant, pugni magnitudini non cedentes, & non abfimiles illis, quas *Vesalius* describit *lib. 5. cap. 9.* Impossibile visum numerare reliquas, quas comparabam (exceptâ illarum magnitudine differente) cum vaccarum cotyledonibus, partui proximarum.

Lateris hujus affecti tuba flaccidior erat, sed flatum tamen facile admittens. Testiculus dexter, reliquaque uteri sana erant, sed prodigiosæ testiculi sinistri vesiculæ, & potissimum, quæ leviori attactu lympham stillabant, opinionem nostram confirmârunt alicujus hydropis speciei; quam Magnus noster Hippocrates distinctè notavit *lib. τῶν ἐν τῷ πύθωνι*, ubi harum vesicularum, aquâ repletarum facit mentionem; &, quæ crepantes, originem constituunt, diluvii lethalis, nos inundantis, vitæque



que nostræ lampada extinguentis.

Notandum hîc , quadraginta pintas , ex abdomine eductas , componere stopas Hollandicas decem , sive quinquaginta libras ponderis mercatorum : junctisque insuper decem libris testiculi sinistri ; quis nobiscum non mirabitur , Domicellam potuisse superesse , sexaginta librarum onus in abdomine gestantem , attamen singulis vicibus menses , ut antè , regulares habentem ?

Existimamus observationem 44. lib. iv. *D. Tulpii* , & nonnullorum aliorum malè fuisse enarratam ; quodque , quum assignarent hydroperem , cornubus uteri affixam , debuissent notâsse id , quod nobis notatum , ovi ductus scilicet ejusmodi in occasionibus fuisse sanos , sed ovarium malè constitutum.

Huc usque *Clarissimus Drelincurtius*. Sed , ut pace ejus hoc addam , distinctiùs adhuc judicâset , si vasa ovarii lymphatica , primùm à nobis detecta , ipsi fuissent cognita ;  
cer-

certò sibi persuasum habuisset , præter vesiculas feminales , alias occurrere vesiculas , ab obstructis lymphaticis oriundas , lympham , sed aliter constitutam , continentes : quodque etiam haud obscurè apparet ex *Clarissimi J. M. Hoffmanni* observatione *Dec. 2. ann. 5. obs. 207. Ephem. Germ.* Ubi inter alia hæc habet.

Historia  
quarta.

Præter ovula , anno abhinc superiore , in cadavere infanticidæ , solertissimis nostris philiatris demonstravi hydatides , sive vesiculas orbiculares , humore limpidissimo repletas , numero tres , magnitudine ovula feminalia vera superantes , & à membrana exteriori , testiculum sive ovarium dextrum , quâ parte uteri fundum recipiebat , involvente erumpentes , proximèque sibi invicem accumbentes , quas cum dein aquæ fervidæ immerissem , humorem inclusum non adeo promte , quemadmodum feminalem ovulorum liquorem , concretum

tum deprehendi , sed aliquantum saltem turbidum factum. Originem dictarum vesicularum si quis ex me quærat , quantum conjecturâ assequi licet , existimo , vesiculas tales evenisse , aut propter ruptas aliquas tunicæ ovarium investientis fibrillas , & lympham hinc in vesicularem formam concretam ; aut propter lympham interceptam , tunicamque ovarii distendendo in vesiculas attollentem : non absimili modo ac à fero , quod cutis poros permeavit , sub cuticula coërcito , hancce in vesiculas elevari sæpius cernimus. Huc usque Cl. Author. Quocum circa originem vesicularum harum planè non convenirem ; quum detectis jam vasis lymphaticis , ab iisdem malè affectis , easdem deducere , nihil facilius.

Taceo hîc stupendam partis hujus hydropem , à *Clarissimo D. Munnix* , Professore Ultrajectino , observatam. Nec non raram eam , in cornubus uteri à *Nobilissimo Tulpio*  
cap.

*cap. XLIV. f. 369. notatam ; quorum affectuum causa & origo rectius manifestabitur , si ad Lymphatica nostra tum Ovarii , tum Tubæ Fallopiianæ recurramus.*

Prætereo insuper tot Hydatidum genera , variis in abdominis partibus conspicua , & hepatis etiam superficiem concavam , non raro obsidentia. Vesiculæ autem istæ vasa lymphatica sunt , quorum ductus , in quibusdam tractibus obstructions patientes , à tergo arietante lymphæ , in vesiculas primò minores , sed sensim majores , attolluntur ; quæque etiam pressio si major fuerit , lymphæque acrior , disrumpuntur , lymphæque in abdominis cavum eructatâ , periculosæ Ascitis signa manifestantur.



## CAPUT NONUM.

*De Lymphaticis Peritonæi ,  
hujusque Hydrope , Historiæ  
Rariores.*

**A**natomicos inter curiosiores lis An Pe-  
rito-  
næum  
agitur atque controversia: Lym-  
phatica  
habeat?  
*An Peritonæum Lymphatica obti-  
neat , nec ne ?* Plurimi eadem ne-  
gant , & potissimum ii , qui nulla  
admittunt lymphatica , præter-  
quam , quæ à glandulis conglobatis  
oriuntur : & cùm nullas in Peri-  
tonæo detegerent tales glandulas ;  
certò ipsis conclusum ; ejusmodi  
lymphatica non occurrere.

Alii tamen , inter quos *Clarissi-  
mus Rudbeckius* , curiosus sui tem-  
poris vasorum lymphaticorum in-  
dagator , se eadem inter musculos  
abdominis , transversos & obliquos ,  
Peritonæum perforantia , & chyli  
cisternam ingredientia , vidisse affir-  
mat. Nos tamen situm illorum  
vasorum longè alium ibidem inve-  
nimus ,

nimus , hincque necessarium duximus in eadem diligentius inquirere , ut Novi illius Morbi ( novum voco , quòd antè incognitus fuerit ) causam , *Peritonæi Hydropem* intelligo , rectius perlustraremus : cui rei experimentum , in canibus institutum , jam proponendum , lucem non mediocrem attulit.

Methodus  
dissec-  
tata vasa  
inve-  
niendi.

Urethrâ ligamine priùs constri-  
ctâ , per inflictum venæ crurali vul-  
nus , tantam liquoris diuretici in-  
fudi quantitatem , quantam animal ,  
ne extingueretur , ferre posset , san-  
guinemque hinc arteriosum , & con-  
sequenter etiam lympham , tincturâ  
nostrâ gravidam ( quo etiam ne-  
cessariò lymphaticâ distinctius pro-  
deunt ) conspicua reddidi , & inter  
illa mihi selegi , quæ venarum , quas  
musculos superiores Anatomici vo-  
cant , consortio gaudent , uti *Figur.*  
*xxxI.* antè citata , notabit. Qualem  
autem in cursu , versùs chyli cister-  
nam , lymphæ hujus sibi eligat viam ,  
eadem *Fig.* monstrabit.

Liga-

Ligatis, hoc modo, circa exitum venarum dictarum, lymphaticis, statim eorum ramificationes, inter musculos abdominis & speciatim ex membranis, dictis musculis propriis, nec non inter duplicaturam Peritonæi, hinc illinc dispersas notavi, aliudque principium invenire non potui: ibidem autem verum esse principium, eò facilius credidi, quod in tot aliis partibus membranaceis, veram detexerim lymphaticorum originem.

Vasa illa, variis ramificationibus in unum truncum abeuntia, iterum in tres quatuorve dividuntur ramulos, per supremam Glandulæ Iliacæ partem dispersos, unde iterum pergunt in vas lymphaticum majus; venæ cavæ incumbens, aut latera ejus tangens.

Hæcce autem lymphatica eadem & graviora pati mala perquam necessarium videtur: præterquam enim quòd, ut reliqua, obstructiones patiantur, in hydatides abeant;

Quomo-  
do male  
affician-  
turLym-  
phatica  
perito-  
næi?

& ita variæ magnitudinis vesiculas ( uti historiæ testantur ) forment: insuper ab abdominis musculis, solito magis extensis, illud periculi subeunt. Speciatim id in voracibus, helluonibus, & passim in gravidis metuendum. Dum ab una parte musculi extensi renitentes, ab altera ventriculus, intestinaque ingestis repleta, vel uterus notabiliter gravidus, tanta cum vi premit, ut non exiguus adsit metus, ne vehementi illâ pressione dicta vasa lymphatica crepent, lymphaque uti non rarò contingit, intra duplicaturam peritonæi deponatur.

Quid mirum itaque, peritonæum hoc modo sacciforme reddi; continuo aquæ stillicidio, membranam unam ab altera recedere; externè musculos abdominis unà cum integumentis, internè verò viscera nimium comprimi, indeque maximas in œconomia animali excitari turbas, uti sequens historia testificatum dabit.

Anna



Anna K. quinquagenaria , aliquot liberorum mater , quadragesimo ætatis anno , post irregularem menstruorum fluxum , passionibus Hystericis graviter affici cœpit ; iisdemque vix liberata , de dolore & tensione in hypogastrio , cum umbilici prominentia , fuit conquesta. Malis hisce indies magis ac magis se extendentibus , quarto miseriarum suarum anno , de alio insuper , à priori distincto tumore , partes magis internas & uterinas occupante , multoties conqueri cœpit. Abdomen interea , præ singulari illa extensione , & ob umbilici prominentiam , pugni magnitudinem facilè superantem , monstrosæ jam magnitudinis conspiciebatur.

Hist-  
ria no-  
tabilis  
Hydro-  
pis Pe-  
ritonæi  
à lace-  
ris Lym-  
phaticis.

De continuis præterea lumbo-  
rum doloribus , non levium mole-  
stiarum suarum causis , non temerè  
conquerebatur , uti per excretio-  
nem multorum , diversæ magnitu-  
dinis , calculorum satis fuit mani-  
festum. Et quamvis urgente siti , ut

plurimum multum biberet, non nisi parum tantum pallidiusculæ, nec sine magno sæpe dolore, excernebat urinæ.

Quadragesimo octavo ætatis anno, cessante jam evacuatione menstruâ, magnam coagulati sanguinis per uterum excrevit quantitatem; appetitus, siti auctâ, minuebatur, & respiratio per intervalla adeo ipsi fuit difficilis, ut sæpe, cervice erectâ, spiritum ducere fuerit coacta. Alimento demum omni, omnibus recusatis remediis, viribusque attritis, tandem miseram cum morte commutavit vitam.

In aperto cadavere, 1680. die 21. Januarii, sequentia observavimus, præsentè *Clarissimo, Experientissimo*, Doctore, D. E. *Edingio*.

Superiores corporis partes, thorax scil. caput, manusque macie pene consumptæ; pedes tamen notabiliter à naturali non declinabant statu, nisi quòd sinister dextro reperiretur distentior.

Para-

Paracentesi prope umbilicum institutâ , nonaginta & quinque eduximus aquæ libras , quam fluidam ubivis , & cerevisiæ Roterodamensi , quoad colorem , non dissimilem invenimus. De aliquali eandem participasse falsedine , conjicere licuit , ex particulis scintillantibus , superficiei aquæ innatantibus.

Factâ musculorum abdominis, macie ferè consumptorum & putrefactorum , cruciali incisione ; vitium nobis aliud , primâ fronte non apparuit , quàm in hydrope ascite observare solemus ; verùm in hepar inquirentes , attoniti stetimus , quia nullum omnino reperiébatur , adeoque novum morbi genus ibidem manifestatum iri. Pergebamus itaque in omenti , ut & intestinorum , mesenterii , pancreatis , lienis , renum , &c. inquisitione ; verùm nihil reperimus , ita ut unanimi consensu jurâssemus , nullum illorum viscerum adfuisse , imò ipsas partes ute-

rinas (notabili tumore pyriformi conspicuas, infantis primùm nati caput magnitudine suâ superantes) distinguere non potuimus. Harum namque partium tumor materiâ purulentâ summè distentus, adeò obscuram reddidit partium harum faciem externam, ut eo momento nihil distinctè dijudicari potuerit.

Dictis itaque partibus accuratio-  
re manu investigatis, cultri aciem  
profundiùs adegimus, & mox  
omnia, quæ antè latuerant, sese ma-  
nifestârunt viscera; peritonæum-  
que facciforme induisse figuram,  
intra cuius duplicaturam tanta a-  
quarum moles abscondita fuerat,  
observatum; internamque mem-  
branam ab externa secessisse, & ad-  
eò incrassatam fuisse, ut altera tan-  
tùm Peritonæi lamina naturalem  
hujus membranæ constitutionem  
triplo quadruplove crassitie suâ  
superaret, & cavitatem suâ accura-  
tissimè aquam extravasatam serva-  
ret,



ret, ut ne guttula quidem abdominis viscera irroraret.

Separatâ etiam interiore Peritonæi membranâ, advertebamus, ne minimam quidem adesse omenti portionem, sed intestina flaccida, vacua & (aquæ pressione) invicem quasi contracta, serie tamen & ordine solito occurrere. Uterus, cujus tubis alisque vesiculæ quædam exiguæ, aquâ lymphidâ plenæ, adhærebant, cujusque ovaria varia exornabant ovula, solito se habebat modo.

Ren dexter flaccidus & ferè consumptus, sinister verò laudabilioris apparebat aspectûs, cujus tamen canaliculis, in pelvim hiantibus, varii adhærebant, diversæ magnitudinis, calculi. Hepar naturalis constitutionis, ut & Lien; nisi quòd naturali minor conspiceretur, cui tamen, ut & plerisque abdominis visceribus adeò firmiter adhærebat interior Peritonæi membrana, ut non nisi summa cum mo-

lestia ab iisdem avelli posset.

Ut reliqua, Morbi hujus historiam spectantia, præteream, & ea tantum, quæ Peritonæi Hydropem concernunt, proferam; haud abs re futurum putavi, si probavero morbum hunc adeò rarum non esse, sed frequentius quidem in praxi occurrere, licet omnes tam Veteres quam Neoterici, de vero hujus morbi fonte nec judicare, nec curam convenienti methodo instituerre potuerint. Frequentius autem morbum hunc occurrere, haud obscure ex Veterum Neotericorumque scriptis colligere possimus. Consule præprimis egregium p. m. Amstelodamensium Practicum & Virum Consularem *Nicolaum Tulpium*, qui sequentem nobis reliquit Historiam lib. iv. cap. XLIII.

Alix  
Histo-  
ria.

Jugitta, inquit, Pictoris uxor, cui venter ab ineunte ætate fuerat durus ac distentus, sentit eundem, mensstruis minus convenienter fluentibus, quotidie magis magisque ele-

elevari , paulatimque in eam excre-  
scere molem , ut contineret centum  
& decem aquæ libras , uti post  
ipsius obitum , omnium oculis ex-  
posuit anatome , verus Medicinæ  
oculus. Quod tamen exuberans  
aquarum pondus , sine magna cor-  
poris ac virium jactura , tam aptè  
septem plus minus annis , tulit mu-  
lier animosa ; ut potuerit perinde  
atque sanissima , non quocunque  
tantùm deambulare , verùm etiam  
peregrè proficisci , & quod mireris ,  
ascendere excelsam Clivensium  
turrim.

Dissecto verò cadavere , apparuit,  
omnem hanc aquarum congeriem  
delituisse inter duas Peritonæi tu-  
nicas , quæ induerant crassitiem di-  
giti annularis , sub quarum infima  
parte , conspiciebantur pleraque  
omnia viscera ut farta & tecta , sic  
etiam ab omni omnino incommo-  
do ac detrimento integra & tu-  
ta &c.

Similem Peritonæi Hydropem  
vidit.

vidit *Cl. G. Stratenius* Principi Arausionensi p. m. à Medicinis.

Viginti novem libras aquarum distentas reddidisse Peritonæum cujusdam virginis 20. annorum, post mortem inspectæ, testatur *Cl. Blasius* observ. Medic. part. 1. obs. 18.

Haud absimilem casum refert *Martinus Bogdanus* observ. Anatom. Chirurg. obs. 11.

Audi præterea *Marcellum Donatum* fol. 340. Quamvis, ait, Galenus proprium aquæ hydropis locum, cavitatem magnam abdominis internam statuat, nihilominus & intra Peritonæum & reliquas partes, inferiorem ventrem constituentes, aquæ portiones sæpe reperiri sectione comprobatum est. Et *Jacobus Camenicens*, Epistolâ ad *Andr. Mathiolum* lib. 5. Epist. refert de quodam, cui aqua inter tunicas Peritonæi adinventâ fuerit.

Denique *D. Helwigius* in Ephem.



phem. Germ. notat ; in cadavere cujusdam mulieris inter duplicaturam Peritonæi , aliquot mensuras feri foetentis repertas fuisse. Verum omnes cum præfato modo *Tulpio* incertam morbi causam pronuntiant , siquidem via , per quam lymphæ inter Peritonæi perveniat membranam , ipsos lateat : quum nobis luce meridianâ clarius appareat , à vasculis hisce lymphaticis laceris , hanc hydropis speciem originem traxisse , copiamque humoris lymphatici eructatam fuisse.

Insolitus hîc aquarum situs , cogitandi ansam dabit Eruditis , quid manus Chirurgicâ , in extrahendis hisce aquis , valeat ; & quale inde ægrotantes , percepturi sint emolumentum. De quibus propterea in hac hydropis specie longè tutiùs expeditiùsque paracentesin instituere licebit , quàm quidem in aliis hujus naturæ morbis , in quibus viscera naturaliter alioquîn disposita , ab irrorante & conspurcante hac aqua

An paracentesis hîc locum habeat?

ita

ita ordinariò vitiantur ; ut , extracta licet aquarum mole , nihilominus ferè semper moriantur ægrotantes ; in hoc verò casu , abdominis viscera illæsa manent , & planè libera à lymphæ hac extravasata , plerumque malè constituta.

Prudentioris itaque Medici erit , vigorem patientis considerare , qui si constans maneat , fluctuationem ferè nullam persentiat ægrotans , gratum & vividum faciei colorem si servet , exercitiis notabiliter non fatigetur , eo in casu encheiresi Chirurgicâ elicere licebit , quam saccus hic Peritonæi continet a-

Confir-  
matur  
exem-  
plo.

Quæ sequitur Historia , hocce confirmare videtur. Reverendi Pastoris conjugii , tumor adeo ingens in dextro inguine paulatim subnascitur , ut nec corpus erigere , nec progredi sine ligneo adminiculo posset. Vocatus in consilium , tumorem , præmissis universalibus , per debita linimenta & emplastra ,  
fatis

fatis diu applicata , resolvere tento ;  
cæterum dum eundem , neque di-  
scuti , neque emolliri , sed indies  
potius augmentum capere cerno ,  
ex tumoris figura circulari , & sup-  
pressis menstribus , malum profun-  
diùs delitescere , & quidem in ipsa  
uteri tuba persuasus , de Paracente-  
si cogito , & dum ægram operi fa-  
ventem intelligo ; Chirurgum lan-  
ceolam , in declivio rem tumoris  
partem , fatis profundè adigere ju-  
beo ; sed cùm nihil , nisi modicum  
sanguinis , efflueret , turundam lon-  
giusculam & duriusculam vulneri  
intrudere eidem præcipio , quam  
cùm eodem die iterum extraheret ,  
aqua limpida & inodora ex vul-  
nere cum impetu profilit , quæ dein-  
ceps ad plurium librarum mensu-  
ram per vices extracta , præter il-  
lam , quæ per vacua musculorum  
spatia in crus lateris affecti destil-  
laverat , illudque in immensum tu-  
morem substulerat , qui tamen fa-  
sciis lineis , phlegmate vitrioli con-  
sper-

spersis, cruri circumpositis, sæpiusque renovatis, intra paucos dies discussus est, vulnus ultra trimestre spatium apertum servatum, dein debitè clausum, matronaque optima integræ sanitati restituta, & post iterum imprægnata filiolarum sanam feliciter peperit. Hæc *Clarissimus Th. Bartholinus* habet tom. 1. act. med. p. 140. affectumque hunc ut Tubæ aut Ovarii Hydrophem considerat.

Nos judicaremus potiùs, Hydrophem fuisse Peritonæi; quod inciso tumore externo, unà cum tuba, aqua in cavum abdominis aliàs sese exonerâisset, & ita viscera ejus conspurcâisset, non sine præsentaneo periculo sanitatis. Si dicas coalitum fortè fuisse ovarium tubamque cum peritonæo; neque hoc probabile, quia nemo Anatomicorum (saltem quantum nobis constat) coalescentiam harum partium, hoc modo, unquam observavit. Et quod iterum fuerit imprægnata  
mulier,



mulier, illud ipsum probabiliter indicat, tubas cum ovariis non fuisse affectas. Præterea vulnus, per trimestre spatium, apertum sine noxa potuisse servari, incisis abdominis integumentis, cum musculis peritonæi & tubis, nemo facile mihi persuadebit.

Statuendum itaque, Hydropem fuisse Peritonæi, uti ex loco affecto & tumore circulari, qui se manifestabat, constat; prior autem sanguinis proventus à musculi obliquè ascendentis incisione facile deducitur. Lymphæ nihil, post primam incisionem, egrediebatur, quod latera membranæ peritonæi crassiora incisa, pressione muscutorum abdominis, adeo arctè fuerint unita, ut nihil aquæ exierit; verum, ab immissa turunda duriuscula & longiuscula, dilatatum vulnus magis patulum redditum, & hoc modo aquis exituris viam præbuit.

Haud absimilem Historiam Medicus mihi familiaris in scemina, se-

Aliud  
Exem-  
plum.

H ptem

ptem liberorum matre , notavit. Patiens , anno 1666. febre ardenti continuâ , haud parum fatigata , & jam penè ab eadem liberata , abdomen sibi sensim elevari , & ita extendi percipit , ut menstruo spatio , præ nimia aquarum mole , spiritum ducere vix ampliùs posset. In consilium vocatus medicus , post varia incassum tentata , paracentesin proponit , quam etiam lubenter admisit anhela patiens , & undecim dierum spatio , partitis vicibus , Methodo Barbettianâ , viginti quinque libras aquæ eduxit Chirurgus , præfente Medico.

Interea temporis non desinit patiens , ob prægressam febrim , admodum esse languida , liberaliùs licet respirans ; sed quæ nihil antè præstârant medicamenta , per os assumpta , ( factâ hâc operatione ) haud difficilè reliquam saburram , aut diuresi , aut catharsi expulerunt. Donec tandem feliciter restituta in publicum prodierit , ad munia ordina-

dinaria redierit , & ab illo tempore sanissima vixerit ; quo in statu & hodiè adhuc versatur , annum agens sexagesimum septimum.

Quæritur ; Quare uterum gerentes præ aliis magis obnoxia Peritonæi Hydropi sunt ? quod difficile conceptu non erit , si consideremus tempore graviditatis , musculos abdominis & peritonæum , mirum in modum ab utero extenso distendi , quâ occasione vascula Lymphatica Peritonæi comprimi necessum erit ; compressione illâ , motu lymphæ præpedito , lymphæ hoc modo pressa hydatidem format ; quæ tamen multum extendi nequit , ob partium circumjacentium renitentiam ; hinc crepant , lymphamque intra duplicaturam peritonæi deponunt.

Factâ jam paracentesi , earundem partium pressio , extremitatem vasis lymphatici , lympham eructantis , disrupti iterum comprimit ; vas læsum , fibris circumjacentibus sese contrahentibus , ulteriorem lymphæ

phæ egressum impedit ; & in curationis fundamentum consistere videtur. In Hydrope Ascite vero, si à vasculis lymphaticis disruptis orta, idem non contingit; vasculum enim semel ibidem disruptum & apertum difficillimè clauditur, quòd liber lymphæ exitus non impediatur; & hæc est ratio, cur adeo periculosus sit Hydrops Ascites, à disruptis vasculis lymphaticis ortus.

Aliquoties operationem in Ascite laborantibus institutam vidimus, sed ubivis eventu infelici. Hocque etiam omnes, quos novi, Practici experientissimi, & in arte sua Chirurghi versatissimi, uno ore testantur. Imò ingenuè mihi confessus est Chirurgus longè celebris, se sæpius quidem paracentesin abdominis, sed nunquam cum successu, instituisse.

Interim satius aliquando, anceps quàm nullum experiri remedium; quandoquidem non deficient histo-



riæ variæ , operationis successum confirmantes. Notabilior est casus, à *Clarissimo Pechlino* Observ. Medico-physic. obs. LXII. nuper propositus, quàm qui hîc locum non haberet. Inter alia, inquit, remedium genera & ausus periculosos, merito referam Rustici Cimbri temeritatem. Hic, cùm ab aliquot inde annis, Hydrope Anasarcâ, tandem & Ascite, laborâsset, mole aqualiculi planè monstrosi offensus, nihil non tentare decreverat, quo à malo tam incommodo & periculoso liberaretur. Igitur oblata à quovis pharmaca, dura quoque & vehementia, animosè hauriebat, neque ipsi Euphorbio parcens: quibus etsi ventrem subinde extenuâsset, redibat tamen identidem tumor, ventremque nova colluvies ampliabat. Accidit fortè, ut Chirurgus ibi vicinix haberet, quod ageret à Nobili viro evocatus, quo audito, cùm glebæ ejus adscriptus esset, impunè à se Chirurgi operam

Para-  
centesis  
feliciter  
institu-  
ta.

implorari posse putat; rogat igitur, & non tantum fatigat, velit desperato morbo consilio suo adesse, & vel ancipiti medelâ curationem experiri. Itaque Chirurgus quærit, quis ille esset morbus, & quamdiu hæssisset, tandem etiam quibus remediis esset vexatus? Ubi Rusticus tantum non omnia à se usurpata refert, ergo aliud exspectare, quamvis extremum, modò profuturum. Cui Chirurgus unum se ait famâ accepisse, sed crudele remedium, nunquam tamen à se vel visum aut factitatum; movet salivam Rustici experimenti novitas, & quæ demum illa esset medicina, diceret, precibus contendit. Narrat igitur Acum esse Argenteam, eamque acutam & excavatam, quæ non pertundere tantum ventrem, sed & fluentem excipere aquam possit, eâ tamen lege atque omine, ne simul & semel tota emittatur, ita enim repentinæ mortis inevitabile periculum esse. Ad hæc Rusticus

an-

animosior paratum se monet, qui  
sævæ manûs experimentum admit-  
tat. Ille autem negare statim, tan-  
tum sibi esse exercitationis, ut hoc,  
absque exemplo à se viso, audeat;  
deesse dein justa & necessaria in-  
strumenta, Acum & alia: videri  
etiam, aquas jam nimis diu hæsisse,  
visceraque fortè corrupta fanatio-  
nem respuere. Cùm igitur Chirur-  
gus se subtraheret operæ quæsitæ,  
& tamen mortem propediem adfu-  
turam crescentes aquæ indicarent;  
ipse Rusticus rem animo versans, &  
tantundem esse cogitans, quâ acie  
foramen paretur, urget Chirurgum  
monetque, dum moriendum sibi  
est, malle tamen se ante ancipitis  
remedii aleam experiri, quàm si-  
ne eo mortem oppetere. Anima-  
tus proposito Rustici Chirurgus,  
postridie ejus diei, novaculæ aciem  
in subsidium vocat. Signatumque  
locum lentè, &, quâ potest pruden-  
tiâ, pertundit. Sequitur protinus  
aqua, sed foetida quàm maximè, &

cum illa putida omenti frustilla. Exterritus novâ rei facie Chirurgus, digito, quantum potest, vulnus occludit, suadetque serò institutam operationem, penitus intermittendam. Instat tamen Rusticus, & inceptum opus abrumpi ægrè fert; suadet ergo vel suo periculo, aquis exitum procuret, cum quibus etiam sic corruptis vivere se posse negat. Sequitur consilium Rustici Chirurgus, fluentisque sed foetidi rivi cantharos quasi duos, jam etiam Vesiculis aliquot, fortè ab omento abrais, amphorâ excipit, jamque functus officio videbatur, cùm Rusticus plusculum emitti seriò rogat, & Chirurgus durissimi hominis, feri jacturam sine animi deliquio sustinentis, fortunam miratus facilè consentit. Ergo emittitur tertius cantharus, post quem nihil ampliùs, vel renitente Rustico, exire passus Chirurgus vulnus obligat, fatisque hominem permittit, ex foetore illo eventum



tristiore vicinamque mortem auguratus. Interim se cibis potuque vini erigit Rusticus, & ad novam missionem præparat; quod cum post triduum præstare se velle negat Chirurgus, tandem bonis verbis, certâque valetudinis melioris spe adigit: itaque referatur vulnus, duoque interim canthari extrahuntur, dum labascere Rusticus coepit, vinoque refici opus haberet. Verum & hæc præteriit tempestas, & identidem ad novas missiones Chirurgum impulit Rusticus, eâ fortunâ, ut evocatis cum tempore xv. cantharis, vulnus ex arte tractatum coalesceret, & folius Absinthii frequentato Decocto valetudinem & vires reciperet, certè levioribus operis rusticis pergendis sufficeret. Adeò, quos consilium non sanat, temeritas adjuvat.

Eventum haud minus felicem, anno superiori, observavit *Experientissimus Dusseldorpiensium Præ-*  
*H 5* *cticus,*

Alia  
historia  
paracen-  
tesios  
succes-  
sum con-  
firmans.

*eticus, D. Hofstad.* Uti Filius ejus paternarum virtutum dignissimus hæres, mihi retulit. Mulieri (ita loquitur Parens) cuidam, 22. circiter annorum, in Pago Homberg, Ducatus Montensis, sextâ, post primum foetum enixum, septimanâ, infimus venter sensim & sensim intumescere coepit: qui tumor, duorum mensium spatio, summo cum dolore & cruciatu, unde reliqua membra macie consumpta, cum pulsu frequentiori, febrim hecticam prognosticante, ita accrevit; ut consilium meum petierit. Satisfacturus quodammodò petitioni, præscripsi Cataplasma aliquod anodynum & emolliens, quamvis nullam restitutionis spem, sine sectione, superesse, marito ejus indicaverim. Hic propterea, octiduo elapso, cum dolores continuos tolerare patiens amplius non poterat, à me incisionis administrationem petiit.

In latere itaque dextro, prope umbi-

umbilicum , ( loco atramento priùs notato ) manu Chirurgi , & acie scalpelli ordinarii , operatione feliciter peractâ ; mox materiam liquidam , feri lactis crassiusculi instar , ad mensuram unam eduximus. Hinc , doloribus haud parum mitigatis , singulis diebus mensura circiter una , sed interpolatis vicibus , extracta. Hocque modo paucis diebus , decem circiter mensuræ , ex cavitate abdominis evacuatae , cum totali ventris subsidentia. Vulnus inflictum , per trimestre circiter , cannulâ plumbeâ ( qua materia adhuc superflua sensim exiret ) apertum servatum. Ita tandem convaleuit , & in perfecta sanitate adhuc superstes vitam degit.

Lympham , paracentesi , felici itidem successu fuisse extractam , notabili casu probat *Clarissimus Brunnerus* Eph. Germ. Dec. 2. , ann. VIII. Observ. c. Sed rarissimæ hæ sunt in terris aves. Neque propterea Practicis , potissimum junioribus , simili-

milibus in casibus, si famæ suæ consulere velint, operationem hanc temerè commendare licebit; ne experimento malè cedente, uti ferè semper solet, malè apud vulgus audiant.

Peritonæi Hydatides Ascitem mentionuntur aliquando.

Non tamen ubivis in hoc affectu crepant antè memorata lymphatica, sed notabilem aliquando, absque dilaceratione, ferunt distensionem, & in vesiculas aquâ limpida turgidulas, quas Hydatides vocant, attolluntur: & speciatim iis quidem vasorum lymphaticorum in partibus, quæ binas inter vasorum valvulas occurrunt: quia jam aqua nec prorsum propter obstructionem, nec retrorsum fluere potest, ob valvularum interceptionem, interstitia intumescunt in figuram orbicularem aut ovalem, quâlis in Hydatidibus vulgò cernitur.

História Hydatides mesenterii proponentes variæ.

De tali Hydrope Peritonæi vesiculari, mentionem facit *Solenand.* Consil. 15. ubi plures ducentis vesiculas, ovorum instar gallinaceorum,



rum , sed molli & putidâ aquâ repletas , eductas se vidisse affirmat.

*Laz. Riverius* Observ. commun. ultimâ , de tali Hydropico quodam hæc narrat. Rusticus quidam Hydropicus factus , abscessum passus est in dextra parte abdominis , eoque aperto infinitus propemodum vesicularum numerus egressus est , ut ducentarum numerum excederet , idque per plurium dierum spatium , & sic omnino curatus est.

Non ita pridem Experientissimus quidam Practicus , & amicus mihi familiarissimus , innumeris similibus vesiculis sive hydatidibus peritonæum obsessum vidit in cadavere cultro anatomico subjecto. Et qui plures hujus naturæ Casus legere cupit , Practicorum scripta consulere poterit. In quibus haud rarò occurrunt.

Ejusmodi autem Hydatides , non tantum generantur in parte Peritonæi

næi jam proposita , sed & in omnibus aliis , ubi Lymphatica Peritonæum percurrunt. Hinc Hydatides illæ facciformes redduntur , & non malè propterea *Cl. Merklinus* , Eph. Germ. Dec. 2. ann. VIII. obs. XXIII. hanc Hydropis speciem , *Asciten* vocat *Saccatum*. Uti peculiari Exemplo comprobatur ; stupendæ magnitudinis intumescentiam proponendo , cum interveniente partu felici. Mulier, inquit, bono aliàs corporis habitu prædita , jam ante hoc circiter quadrienium , de præternaturali totius abdominis , eâque inæquali intumescentiâ , conqueri cœpit ; hincque omnis generis salutaria medicamenta , cathartica , diuretica , &c. ad *Asciten* proficua , sed sine ullo levamine adhibuit. Tantùm namque abfuit , ut venter inde resederit , sed potiùs majus subinde sumperit incrementum. Quare suspicio de imprægnatione incidebat ; nec ea vana. Felici enim celerique par-

partu , omnium cum admiratione enititur prolem , optimè quoad omnia membra conformatum sanum atque vegetum , spe plenissimâ fore , ut jam abdomen , deposita in cunas sarcinâ , detumescat ; sed quæ iterum decollavit , quandoquidem inflatio illa , non solùm nihil quicquam à partu remisit , sed potius successu temporis , indies magis magisque stupendum in modum succrevit , cùm Fœminæ doloribus tensivis continuis. Quæ cùm immedicabili hoc malo , ultra integros quatuor annos laborâisset , accedente extremâ respirandi difficultate , obiit 26. Jun. 1689. Quo ipsoprehendimus , monstrosum hunc ventrem suo ambitu secundùm latitudinem tres integras ulnas complevisse ; factoque in eo foramine continuè mensuras octoginta octo , sive libras medicas ducentas sexaginta quatuor aquæ turbidæ , subcruentæ ac putrilaginosæ effluxisse , inaudito certè exemplo , & omnem faci-

facile fidem superante, ni varii, qui adfuerunt, & fide dignissimi viri, id mecum attestarentur.

Nunc quid monstri venter iste intus aluerit, paucis exponam; nempe eo cultelli vi aperto compertum, aquam illam ibidem contentam, peculiari sacco, sive utrius amplissimo inclusam fuisse, qui subtus Peritonæo adeò leviter adhæsit, ut ab eo digitis interpositis facili negotio separari potuerit; cætera superius sterno, inferius osse pubis & utroque latere vertebris lumbaribus ipsisque renibus per membranarum congressus tenaciter annexus; ut, ubi ortum sumpserit, liquidò sciri nequeat; nisi fortassis in dextro hypochondrio ideo credere velimus, quia ibi maximus, duosque pugnos magnitudine superans tumor, ex multis conglomeratis glandulis ac hydatidibus constans, quales etiam in eadem regione, plurimas limpidissimâ aquâ plenas vidimus, ex eodem utre succrevit.



crevit. Reliqua abdominis viscera maximam partem intaminata conspeximus.

Ejusmodi autem hydatides , non minus frequentes , aliquando sub vesica , & in illa Peritonæi parte , quæ ossis sacri tegit basin , conspiciuntur. Duæ enim , quæ ibidem occurrunt , Glandulæ novæ , quas *Sacras* voco , vasa à vicinis partibus admittunt & emittunt lymphatica , ab iisdem etiam partibus lympham accipientia , & in Glandulas , *Ilicas* dictas , deferentia , ut hâc viâ versùs cystin pergant chyliferam. Vide *Figur. xxxi.*

Lym-  
phatica  
Sacra  
quænam  
sint ?

Quid mirum itaque , Glandulas hæc , unâ cum Lymphaticis suis , à vesica urinaria , urinâ solito magis distentâ , comprimi , ansamque dare , cur necessariò lymphæ illa , in motu suo hoc modo præpedita , lymphaticorum latera ita expandat , ut vesiculas componat sacciformes ? Interim frequentius contingit , modò dicta vasa , lymphæ acrioris  
I motu ,

motu , dilacerari , lymphamque in abdominis cavum deponi.

Lym-  
phatica  
Meso-  
coli.

Eadem consideratio hîc locum habet in Lymphaticis Mesocoli, in quo propè Coli terminum, non longè ab intestino recto, duplex itidem occurrit Glandula , Lympham ab intestino colo excipiens , eandemque versùs viam , modò propositam , vehens : hoc tamen cum discrimine , quòd alterum vas lymphaticum Iliacam dextri , alterum Glandulam Iliacam sinistri lateris subeat ; uti eadem *Fig. xxxi.* suprà citata notabit.

## CAPUT DECIMUM.

### *De Peritonæi Diverticulis Novis.*

**N**ihil quidem vulgatius inter Medicos Practicos , quàm in Herniis , Intestinali vel Omentali, Peritonæi processus , ut vias nimium patulas , easque aut laceras aut relaxatas , quæ intestini aut omenti partem excipiunt , culpare : verùm  
sciant

fcient illi , ejusmodi processus , in  
 quadrupedibus , maribus quidem ,  
 nullatenus verò in sexu masculino  
 humano occurrere , omnesque in  
 hoc sexu hernias , quotquot mihi  
 examinare licuit , semper à violenta  
 Peritonæi extensione fuisse pro-  
 ductas , non verò à processibus di-  
 latatis , sed à corrugata Peritonæi  
 parte , in regione inguinali abdomi-  
 nis conspicua , lateraliter vasa sper-  
 matica (sub Peritonæo sita ) tan-  
 gente , & à prementibus intestinis ,  
 vel omento , sacciformem figuram  
 induente , magis minusve extensa ,  
 prout major minorve intestinorum  
 portio eandem premendo subeat ;  
 salvis manentibus vasis spermati-  
 cis , quæ intestina aut omentum  
 prolapsum non tangunt , nihilque  
 incommodi sentiunt , præterquam  
 quod à sacco Peritonæi formato  
 premantur , & ita circularem , hac  
 in parte , sanguinis motum turbent.  
 Quæ , datâ occasione , pluribus su-  
 mus descripturi.

Diver-  
 ticula à  
 Proces-  
 sibus  
 diversa.

Hernia  
Fœmi-  
narum  
Ingui-  
nalis  
unde ?

Hæcce , præter alias Herniarum Species , in utroque sexu obvias , auditoribus meis anno superiori demonstrandi , difficile visum fuit explicare , quâ *Herniæ fœminarum inguinales* orirentur ? Experimentiâ quidem jam aliquoties didiceram , à motu corporis animique vehementiore , graviditate , &c. non rarò , vel subitò , vel sensim ab intestinis aut omento illabentibus , inguen in tumorem attolli , idque sæpe non sine summo patientis discrimine. Sed in eo nostra fuit difficultas , quòd Peritonæum , hac in parte , nullâ viâ sit pervium , tendinosæque musculorum abdominis partes cedere nesciant omento aut intestinis prementibus.

Autho-  
rum in-  
certa  
opinio.

Primò quidem Authores quosdam Anatomicos & Chirurgicos consului , verùm tot inter eos inveni opiniones discrepantes , ut nihil certi ex illorum scriptis concludere licuerit. Eapropter manus operi applicavi , & in Subjecto , quod præman-



manibus habebam , Canino , utriusque cornu fimbriam inguina versùs extensam , Peritonæi aliquot foramen subingredi , observavi. Nesciens quid rei esset , tubulo in foramen immisso aërem infudi , statimque vesiculam quandam à Peritonæo oriundam , obliquè per abdominis tendinosas musculorum partes , versùs pubem extensam detexi. Hocque postmodum toties in uno & altero observavi latere , quoties canes foeminæ cultro Anatomico nostro fuère examinatae. Naturalem horum Diverticulorum formam & magnitudinem dabit *Fig. xxxix.*

Diver-  
ticula,  
in Ca-  
nibus  
Foemi-  
nis, No-  
va.

Capsulis hisce in brutis jam detectis , summâ curâ laboravi , ut in cadaveribus foemineis humanis eadem invenirem , neque etiam convenientissima defuit occasio diverticulum ( eodem modo , ut in brutis à Peritonæo oriundum ) in utroque latere detegendi. Distinctè enim observavi , ligamenta rotunda , ab uteri fundo ortum ducen-

Eadem.  
in Hu-  
mano  
Subje-  
cto in-  
venta.

tia, ad inguina ascendere, foramen quoddam subingredi, firmiterque lateri hujus foraminis, ut & totius Diverticuli annecti. Ex cujus præterea fundo pars prædicti ligamenti exiens, obliquè per tendines musculorum extenditur, & supra pubis ossa in fibrillas divisa, prope clytoridem evanescebat.

Diver-  
ticulo-  
rum va-  
sa unde

Et licet Diverticulum hocce continuam cum Peritonæo componat membranam, non tamen ab eodem sua fortitur vasa sanguinea; sed à prædicto ligamento, numerosissimis vasculis sanguineis donato, subtiliores prodeunt ramificationes, quaquaversum per dictum Diverticulum dispersæ; uti manifestè constabit, si quis tincturam coloratam in vas ligamenti sanguineum injecerit, statim Diverticuli membranam de eadem participare observabit.

Diver-  
ticulo-  
rum  
Forma  
qualis?

Capsularum harum Formas quod spectat; non ubivis æqualiter eadem extensas invenimus, sed earum-

rumdem orificia, quæ ligamenta ingrediuntur, arctiora esse, & cum calami scriptorii ostio ferè convenientia; capsulas verò ipsas paulò ampliores, & digiti minimi apicem non rarò admittentes, observavimus. Uti ex *Figur. XL.* manifestum.

Et hinc ratio peti potest, cur intestinum, semel in hocce Diverticulum illapsum, difficile adeo iterum egrediatur, sed laqueo quasi constrictum, intestino inflammationem, gangrænam & patienti mortem inducat.

Aliquando tamen, temporis tractu, in quibusdam sensim & sensim adeo extenditur Diverticuli non tantum orificium, sed & capsula ipsa, ut mulieres sine notabili incommodo herniâ inguinali laborantes, tumorem inguinalem premendo, intestinum prolapsum expellant ex diverticulo in abdominis cavitatem: sed brevi post, potissimum si vehementiori exercitio corpora sua solito magis moveant, de

Diverticulorum extensio nimia.

novo in eundem affectum incidant. Ex improvise tamen easdem malè aliquando affici observavi, præsertim plebejas, dum aëri frigido diutius sese exponentes, & laboribus gravioribus, idque sub dio, intentæ, intestinum persentiant dolorificum, ob sanguinem, aëris injuriis magis incrassatum, intestinumque inflammatum; quod amplius quidem requirebat diverticuli orificium, sed frigore jam magis contractum, molestissima solet causari symptomata, imò mortem ipsam, ni citissimè manus chirurgica opem ferat.

Diverticulum cum intestini ilei parte aliquando connascitur.

Speciatim verò illud locum habet in iis, in quibus intestini prolapsi membrana exterior cum dicti orificii margine connascitur; tum enim intestinum, hac in parte, excrementis fortè repletum, si à motu nimio, aëre frigido, aliisve inflammetur, actum ferè semper erit de patientis vita; manuum namque opificio nihil præstabit Chirurgus.



rurgus, licet in arte versatissimus.

Rei hujus veritatem confirma- Obser-  
vatio  
notan-  
da.  
tam dabit Historia notabilis. Mu-  
lier quadragenaria, jam ab aliquot  
annis herniâ laborans inguinali, di-  
versisque temporibus magis minuf-  
ve affecta, tandem (nescio qua de  
causa) gravius se affici, tumoremque  
magis elevatum & dolorificum per-  
sentit. Præscriptis fomentationi-  
bus, Cataplasmatibus, aliisque ex-  
ternis, quum non tantum nil levami-  
nis sentiret, sed continuo majores  
perciperet dolores, accedentibus fe-  
bri continuâ, convulsionibus & vo-  
mitu, quatrimum intra exspiravit.

Inspecturi cadaver unâ cum Cl.  
Viro, Domino *Petro Cossion, Pra-  
ctico* hujus Civitatis *Experientis-  
simo*, periculum facere volumus,  
utrum intestinum prolapsum, hoc  
in casu artificiosâ manuum operâ  
posset restitui. Factâ itaque cutis  
leviore incisione (lentè enim &  
prudenter procedendi erat animus)  
statim, quasi cum impetu, excre-

menta prorupère, vestimenta adstantium conspurcantia. Mirabamur *primò*, tenuitatem summam cutis, reliquorumque integumentorum; simul enim juncta, ipsâ cute naturaliter dispositâ, erant tenuiora & ab excrementis latitantibus maximo-pere tensa. *Secundò*; cur excrementa hæc adeò liquida, non potuerint repelli versùs reliqua abdominis intestina, & hoc modo patienti levamen adferre. Sed re propiùs examinatâ, notavimus diverticuli orificium constrinxisse, laqueo quasi, intestinum prolapsum, partemque hanc intestini inflammata, firmiter adeò, cùm dicto orificio fuisse connatam, ut sine dilaceratione ab eodem separare non potuerimus.

Cauti itaque sint similibus in casibus Chirurghi audaculi, ne reponere cupientes intestinum prolapsum, inviti videant vulnus inflictum excrementa evomere, non sine præsentaneo patientis periculo, & maxima Chirurghi infamia.

ANTONII NUCK,


D E

# INVENTIS NOVIS, EPISTOLA ANATOMICA.

A D

D. D. B. G. Med. Doct.

*Anatomes & Philosophiæ Cultorem  
Egregium.*

 I unquam verum, Senecæ illud effatum; Multum quidem egerunt, qui ante nos fuerunt, sed multum adhuc restat operis, restabitque multum. Nuspiam manifestum magis, quàm in Studio Anatomico; quàm enim latè illud se extendat, nulli re-

rectiùs notum, quàm qui operâ sedulâ manus applicat operi; singulatim verò Tibi, in Anatomicis adeò defudanti, ut nocturnâ pariter ac diurnâ Anatomem pertractare soleas manu. Vehementer interea doleo, unitis viribus Microcosmi contextum inspicere amplius licitum nobis non esse, & ut antè solebamus, inventa nostra, certissimo experimentorum eventu, confirmare. Absentiam vestram eò dolui magis, quòd tales inter vitam agere necesse habeas, qui non rarò in Nova Inventa acriter insurgere, aut eadem irrifui habere solent, nihilque recti qui putant, nisi quod ipsi faciant: sed æquo ferendum est animo, quod corrigi non potest: non, si malè nunc, & olim sic erit.

Expetis, quid ultimis hisce mensibus egerim, quæ Nova detexerim, & quibus potissimùm fuerim occupatus. Petitioni tuæ æquissimæ ut fiat satis, breviter enarrabo, quî Microcosmi Rivulos Aquosos, Lym-



Lymphaticos intelligo , labore & studio prosequar indefesso , quî Mercurius noster eadem aggredia-  
tur , vix partem relinquat intactam ,  
& accuratè adeò ob oculos ponat ,  
ut Anatomici , etiam Recentiores ,  
parum aut nihil hac in re præstitisse  
videantur.

Ut à *partibus Capitis externis*  
incipiam ; varios aliquando notavi  
canaliculos lymphaticos sub cute  
genas exornantes , & rectà ponè au-  
res in Glandulas Muscosas lym-  
pham suam evomentes , ut inde in  
lymphatica jugularia , & sic porrò  
in subclaviam unam & alteram lym-  
pham deponant.

*Capitis Collique* postica suis su-  
perbire lymphaticis , Glandulæ  
Novæ sub occipitis & cervicis cu-  
te delitescentes ( quasque propterea  
*Occipitales* & *Cervicales* voco  
Glandulas ) distinctè demonstra-  
bunt.

*Pulmonalem Tunicam* , stupendo  
planè modo Lymphaticis obsessam  
obser-

observavi; hæc verò, variis compositis infulis anastomosibusque, ductum respiciunt thoracicum, quemque etiam, glandulæ unius atque alterius interventu, ingrediuntur.

Neque suis destituuntur lymphaticis spatia *intercostalia*, metam tamen eandem, quam pulmonalia, non attingentibus, sed semper ferè, intermediis glandulis, lympham in jugulares venas deponentibus. Vascula hæc, occasione aliâ, *Lymphatica Thoracica* vocabo.

Præter hæc & alia in thorace occurrunt lymphatica, musculosæ lumborum regioni incumbentia, saccum chyli ferum (in quem, sed intermediâ iterum glandulâ, lympham evomunt) respicientia; & *Lymphaticorum Lumbalium* nomine venientia,

*Diaphragmatis* pars convexa plurimos emittit ductus lymphaticos, qui coeuntes simplicem & aliquando duplicem in quovis latere componunt ramum ascendentem,

tem , & sub ſterni musculo triangulari extenſi , Glandulas ſubingrediuntur ad ſuprema ſterni locatas , ut inde in eandem venam jugularem , lympham ſuam exſpuant.

*Cordis* ſuperficiem externam jam dudum frequenti Lymphaticorum numero ſtipatam vidi ; vaſculaque minora , ex tunica Cor ambiente prodeuntia , ductus componere majusculos vidi : quorum alios ſub auricula dextra , alios principium arteriæ magnæ lateraliter tangere , & in itinere , glandulâ unâ aut alterâ ſalutatâ , venas ſubingredi , aut ſubclavias , aut jugulares , aliquoties obſervavi. Hæcque Lymphatica non tantum in parte Cordis antica , ſed & poſtica , quæ dorſum reſpicit , conſpiciuntur ; illam *Fig. XLI.* delineatam vides , hanc verò aliâ occaſione lubens tecum communicabo.

Lymphaticorum *Lienalium* numerus in ſubjectis humanis rarus admodum occurrit , & , ſingulari  
licet

licet adhibitâ diligentîâ , nonnifi vasculum unum aut alterum invenire potui. In brutis verò nonnullis numerosissima occurrunt , speciatim in Liene vitulino aut bovino , in quibus aliquot centena inquirenti haud difficilè obveniunt: quæ tamen , compositis tribus quatuorve ductibus interjectâ glandulâ unâ aut alterâ , chyli vesiculam ingrediuntur.

Utraque *Hepatis* superficies, tam concava, quàm convexa, tot exornata conspicitur Ductibus Lymphaticis, ut visum penè fugiant, & in tali, quam servo, parte convexa ad minimum trecentos numerare possim. Qui partis convexæ sunt Lymphæ ductus , prope ligamentum suspensorium uniti, decem vel duodecim ramificationibus illud perreptant , lymphamque suam versùs chyli cystin amandant. Quæ verò partis convexæ sunt , eadem variis ductibus , ex hepatis interioribus prodeuntibus , venam exornant



nant portæ, unde in Glandulas terminantur Muscosas, ut illarum interventu facilius eandem chyli cystin subingrediantur.

*Vesicam felleam* itidem aliquot ramulis lymphaticis ornatam videmus, eandem viam (quam modo proposita ex concava hepatis) eligentibus. Hæcce iterum, intermediâ glandulâ exiguâ, ad latus colli vesicæ locatâ, cum præcedentibus anastomosibus junctis, eundem cursum sibi servant.

Non tamen eadem Lymphatica ex Cysti Fellea ipsa prodeunt, sed ex hepate. Cysti illa incumbere tantum vel ex eo manifestum: quod, compressis & ita evacuatis cysticis lymphaticis, postmodum lymphæ iterum non repleantur, nisi hepar ipsum prematur, ex quo statim lymphæ prodiens *Lymphatica Cystica* ingreditur, eademque turgidula reddit.

Ex *Ventriculi* parte superiori, jam aliquoties oriunda vidi Lymphæ  
K pha-

phatica , lympham suam tribus quatuorve Glandulis minoribus (medio loco inter orificium superius & inferius locatis) tradentia, ut ex iisdem, aut in Ductum Thoracicum , aut in Saccum Chyliferum transferatur. Ventriculi fundum non minori glandularum numero obsitum vidi, quarum tamen rivulos aquosos hactenus nondum de- tegere potui, licet nullatenus dubitem , quin , ut modo proposita, lympham à fundi ventriculi parti- bus acceptam , in chyli capsulam exspuant.

*Mesenterium* etiam suos habet Lymphæ Ductus, eandem ferè fa- bricam, ac vasa lactea, componen- tes; hi à partibus intestinorum membranaceis oriundi , lympham primò in glandulas aliquot mesen- terii , & mox in chyli receptacu- lum deponunt. Verùm aliquoties notavi, vasa mesenterii lactea, non tantùm chylo, sed & cum eo lym- phæ transitum præbere, imò peractâ chy-

chylicatione , chyloque jam in sanguinem advecto , humori lymphatico tantum eadem patere ; namque præterquam , quod lympham aliquoties in lacteis viderimus , etiam conceptu difficile non erit , si succi pancreatici portionem majorem , nec non in intestinorum glandulis lympham secretam , alias vias , præter has , nusquam invenire , per quas ductui thoracico , & ita sanguini , accedere posset.

Ex *Testium* tunica albuginea numerosi adeo prodeunt Lymphæ Ductus , ut numerum facile superent quadragenarium ; quorum plurimi , ubi testiculum relinquunt , in tres , quatuor aut quinque ramos , vasa spermatica concomitantes , abeunt , lympham suam in Chyli Saccum deponentes. Ab eadem insuper tunica prodeunt , qui vas componunt lymphaticum peculiare , vas deferens eo usque associans , donec prope ureterem , facto flexu , dictum vas deferens linquat , &

versus ureterem ascendendo , eundem non longè à renibus iterum deferens , lympham suam in saccum chyliiferum etiam deponat.

*Pedes* , imò quilibet eorum digitus , sua obtinent Lymphatica , quæ , compositis duabus , tribus , quatuorve ramificationibus , variisque insulis , rectà fursum tendunt , vasa venosa , sub integumentis associantia. Hæc porro , salutatis in itinere glandulis aliquot muscosis , glandes subintrant Iliacas , ex quibus porro in chyli saccum , uti in Anatome uteri monstravimus , cursum absolvunt.

Eodem ferè modo *Manus* sese habent , ex quarum digitis lymphatica prodeuntia , ramos componunt , variis insulis conspicuos , sub cute extensos , lymphamque , intermediâ tamen glandulâ , in venam subclaviam exspuentes.

Ita ut multiplici experientiâ , & variis partium præparationibus , eò usque pervenerim ; ut *integrum*  
*Lym-*



*Lymphaticorum Systema* à capite ad calcem mihi composuerim , cujus delineationem libenter tecum communicabo , ubi partium nonnullarum hætenus nondum fatis examinatarum , Lymphographiam absolverimus.

Sed rogare videris ; *utrum in cerebro etiam Vasa occurrant Lymphatica ?* Quamvis ex Recentioribus , nonnulli in eorum descriptione fatis liberales , eadem concedant , & facilè admittant ; verùm , quod passim observo , systemata in proprio cerebro formant , & viscera ex suo placito componunt : ad experimenta enim provocati , nil egregii præstare valent. Nunquam , hac in parte , ut ingenuè loquar , hætenus scopum attingere potui. Interim non negandum censeo , aliquando cerebri lymphatica in una aut altera parte fuisse visa ; & non ita pridem , Anatomicus quidam mihi amicissimus , inter alia inventa , hæc nobiscum communicat. *Vidi* , in-

K 3 quit,

quit , *lymphaticum in cerebro bovino* , quod examine tuo ( ut originem scias & insertionem ) erit dignissimum. Non longè à glandula pineali , à qua ramos fortè habet , incumbit plexui choroidæo , ad infundibuli latera sese extendens. Ante biennium ductum lymphaticum ex Pini Glandula , eodem modo , ut in aliis glandulis , exeuntem vidi. Ita ut quidem certissimum , & cerebrum suos habere rivulos aquosos , sed nondum distinctè in lucem protractos.

Quod Glandulam spectat , *Pinealem* vulgò dictam , eadem non semper pyriformis mihi occurrit , aliquando enim oblongior est , non raro ad ovalem , & sæpe ad sphaericam accedit figuram.

Eandem hanc Glandulam , dubio procul , putidam nobiscum vidisti , & penè consumptam , aliquando partibus lateralibus firmiter annexam , nervis exiguis aut adeo tenuibus donatam , ut visum plerumque

que fugiant. Nihil dicam de materia viscosa tenaci, glandulæ hujus superficiem non rarò tegente; nec non calculis, toties in eadem reperi-  
tis, quibus Glandulæ mobilitas (si mobilis unquam) fuit sublata. Im-  
memor esse non potes, quî semel eandem totam calculosam, & qua-  
tuordecim, diversæ magnitudinis & formæ, calculis imò duriusculis, obsessam viderim, & multis curio-  
sis demonstraverim, quemadmo-  
dum & hodie adhuc, cuivis peten-  
ti eosdem examinandos concedo. Interim, quod forsan mirabere, pa-  
tientes ejusmodi, dum viverent, non minus ingeniosos observavi, ac alios, quorum Glandula natu-  
raliter erat disposita. Et quid mi-  
rum; Glandulam, hanc, ut reliquæ, eodem modo, malè interdum af-  
fici?

Quod statuant nervosum genus Glandulam Pinealem respicere, fal-  
sissimum illud esse, experimentis constat: imò plus cum eadem com-

mercii non habet , quàm cum Glandula Pituitaria.

Rogas denique , quid de spirituum promptuario , ut Communi Sensorio sentiam ? Illud quidem nullibi distinctiùs mihi , quàm in centro ovali , occurrit , ibi enim omnium ferè nervorum est concursus , quorumque sanguinis particulæ subtilissimæ , in corticali cerebri substantia separatæ amandantur ; ut inde continuò , per infinitos nervulorum fasciculos ( qui numerosissimi in corporibus striatis occurrunt ) nervos ipsos ingrediantur.

Hisce itaque positis , quid de Pini Glandula , quam multi Sensorium Commune volunt , sit sentiendum , acuto Tuo relinquo judicio : me quod spectat , jam dudum constanter affirmavi , Glandulam hanc præ reliquis prærogativam nullam habere , & summo propterea jure exequias ejus esse canendas , cum inscriptione quadam , pro Epitaphio inserviente ; hoc modo.

VIA-



# VIATOR.

*Gradum. Siste.*

*Omni que. Conatu. Conarium.*

*Respice. sepultum.*

*Partem. Tui. Corporis. Primam.*

*Ut. Olim. Volebant.*

*Anima. Primam.*

*GLANDULAM. PINEALEM.*

*Hoc. Seculo. Natam. Et. Extinctam.*

*Cujus. Majestatem. Splendoremque.*

*Fama. Firmarat.*

*Opinio. Conservarat.*

*Tamdiu. Vixit.*

*Donec. Divina. Particula. Aura.*

*Avolaverit. Tota.*

*Lymphaque. Limpida.*

*Locum. Suppleret.*

*Abi. Sine. Glande. Viator.*

*Lymphamque. Ut. Aliis. Conario. Concede.*

*Ne. tuam. Posteris.*

*Mirentur. Ignorantiam.*



Fig. I. fol. 15.




Fig. II. fol. 15.




Fig. III. f. 23.




Fig. IV. f. 23.





Fig. V. f. 23.







# FIGURARUM EXPLICATIO.

Figur. I.

Tubulum Lactiferum exhibet  
ex Cane.

- A A. *Mammæ caninæ portio.*  
b. b. b. *Varia corpuscula glandosa, ex  
quibus*  
c. c. c. c. *Tubulorum Lactiferorum ortus.*  
D. D. *Truncus.*  
E. E. *Papilla incisa, ut*  
F. *Trunci terminus videri posset.*

Fig. II.

Mammæ Fœminæ partem  
delineat.

- A. A. *Mammæ pars.*  
B. B. *Cutis incisa.*  
C. C. C. *Glandosa mammæ substantia.*  
d. d. d. d. *Tubulorum Lactiferorum ca-  
pillaria.*  
E. E. E. *Tres eorum trunci.*  
F. F. *Tubulorum inter se anastomoses.*  
G. *Papilla variis foraminibus per-  
tusa.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. III. IV. & V.

Papillas diversimodè perforatas  
demonstrant.


- A. *Papilla sex foraminibus pervia.*
- B. *Alia novem ductibus perforata.*
- C. *Tertia septem poris pertusa.*

Fig. VI.


Papillæ fibrosam texturam  
repræsentat.

- A. *Papillæ lamina resecta.*
- B. *Fibrosa ejus structura, quatenus oculo nudo inspicienti occurrit.*

*Fig. VI. f. 24.*




*Fig. VII. f. 24.*



*Fig. VIII. f. 24.*



*Fig. IX. f. 32.*







# Figurarum Explicatio.

Fig. VII. & VIII.

Papillam microscopio examinam notat.

- A. *Papillæ lamina duplici fibrarum genere instructa.*
- B. *Fibræ majores minoribus hîc destitutæ.*
- C. *Fibræ minores majorum lateribus firmiter annexæ.*
- D. *Altera papillæ lamina, partim fibris majoribus, partim minoribus, distinctè hîc conspicua.*

Fig. IX.

Vasa Lactea ex Subjecto Humano monstrat.

- A. A. *Intestini jejuni portio.*
- B. *Ramus arteriæ mesentericæ superioris.*
- c. c. c. *Vasa lactea nodulis suis conspicua.*
- d. *Vasorum lacteorum insula.*
- E. *Glandula mesenterii chylum ex dictis vasis recipiens.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. x. xi. & xii.

Glandulas diversimodè figuratas  
unà cum suis Vasis Lymphaticis  
Inferentibus exprimunt.


- A. *Glandula oblonga cum simplici vase inferente lymphatico.*
- B. *Alia, formæ ferè quadrangularis cum tripilici vase adferente lymphatico.*
- C. *Tertia, superficiei inæqualis, sex septemve ductibus lymphaticis inferentibus donata.*

Fig. xiii. & xiv.


Glandularum fibrosam texturam  
proponunt.

- A. *Lamella glandulæ fibrosæ, oculo nudo inspecta.*
- B. *Eadem particula microscopio examinata.*


*Fig. X. f. 35.*




*Fig. XI. f. 35.*




*Fig. XIII. f. 37.*



*Fig. XII. f. 35.*



*Fig. XIV. f. 37*







*Fig. XV. f. 39.*




*Fig. XVI. f. 39.*



*Fig. XVII. f. 39.*




*Fig. XIX. f. 42.*




*Fig. XVIII. f. 40.*




*Fig. XX. f. 43.*




*Fig. XXI. f. 43.*




*Fig. XXII. f. 44.*



*Fig. XXIII. f. 44.*





# Figurarum Explicatio.

Fig. xv. xvi. & xvii.

Glandulas lapideas delineatas  
offerunt.

- A. *Glandula angulosa in lapideam substantiam conversa.*
- B. *Alia, formæ incertæ, superficiem tuberosam distinctè exprimens.*
- C. *Tertia, itidem naturæ calculosæ & tartareæ, minus tamen dura.*

Fig. xviii.

Glandulæ arteriolas delineatas  
exhibet.

- A. *Arteriæ Truncus.*
- B. *Ramificationes arteriolarum variæ per glandulam dispersæ.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. XIX.

**Membranulam vas lymphaticum**  
componentem ostendit, microscopio inspectam.

- A. A. *Vasis lymphatici membrana.*  
b. b. b. *Globuli exigui hinc illinc per  
membranam dispersi.*  
c. c. c. *Fibræ sive striæ exiguæ vasculorum  
formam imitantes.*

Fig. XX. & XXI.

**Ductûs Thoracici tunicas**, vitro inspectas, oculis subjiciunt.

- A. *Exterior Ductûs Thoracici tunica  
globulis majoribus, racematim inter se  
junctis.*  
B. *Interior tunica similibus globulis  
sed minoribus conspicua.*



# Figurarum Explicatio.

Fig. XXII. & XXIII.

Lymphaticorum valvulæ, oculo armato inspectæ repræsentantur.

A. *Valvula semilunaris cum suis fibris & corpusculis orbicularibus.*

B. *Altera, priori opposita, ejusdem naturæ & constitutionis.*

Fig. XXIV. & XXV.

Ductûs Thoracici valvulas exponunt microscopio visas.

A. *Valvula Ductûs Thoracici, cum lymphaticorum valvulis conveniens, excepto, quòd corpuscula orbicularia non ita hîc appareant.*

B. *Ejusdem Ductûs alia valvula, fibris variis, constrictioni dicatis, conspicua.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. xxvi. xxvii. & xxviii.

Duûm generum lymphatica  
demonstrant.

- A. *Glandula.*
- B. *Lymphatica adducentia.*
- C. *Lymphatica abducentia.*
- D. *Alia glandula.*
- E. *Vas ejus lymphaticum adducens.*
- F. *Surculi adducentes.*
- G. *Lymphaticum glandulæ incumbens.*
- H. *Surculi abducentes.*
- I. *Lymphaticum abducens.*
- K. *Tertia glandula.*
- L. *Lymphaticum adducens.*
- M. *Ramificationes variæ adducentes.*
- N. *Ramificationes variæ abducentes.*
- O. *Truncus easdem excipiens.*

Fig. XXIV. f. 45.




Fig. XXV. f. 45.



Fig. XXVIII. f. 48.



Fig. XXVI. f. 46.




Fig. XXIX. f. 40.



Fig. XXVII. f. 48.







# Figurarum Explicatio.

Fig. xxix.

Trium generum lymphatica  
exhibet.

- A. *Glandula.*
- B. *Lymphatica adducentia.*
- C. *Alia adducentia.*
- D. *Lymphatica abducentia.*

Fig. xxx.

Lymphaticorum in glandulas  
infectionem variam ob oculos  
ponit.

- A. A. *Glandulæ.*
- B. B. B. *Lymphatica minora inferentia.*
- C. C. *Lymphaticum simplex, sed majus, efferens.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. xxxi.

Lymphatica Renum, &c. repræsentat ex subiecto canino.

- A. A. *Renes.*
- B. *Vena cava.*
- D. D. *Venæ iliacæ.*
- E. E. *Saccus chyliferus.*
- F. *Ductûs thoracici principium.*
- G. G. *Glandulæ iliacæ.*
- H. H. *Glandulæ cavæ.*
- I. I. *Glandulæ mesocoli.*
- K. *Lymphatica renalia superiora externa, dextrilateris, post venam emulgentem descendente, in lymphaticum cavæ L. inserta.*
- L. L. L. L. *Lymphatica cavæ.*
- M. *Lymphatica renalia inferiora externa, dextrilateris, in sulis donata, in glandulam cavæ H. & inde in lymphaticum cavæ L. implantata.*
- N. N. *Lymphatica renalia interna, lympham in chyli saccum eructantia.*

O. O.

Fig. XXX. f. 50.





Fig. XXXI. f. 60. & 63.







# Figurarum Explicatio.

O. O. *Lymphatica renalia superiora externa sinistri lateris, lympham, intermediâ glandulâ P. in saccum chyli deponentia.*

Q. Q. *Vasa lymphatica glandularum Mesocoli, quorum alterum in glandulam iliacam G. alterum in lymphaticum cavæ lympham suam propellit.*

R. R. *Lymphatica peritonæi, venis musculis superioribus inhærentia, lympham suam in glandulas iliacas, & hinc, per lymphatica cavæ, in chyli cisternam ducentia.*

S. S. *Alia peritonæi lymphatica in glandulas T. T. (quas sacras voco) inserta, quæ itidem ut jam citata, per lymphatica sacra lympham suam in glandulas iliacas, & sic porro ad chyli vesicam deferunt.*

T. T. *Glandulæ sacre.*

V. V. *Lymphatica sacra.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. xxxii.


Uterum foemineum (sed facie inversâ ) unâ cum lymphæ ductibus depingit.

- A. *Vena cava.*
- B. *Arteria magna.*
- C. C. *Venæ emulgentes.*
- D. D. *Arteriæ emulgentes.*
- E. E. *Venæ spermaticæ resectæ.*
- e. e. *Arteriæ spermaticæ resectæ.*
- F. F. *Renes.*
- G. G. *Vasa lymphatica renum externa & superiora, intermediis glandulis, in chyli cisternam H. tendentia.*
- I. *Ductus thoracici principium hic resectum.*
- K. K. K. *Glandulæ exiguae vasis lymphaticis renum transitum præbentes.*
- L. L. L. L. *Vasa lymphatica renum externa & inferiora, mediis glandulis K. K. in chyli cystin terminantia.*

m. m. m. m.



Fig. XXXII. figo. & 72.









# Figurarum Explicatio.

m.m.m.m. *Utriusque lateris vasa lymphatica renum interna, interjectis glandulis, itidem lympham suam in chyli sacculum deponentia.*

N.N.N.N. *Ureteres.*

O.O. *Venæ iliacæ.*

p.p. *Arteriæ iliacæ.*

Q.Q.Q.Q. *Glandulæ iliacæ, lympham ab extremis pedibus excipientes, & per vasa lymphatica cavæ & aortæ adsita in chyli vesicam ducentia.*

R. *Lymphaticum cavæ.*

S. *Lymphaticum aortæ.*

T.T.T.T. *Vasa lymphatica spermatica, utriusque ovarii lympham vehentia in chyli sacculum.*

V.V. *Vasa spermatica sanguifera hic resecta, ut eò distinctius lymphatica conspectui se darent.*

w.w. *Ovaria variæ magnitudinis ovulis conspicua.*

x. x. *Ovula.*


y. y. *Ornamentum foliaceum.*

z. z. *Tubæ Fallopiæ.*

# Figurarum Explicatio.

1. 1. *Uterus.*
2. *Fundi uterini portio resecta, utero adhuc adhærens, ut uteri cavum*  
3. *conspici posset.*
3. *Uteri cavitas.*
4. 4. *Ligamenta uteri rotunda.*
5. *Uteri osculum externum.*
6. 6. *Vagina incisa.*
7. *Vagina integra.*
8. 8. *Arteriæ hypogastricæ, uterum partesque vicinas serpentinis suis vasculis egregiè exornantes.*
9. 9. *Vesica urinaria post vaginam hic locata.*
10. 10. *Labia pudendi.*
11. *Clytoris.*
12. 12 *Nymphæ.*
13. *Meatus urinarius.*
14. *Membrana Hymen.*
15. *Vaginæ ostium.*

*Fig. XXXIII. f. 75.*







# Figurarum Explicatio.

Fig. XXXIII.

## Uteri Lymphatica examinans ex subiecto bovino.

- A. A. *Uterus.*  
B. B. *Cornua ejus.*  
c. c. *Tubæ.*  
D. D. *Tubarum extrema.*  
e. e. *Tubarum ostiola.*  
f. f. f. f. *Earum expansio membranacea.*  
g. g. g. g. *Ligamenta uteri lata, alæ ve-*  
*spertilionum vulgò dicta.*  
h. h. h. h. *Lymphatica uteri dextri ac si-*  
*nistri lateris, & quidem par-*  
*tis posticæ. Qualia etiam, sed*  
*minora in antica uteri parte*  
*occurrunt, hîc non delineata.*  
i. i. i. i. *Lymphatica cervicis sæpius in*  
*suo itinere insulas formantia.*  
K. *Uteri cervix.*  
L. *Vaginæ pars.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. XXXIV.

Renem humanum , cum vasis  
adducentibus , & abducentibus , nec  
non calculo , in pelvi hærente  
monstrans.

- A. *Ren dextri lateris.*
- B. *Arteria emulgens dicta , sive , vas adducens primum.*
- C. *Nervus renalis , in ramos divisus , sive vas adducens alterum.*
- D. *Vena emulgens dicta , sive , vas abducens primum.*
- E.E. *Vasa lymphatica renis , sive , vas abducens secundum.*
- F. *Ureter , sive , vas abducens tertium.*
- G. *Pelvis dilatatus.*
- H. *Ureteris coarctatio prima.*
- I. *Calculus circa illam ureteris coarctationem hærens.*
- K. *Vasa sanguinea ureterem perreptantia.*



Fig. XXXIV. f. 76.





Fig. XXVIII. f. 85.



E.

E.

Fig. XII. f. 143.




Fig. XXXV. f. 76.




Fig. XXXIX. f. 133.




Fig. XXXVI. f. 79.




Fig. XL. f. 135.






Fig. XXXVII. f. 83.







# Figurarum Explicatio.

Fig. xxxv.

Ureteris partem aliam, calculis minoribus obfessam, exhibens.

- A. *Ureteris portio, sinistri lateris.*
- B. *Ultima ureteris angustatio.*
- C. *Vesicæ particula.*
- D. *Ureteris terminus, obliquo ductu, intra duplicaturam vesicæ conspicuus.*
- E. *Variae magnitudinis calculi, circa angustiam ultimam hærentes.*

Fig. xxxvi.

Bacillum offert, lapideâ incrustatione obductum.

- A. *Bacillus.*
- B. *Ejus basis.*
- C. *Mucro.*
- D. D. *Calculi exigui, bacillum undique tegentes.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. xxxvii.

Lapidem Bezoarticum proponit, in varias partes divisum.

- A. *Lapidis pars rotunda & illæsa.*
- B. *Particula ab eadem separata, sed, mediante bacillo, parti A. adhuc annexa.*
- C. C. *Bacillus, cui massa lapidea undique adhæret.*
- D. *Alia lapidis ejusdem particula separata, ut incrustationes, varios, hoc loco, circulos repræsentantes, appareant.*

Fig. xxxviii.

Lymphaticum ovarii monstrum & vesiculare delineans.

- A. *Uterus.*
- B. *Uteri osculum.*
- C. C. *Tubæ Fallopiæ.*
- D. D. *Ovaria.*
- E. E. *Lymphaticum monstrosus saciforme.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. xxxix.

Peritonæi diverticulum novum  
ostendens ex cane foemina.

- A. A. *Peritonæi pars resecta.*
- B. B. *Diverticulum novum naturalis  
magnitudinis.*
- C. *Ligamenti rotundi portio.*
- D. *Ejusdem ligamenti terminus.*

Fig. xl.

Diverticulum novum oculis  
subjiciens , ex subjecto  
humano.

- A. A. *Peritonæi particula.*
- B. *Ligamenti uteri rotundi pars.*
- c. c. c. c. *Vasa sanguinea ligamentum &  
diverticulum perreptantia.*
- D. D. *Diverticulum.*
- E. *Ligamenti rotundi extremitas.*

# Figurarum Explicatio.

Fig. xli.

## Cordis vasa Lymphatica proponens.

- A. *Cordis latus dextrum.*
- B. *Latus sinistrum.*
- C. *Auricula dextra.*
- D. *Auricula sinistra.*
- E. *Vena cava.*
- F. *Arteria magna*
- g. g. g. g. *Origines vasorum lymphaticorum dextri lateris.*
- H. *Truncus horum vasculorum.*
- i. i. i. i. *Ortus vasculorum lymphaticorum sinistri lateris.*
- K. *Ejusdem lateris lymphaticorum truncus.*

INDEX



# INDEX

## RERUM

### MEMORABILIU M.

<b>G</b> landulae quid sint?	Pag. 1
Earum differentia.	2
Structura Glandularum Veteribus fuit inco- gnita.	2
Qui primi Glandulas examinare coeperint?	3
Glandularum totius corporis series.	4
Nova Glandularum divisio.	7
Glandulae Conglomeratae quid sint?	8
Experimenta Glandularum Conglobatarum structu- ram detegentia.	9
Mammarum mulierum constitutio.	10
Ductuum Galactiferorum Anatome.	12
Spirituum necessitas in lactis secretionem.	14
Lac secernitur à sanguine chylo gravido.	17
Ductus Thoracicus an cum mammis habeat commer- cium?	19
Sanguinis vitiosa constitutio male afficit mammas.	21
Papillarum Anatome.	22
Earum substantia interior.	23
Inde flaccescant & erigantur Papillae in Lactanti- bus?	25
	Papil-

# INDEX RERUM

<i>Papillarum mala unde?</i>	26
<i>Membranarum, Glandulas Conglobatas ambientium, inspectio anatomica.</i>	27
<i>Membranarum varietas unde?</i>	ibid.
<i>Glandularum structura interna, ut nova, detegitur.</i>	30
<i>Glandularum mesenterii examen novum.</i>	32
<i>Glandularum Conglobatarum examen in brutis institutum.</i>	33
<i>Ex diversis corporis partibus Glandula examinata.</i>	ib.
<i>Aliud Glandulas examinandi experimentum.</i>	35
<i>Qualis Fibrosa sit Glandularum structura?</i>	37
<i>Textura Fibrosæ diversæ constitutio.</i>	ibid.
<i>Glandularum Conglobatarum morbi.</i>	38
<i>Lymphaticorum examen.</i>	40
<i>Ductus Thoracicus ope microscopii examinatus.</i>	42
<i>An Bilii Muscus inter Lymphaticorum tunicas inveniat?</i>	43
<i>Quales sint Lymphaticorum Valvulae?</i>	ibid.
<i>Valvula quid agant?</i>	44
<i>Vasa Lymphatica an Glandularum sint excretoria?</i>	45
<i>Lymphae transitus per Glandulas cur necessarius?</i>	46
<i>An unquam Lymphatica originem ex Glandulis habeant?</i>	48
<i>Glandularum utilitas singularis.</i>	49
<i>Vas Lymphaticum notabile ad hepatis concava.</i>	ibid.
<i>Lymphaticorum Origo.</i>	50
<i>Anatomicorum sententiae de Origine Vasorum Lymphaticorum.</i>	51
	Expe-

# MEMORABILIU.

<i>Experimenta, quibus deteguntur Lymphaticorum origines.</i>	52
<i>Cur sanguinem non admittunt Lymphatica?</i>	53
<i>Lympha sanguinea unde?</i>	54
<i>Anatomicorum opiniones circa Glandulas Conglobatas an sint alicujus valoris?</i>	55
<i>Renum Lymphatica Nova.</i>	58
<i>Quis sit Lymphaticorum Ortus in Renibus?</i>	60
<i>Consensus inter vasa renalia singularis.</i>	61
<i>Ex gibbosa renum parte Lymphatica Nova.</i>	63
<i>Renum Hydatides unde?</i>	ibid.
<i>Ovula in ovariis quæ nutriantur.</i>	65
<i>Animal ex ovo generari experimento comprobatur.</i>	68
<i>Lymphaticorum ovarii Descriptio Nova.</i>	70
<i>Lymphaticorum Insula necessaria.</i>	ibid.
<i>Arteriæ Iliacæ &amp; Cavæ Lymphatica.</i>	71
<i>Unde Lymphatica Iliaca ortum ducunt?</i>	72
<i>Quæ mala Ovarii Lymphaticis sæpe superveniant?</i>	ib.
<i>An Uterus ipse Lymphatica obtineat.</i>	74
<i>Ureterum constitutio &amp; calculi in iisdem.</i>	76
<i>Quid calculum propellat?</i>	77
<i>Calculorum generatio in vesica.</i>	ibid.
<i>Experimento confirmatur calculorum generatio.</i>	78
<i>Historia rarior.</i>	80
<i>Altera Historia.</i>	82
<i>Lapidis Bezoartici generatio.</i>	83
<i>Lymphatici in ovario male affecti Historia.</i>	84
<i>Alia Historia.</i>	85
<i>Historia tertia.</i>	89

# INDEX RERUM

<i>Historia quarta.</i>	94
<i>Methodus Lymphatica Vasa Peritonai inveniendi.</i>	98
<i>Quomodo malè afficiantur Lymphatica Peritonai?</i>	100
<i>Historia notabilis Hydropis Peritonai à laceris lymphaticis.</i>	104
<i>Alia Historie.</i>	106
<i>An Paracentesis hîc locum habeat?</i>	109
<i>Confirmatur Exemplo.</i>	110
<i>Aliud Exemplum.</i>	113
<i>Paracentesis feliciter instituta.</i>	117
<i>Alia Historia Paracentesis successum confirmans.</i>	122
<i>Peritonai Hydatides aliquando Asciten mentiuntur.</i>	124
<i>Historie, Hydatides mesenteriproponentes, varia.</i>	ibid.
<i>Lymphatica Sacra quanam sint?</i>	129
<i>Lymphatica Mesocoli.</i>	130
<i>Diverticula Peritonai Nova.</i>	131
<i>Hernia inguinalis Fœminarum unde?</i>	132
<i>Authorum, de Herniis, incerta opinio.</i>	ibid.
<i>Diverticula in canibus fœmineis nova.</i>	133
<i>Eadem in humano Subiecto inventa.</i>	ibid.
<i>Diverticulorum vasa unde?</i>	134
<i>Eorum extensio nimia.</i>	135
<i>Diverticulum cum intestini ilei parte aliquando con-</i> <i>nascitur.</i>	136
<i>Observatio notanda.</i>	137
<i>Epistola Anatomica.</i>	139
<i>Vasa Lymphatica partium capitis externarum.</i>	141
<i>Cervicis.</i>	ibid.
<i>Vasa</i>	



# MEMORABILIMUM.

<i>Vasa Lymphatica Pulmonum.</i>	141
<i>Intercostalia.</i>	142
<i>Lumbalia.</i>	ibid.
<i>Diaphragmatica.</i>	ibid.
<i>Cordis.</i>	143
<i>Lienalia.</i>	ibid.
<i>Hepatica.</i>	144
<i>Vesica fellea.</i>	145
<i>Ventriculi.</i>	146
<i>Mesenterii.</i>	ibid.
<i>Testium.</i>	147
<i>Pedum.</i>	148
<i>Manuum.</i>	ibid.
<i>Cerebri.</i>	149
<i>Glandula pinealis.</i>	150
<i>Glandula Pinealis Epitaphium.</i>	152

F I N I S.



DISSERTATIO  
ANATOMICO-MEDICA  
DE  
MOTU BILIS  
CIRCULARI  
EJUSQUE MORBIS.

*Quam publicè olim habuit*

MAURITIUS van REVERHORST,  
MEDIC. CAND. Lugd. Batav.

*Nunc Professor Anatomicus  
Hagæ-Comitis.*

SAGACISSIMO

*Harum Thesium Patrono,*

D. MAURITIO

VAN

REVERHORST.

EPINICIUM.

**A**lberitani ne poscite scripta Magistri,  
Qui veram Bilis quæritis historiam.  
Hactenus obscuri pandit Mysteria succi  
Omnia Mauriti cura sagaxque labor.  
Qui Bilem certâ ratione ac lege moveri  
Jam negat, insulsum est & sine Bile caput.

Ponebat amico

D. LIEBERGEN.



# DISSERTATIO ANATOMICO-MEDICA,

DE

## MOTU BILIS CIR- CULARI.

§. I.



uum vita nostra Utili-  
tas Cir-  
culantis  
Sanguini-  
nis.  
ut plurimum de-  
pendeat, à sangui-  
nis humorumque  
Motu Circulari,

rite constituto; multum sane debe-  
mus Viris Clarissimis, qui sangui-  
nis Circuitum detexere primi, &  
quamvis olim fortes vixisse certum  
sit, qui sanguinis Motus mentio-  
nem fecere, verum obscure adeo  
eundem proposuere, ut nihil certi  
ex eorum scriptis colligi possit:  
Magnus itaque Harvæus Anatomi-  
corum Antesignanus, Circulantis  
sanguinis vexillum prætulit, qui  
labore improbo, & experimentis

variis , motum humorum clare adeo & distincte proposuit , ut hoc tempore rarius occurrant , qui non ambabus , ut dicunt , manibus , hanc opinionem amplectentur , vitæque nostræ summe utilem censeant.

Quænam  
Circulationes  
ab eo  
proveniunt.

§. 2. Et quid mirum ? ex hoc enim fonte , omnes fere Mutationes , Motus , Secretiones , Actiones Sensationesque proveniunt , ex eodem , aliorum humorum Motus Circulares principium ducunt , quales sunt ; *primò* Salivæ : *secundò* Liquoris Gastrici : *tertiò* Succii Pancreatici : *quartò* Bilis : *quintò* Lymphæ : *sextò* Spirituum : & *septimò* addi posset Seminis Motus Circularis.

Nos  
Motum  
Bilis  
Circularem  
solummodo  
proponemus.

§. 3. Longius foret , horum omnium Circuitus proponere , veritatesque probare ; & licet hætenus plerisque , etiam subtilioribus Anatomicis , hoc fere fuerit neglectum , attamen pro humorum dictorum Circuitu probabiles adeo militant opiniones , ut de illorum Motibus vix dubitare possimus ;  
suffe-

suffecerit unum ex hisce, pro *Lemmate Inaugurali*, mihi eligere, & præprimis, propter singularem ejus utilitatem, quam Oeconomix Animalis præstat, *Bilis* scilicet *Motum Circularem*. Verùm ne ἀπεξόδας hic procedamus, perquam necessarium duximus, *Hepatis* pariter, atque *Bilis* Anatomen proponere, quibus rite perspectis, novisque experimentis confirmatis, verior inde resultet *Bilis Motus & in circulum actus*, quibus absolutis, ad varios Morbos Biliosos, eorumque Causas facilius erit transitus; tandem facta Prognosi, ipsa Curatio, certiori fundamento fundata, inde erit deducenda. Varia interim, ad nauseam usque, aliis, jam dudum proposita, studio præterire volumus, ne cramben, non tantum bis, sed decies, imo pluries recoctam, Lectori Benevolo, apponere videamur.

§. 4. Hæc autem, ut ordine fiant, Quid de Hepate dicetur,  
 primo *Hepatis* notabimus *Situm*;  
 a 3                      dein-

deinde *Figuram* ; mox *Superficiem*,  
*Colorem* , *Connexionem cum aliis*  
*partibus* , *Membranam investien-*  
*tem* , *Vasa ejus* , tam *Inferentia*,  
 quam *Efferentia* , nec non *Ductus*  
*peculiares excretorios* ; porrò *Sub-*  
*stantiam* ; tandem *Vesicæ Felleæ A-*  
*natome quoque erit proponenda* ;  
 nec non *modus secretionis Bilis*,  
 æque ac *Lymphæ* , postremo horum  
 omnium *Usus*.

Hepatis  
 situs.

§. 5. *Situm est Hepar* , sive *Jecur*  
 in hypochondrio dextro , ex adver-  
 so lienis , sub diaphragmate , inter  
 costas , & ventriculum , nunc ela-  
 tiore , nunc depressiore sede , ver-  
 tebris partim dorsalibus , partim  
 lumbaribus & costis spuriiis inni-  
 tens ; ita ut externè , tactu ( præci-  
 puè in statu morbofo ) facile de-  
 prehendi queat ; quo in casu non  
 rarò observatum , dextri lateris Re-  
 nem , situm obtinuisse , sinistro magis  
 declivem , idque ab Hepatis mole  
 solito majore , Renemque hunc  
 magis minusve premente ; verùm  
 illud,



illud perpetuæ veritatis non esse, multiplici experienciâ didicimus.

§. 6. Raræ admodum, & infrequentes sunt Anatomicorum observationes, de hujus *situ mutato*; ita ut Lien in dextro, Hepar verò in sinistro locetur hypochondrio: Nos sæpius vidimus partem ventriculi dextram non tantum, sed totam ejus superficiem, tegi ab hujus parte concavâ; sed, quod magis mirum, illam eandem Hepatis partem, in sinistro hypochondrio firmiter lienî adhæsisse, uti nuper, non sine admiratione, in quodam subjecto, videre licuit.

§. 7. *Hepatis Figuram* si consideremus, eam duplicem cum Anatomicis notabimus; alteram *Convexam*, *Concavam* alteram: *Convexa* ea est, quæ costas spurias, & diaphragmatis partem concavam; *Concava* verò, quæ ventriculum respicit.

§. 8. *Superficiem* quod attinet, *Ejus superficies.* illa lævis est, glabra, & æqualis

( loquimur de *convexâ* ) in statu verò morboſo , ubi acini Hepatici ſunt obſtructi , eſt inæqualis , aſpera , & innumeris capitulis tuberoſa , non tantum in parte hac convexa , ſed etiam concavâ ; uti aliquoties in corporibus Cachecticis & Hydropicis ( potiffimum in Aſcite ) obſervavimus ; *interna* vero *ſuperfici*es , quæ , præterquam quod ſit concava , inæqualitate notabili , & prominente parte , foveâ ſingulari conſpicitur ; protuberantiam componit , qui dicitur Hepatis Lobus minimus , foveam verò , ubi Cystis Fellea , Hepati jungitur.

Hepatis  
Color.

§. 9. *Color* alicujus partis , cum plerumque talis ſit , quales humores in ipſa exiſtentes ; non mirum , *Hepatis Colorem* eſſe ex pallido rubicundum ; pallorem uti à Bile , ita ruborem facilè ab ipſo ſanguine deducimus. In Fœtu verò eſt obſcurioris coloris , ob particulas aëreas ſanguini Fœtus minori copiâ permixtas.

§. 10.

§. 10. Connexio hujus visceris, <sup>Conne-</sup>  
cum partibus vicinis, præprimis <sup>xio cum</sup>  
notanda; & primò quidem Hepar <sup>vicinis</sup>  
suspensum tenetur, à ligamento <sup>partibus,</sup>  
fatis valido, lato, & membranoso,  
à peritonæo orto, cujus ope cohæ-  
ret cum parte diaphragmatis mus-  
culosa, & cartilagine mucronatâ;  
& hocce Ligamentum, ab officio,  
quo fungitur, Anatomici vocarunt,  
*Ligamentum Hepatis suspensorium*  
*Latum*; quia latè sese expandit;  
& ut tanti visceris moles melius  
suo maneret loco, hocce Ligamen-  
tum descendit, versus Hepatis par-  
tem inferiorem, ibidemque porta-  
rum venam (quo loco umbilicalis  
vena ipsi adjacet) involvit, & va-  
ginulâ quasi includit; sed ne quis  
credat, hunc Hepatis cum diaphra-  
gmate nexum, respirationi obesse,  
ipsam potius juvare putamus, qua-  
tenus diaphragma ab Hepatis mole  
deorsum trahatur, adeoque inspi-  
rationem haud parum promoveat,  
& hic ejus *nexus* est à parte supe-  
a 5 riore,

riore , ab inferiore autem parte *an-*  
*nectitur* Hepar umbilico , mediante  
 Venâ Umbilicali (de qua infra fu-  
 sius ) quæ in jam natis Ligamentum  
 evadit , Hepatisque ascensum su-  
 periora versus impedit , ne liber  
 diaphragmatis motus impediatur:  
 Præterea Hepatis vasa etiamsi  
 ipsum ( non ut reliqua Ligamenta )  
 suspensum teneant ; multum tamen  
 ad ejus , cum adjacentibus partibus ,  
 Connexionem conferunt. Hæc au-  
 tem Ligamenta , adeo rigida , &  
 firma non sunt ; quin Hepar , pro  
 vario corporis motu , modò dex-  
 trorsum , modo sinistrorsum , modò  
 sursum , modò deorsum , libere satis  
 moveri queat.

§. 11. Hepar *tenui & pellucidâ*  
 investitur *membranâ* , oriunda , par-  
 tim à vasis ipsum perreptantibus ,  
 suisque extremitatibus , usque in  
 superficiem pergentibus , ibidemque  
 cum fibris membranosis , à perito-  
 næo oriundis , hanc membranam  
 componentibus.

§. 12.

Mem-  
 brana  
 inve-  
 stiens.



§. 12. Tandem Hepatis *vasa* exam-  
 inanda veniunt , quorum numerus  
 tantus est , quantus in nullâ totius  
 machinæ parte occurrat ; quæque  
 proinde dividimus in *Adducentia* ,  
 & *Abducentia* : adducunt Arteria,  
 Nervi , & Vena porta ; quibus in  
 Foetu addenda vena , Umbilicalis  
 dicta : abducunt Cavæ ramificatio-  
 nes per Hepar dispersæ , Vasa Lm-  
 phatica , & Pori Bilarii.

*Vasa*  
 sunt vel  
 addu-  
 centia,  
 vel ab-  
 ducen-  
 tia.

§. 13. *Arteriam* obtinet Hepar  
 à coeliacâ , à qua cum variæ oriantur  
 ramificationes , ad partes circum-  
 jacentes tendentes , sic à dextro  
 ipsius latere , oritur ille ramus , quem  
 Anatomicorum Filii *Arteriam* He-  
 paticam appellare solent ; quæ cum  
 propius ad Hepar accedit , in duas  
 abit ramificationes , quarum altera  
 tendit ad Cystin Felleam , altera  
 Substantiam Hepatis ingreditur ,  
 ibidemque sociâ ubivis venâ Portâ ,  
 porisque bilariis , singulos aggredi-  
 tur glandularum acinos , quibus  
 suos tribuit ramulos Arteriosos.

Primum  
 vas ad-  
 ducens  
 est Ar-  
 teria.

§. 14.

Secun-  
dum  
sunt  
Nervi.

§. 14. *Nervos* accipit Hepar copiosos à Nervo Vago, seu Pari octavo, qui in innumeros abeunt furculos, ad singulas glandulas tendentes, per quos spiritus, partim pro Bilis, partim pro Lymphæ secretionem in illas partes feruntur; Sed an præcise, quemadmodum nonnulli Anatomici volunt, sint quatuor distincti furculi, duo à pari vago, seu octavo, tertius à Stomachico, quartus à costali, illud non facile determinare est; præcipue cum hi Nervi cæteris vasis, membranis, reliquisque aliis involucribus, adeo sint intricati, ut peritior illos nequeat offendere, sed manus Anatomica artificiosa illos facile in varios & distinctos nervos dividere possit.

Ter-  
tium  
Vena  
Porta.

§. 15. Inter adducentia Hepatis vasa, hoc loco examinanda occurrit, *Vena Porta*, à variis infimi ventris partibus oriunda; uti sunt Venterculus, Lien, Pancreas, Omentum, Intestina, præcipue Tenuia (propter  
usum

ufum fingularem, inferius proponendum) ex quibus omnibus partibus, tanquam totidem *Radicibus*, fanguinem fuum accipit; illâ vero in parte, in quâ omnes hæ Radices coëunt, conftituitur Truncus; & hucusque Vena vocari poteft; fed hoc loco *arteriæ officio fungitur*; Fungitur officio Arteriæ; propter rationes jam proponendas: nam uti primò arteriarum in modum conftat tunicis craffioribus; fic etiam fenfim fit anguftior, & ut aliquid ab ipfius fanguine feperatur, fic etiam fanguis ejus, ab alio vafe fcilicet Venâ cavâ, excipitur.

Sed, an etiam, Arteriarum in modum *pulset*, uti nonnulli Anatomici, etiam non infimi fubfellii, ftatuunt, nos unico hocce experimento freti, nequaquam agnofcimus; quod ligatâ arteriâ Hepaticâ, ille pulfus non obfervetur, uti sæpe experti fumus. Non pulfat tamen

*Hæc autem Vena*, in eo non convenit cum arteriis, quod fanguinem vehat obfcuriore colore tinctum. Porro,

Porro , quamprimum hæc Vena Hepatis substantiam ingreditur , in infinitas abit ramificationes , ad totidem Hepatis glandulosos acinos tendentes , ibidemque particulas suas biliosas ( ab intestinis , haud absimili modò , quemadmodum vasa lactea , suas particulas chymosas , ut infra de *Motu Bilis* , receptas ) deponunt,

Ulti-  
mum ad-  
ducens  
Vena  
Umbili-  
calis.

Quando  
utrum  
suum  
amittat.

Ejus  
sanguis

§. 16. *Adducentibus* tandem jun-  
gitur *Vena Umbilicalis* , originem  
suam ; non ex Hepate , ut Veteres  
voluere , sed ex Placentâ ducens U-  
terinâ , in qua , pro foetus nutritio-  
ne , liquorem accipit , sanguine mix-  
tum , per umbilicum in Hepar , &  
mediante canali venoso , in venam  
cavam deferendum ; Foetu verò jam  
in lucem edito , Vasisque Umbili-  
calibus , ligatura injecta ; ita ut per  
ea jam nihil deferatur , hæc Vena  
usum suum amittit ; & quemadmo-  
dum supra ostendimus , Ligamenti  
naturam induit.

§. 17. *Vena* hæc *Umbilicalis* hoc  
obti-



obtinet peculiare , quod sanguinem est rubicundioris Coloris, vehat , arterioso similem , hoc est , colore donatum , intensè rubicundo ; quod nuspiam ( præterquam in Vena pulmonali ) in reliquo Venoso genere conspicitur ; & aliunde deducendum non erit , quam à particulis aëreis , sanguini huic copiosius admixtis.

§. 18. Hucusque vasis propositis Primum vas abducens est Vena. Adducentibus , *Abducentia* jam examinanda restant ; quorum primæ erunt *Venæ* , harum majores potissimum ramificationes , in Hepatis parte concava conspiciuntur , originem ducentes ex acinis Hepatis glandulosi , reliquisque partibus , in quibus sanguinem , à secretionem residuum suscipiunt , & in Venam Cavam ascendentem deferunt.

§. 19. Hisce Abducentibus vasis , Huic succedunt Lymphatica succedunt alia ; scilicet *Lymphatica* nuper detecta , quæque ob singularem , quam præstant Oeconomiae Animalis , utilitatem , hoc loco sunt describenda ; Illa autem duplicia occurrunt ,

Suntque  
vel In-  
terna vel  
Externa. currunt; alia enim sunt *interna*, alia  
vero *externa*: *Interna*, jam à nonnul-  
lis Anatomicis, sed malè descripta,  
prodeunt ex modò propositis aci-  
nis glandulosis, & principiis adeo  
subtilibus, ut visum plerumque fu-  
giant; sed magis in sensus incur-  
runt, ubi eadem Hepatis tunicam  
perreptantia, & innumeris inter se  
anastomosibus juncta, descendunt  
ductibus manifestioribus, ubivis  
(propter valvulas intus conspi-  
cuas) nodosis, in glandulam musco-  
sam unam aut alteram, Portæ ad-  
sitam, ut inde, vel immediatè, vel  
interpositâ simili glandulâ, Lym-  
pham suam in saccum chyliiferum  
deponant.

Glandularum autem jam propo-  
sitarum numerus occurrit incertus:  
nam quo majores, eò pauciores, &  
si minores fuerint, non duæ aut tres,  
sed quinque, sex, imò septem, &  
plures aliquando conspiciuntur.

*Lymphatica externa*, sive partem  
Hepatis simam occupantia, itidem  
pro-

Lym-  
phatica  
Externa,

prodeunt ex acinis glandulosis illius partis , & numerosa adeo conspiciuntur , ut , vel maxime Lynceus , ni oculus vitro sit armatus , omnia ritè examinare non possit.

Omnia autem hæcce vasa , antequam Hepar deferant , sex , septem , vel octo , aliquando plures componunt Ductus majores , utrimque per latera suspensorii lati adscendentes , suamque Lympham in cavam eructantes. Hepatis Vasorum Lymphaticorum , tam Internorum quam Externorum &c. delineationes vide *Tabul. 1. Figur. 1. & 2.*

§. 20. Vasa hæc Lymphatica tam Interna , quàm , Externa , longe aliam , & à reliquis Lymphaticis diversam vehunt Lympham , utpote particulis Biliosis magis volatilibus gravidam , ideoque merito Lympham Biliosam dicendam ; haud ab simili modò , quemadmodum in intestinis particulæ Bilis subtiliores in *venas* propelluntur *meseraicas* ; crassioribus interim una cum fæci-

b                      bus

bus extra corpus emissis (utî infra, quando de *Motu Bilis Circulari*, clarius patebit) contingit in Hepate, ubi particulæ Bilis crassiores in Poros Bilarios, subtiliores vero, & magis mobiles in Vasa Lymphatica propelluntur, uti, ex peculiari eorum colore, manifestum satis est.

Proba-  
batur  
esse fla-  
vam,

§. 21. Lympham hanc colore flavo esse donatam, frequenter etiam in Hydrope Ascite (à læsis Lymphaticis Hepaticis ortâ) laborantibus constat, quorum aqua, Paracenthesi extracta, talem refert colorem; particulasque in se includere Biliosas, sapor indicat; hæcque illa aqua est, quam Nostrates vocant, *het geele water*.

Ultima  
abdu-  
centia  
sunt  
pori Bi-  
larii.

§. 22. Tandem Abducentium vasorum agmen claudunt *Pori Bilarii*, tanquam totidem radices, constituentes truncum, seu vas excretorium, Hepati proprium, Ductum, nimirum Hepaticum, per quem Bilis, ab omnibus Poris Bilariis, in Hepatis glandulosis acinibus secre-



secreta , fertur in Ductum Cholidochum , seu Communem ( quia utrique Ductui , & Hepatico , & Cystico , communis est ) & ab hoc , in intestinum duodenum.

§. 23. Porro circa Poros hosce <sup>Pororum Curfus.</sup> Bilarios , notandum venit , illos ubivis , & Venis Portarum , & Arteriæ Hepaticæ , socios esse , idque non tantum in principio , ubi Capsulâ Glissonii includuntur ; sed & , ubi minores , imo minimæ , dictorum Pororum , occurrunt ramificationes.

Bilis autem , quæ per dictos Poros <sup>Differentia Bilis.</sup> defertur , quo ad colorem flava magis , & mobilis est ; quam illa , quæ ex Cysti prodit Felleâ , uti infra , quando de ejus structurâ , pluribus ostendetur.

§. 24. *Hepatis Substantiam* quod <sup>Substantia Hepatis.</sup> spectat , ea in cocto , quam crudo , melius vero in Porcino , quam Humano distinguitur ; variis constat Lobulis exiguis , qui iterum ex minoribus Glandulosis Acinibus , propriâ

priâ membranâ involutis, & illius fibris sibi invicem annexis, conflantur; hi autem acini glandulosi, sed melius Glandulæ Vasculosæ, sunt congeries minimorum vasculorum supra recensitorum.

*§. 25. Vesica Biliaria, seu Cystis Fellea*, hoc loco non omittenda; sed varia, & notatu dignissima, illam spectantia, proponenda erant. Hujus *situs* est in concavâ Hepatis parte, cui adhæret parte mediâ, reliqua vero parte ab ejus corpore pendens, quâ non rarò tangit intestinum Colon, aliquando Ventriculi latus dextrum, aliquando aliam intestinalis tubi partem, quam frequenter *Flavo Colore tingit*, particulis Biliosis magis volatilibus per ipsius poros transudantibus, hisce in partibus hærentibus, & Colorem talem Flavum producentibus: Imo adeo volatiles Bilis aliquando includit particulas, ut præter partes dictas, etiam Peritonæum, Musculos Abdominis, ejusque integumenta

Anato-  
me Ve-  
sicæ Fel-  
leæ.

Situs.

Maculæ  
flavæ.

menta penetrent, & in externa Hypochondrii dextri regione Cutim notabili flavedine tingant; uti illud nuper in Amphitheatro vidimus.

§. 26. *Figura Vesiculæ Oblonga*, Figura,  
*Subrotunda*, & *Pyriformis* est;  
*membrana* vero illius, ex Tribus Textura  
 Tunicis conflata est, quarum pri- Mem-  
 ma, sive exterior ipsi cum Hepate branæ.  
 communis est; altera sive media  
 constat fibris ordine irregulari se-  
 met intercussantibus; tertia seu in-  
 tima est glandosa, mucagine, &  
 multis villis obsessa, impediens, ne  
 particulæ Bilis acriores tunicam fi-  
 brosam lædant, & vellicando Bilis  
 exclusionem citò nimis promo-  
 veant.

§. 27. Dividitur porro hæc Cy- Divisio  
 stis in *Fundum*, & *Cervicem*, quo- in Fun-  
 rum illa pars, quæ Rotunda, Py- dum &  
 riformis & Ampla est, vocatur Cervi-  
*Fundus*; *Cervix* vero in parte ela- cem.  
 tiore locata, Angustior est, & ma-  
 gis stricta, *valvulam* olim a Bau-  
 b 3 hino

hino notatam , aliquando simplicem , aliquando duplicem aut triplicem , figuræ plerumque semilunaris , & non rarò cochleæ in modum extensam habens , præpedientem , quo minus Bilis ex ductu Hepatico hanc vesiculam subintret ; præterea ne Bilis illa , semel ex hac elapsa , revertatur ; sed ulterius per ductum Cholidochum , seu Communem fluat in intestinum duodenum : Porro inservit hæc *valvula* , ut Bilis , jam in Vesicula Fellea collecta , non continuò , & per viam satis patulam egrediatur , sed eo potissimum tempore , quo ventriculus , chylicationis tempore , cibis gravidus , & distentus Vesiculam hanc premendo , Bilis , excretionem , chyli elaborationi adeo necessariam , magis promoveat : effluxum hujus Bilis nimis citum ex Cysti Felleæ præter valvulas , ipsum *Collum* impedit , quod *non rectiligneum* , quemadmodum passim , ast male ab Anatomicis describitur , sed

Valvula in  
Cervice.

Ejus  
Ufus

Collum  
non recti-  
lineum.



fed Curvum in omnibus fere subje-  
ctis occurrit; uti *Tabul. II. Figur. 4.*  
monstrabit.

§. 28. *Arteriam* habet , Anato-  
micis *Cysticam* dictam , ab arteriâ  
coeliacâ oriundam , variis ramifica-  
tionibus hanc Vesiculam egregiè  
exornantibus. *Nervos* obtinet cum  
*Hepate communes* , & ab eodem  
principio oriundos. Eadem *rami-*  
*ficationes* quam plurimas habet à  
*Venâ Portâ* , quæ unâ cum modo  
dictâ arteriâ , sanguinem suum tra-  
dit ramificationibus *Venæ Cavæ*.

Arteria  
Cystica.

Nervi  
Com-  
munes.

Venæ  
à Vena  
Porta.

§. 29. *Cystis* hæc suis etiam gau-  
det *Vasis Lymphaticis* , ex concavâ  
*Hepatis* parte oriundis , & *Vesicu-*  
*lam* hanc perreptantibus , ex qua  
in *Glandulam* quandam exiguam ,  
ad collum ejus locatam , ac proinde  
*Cysticam* dicendam , ingrediuntur ,  
& anastomosibus cum *Hepaticis*  
*Lymphaticis* juncta , eundem cur-  
sum postea servant ; vocantur au-  
tem hæc *Lymphatica Cystica* , non  
quod ab ipsâ originem ducant, sed

Lym-  
phatica  
Cystica.

huic tantum incumbant; uti sequenti patet experimento, presso scilicet Hepate, statim Lymphâ turgebunt, etiamsi horum vasorum nullum vestigium ante apparuerit; hocque experimentum, Lymphâ expressâ, aliquoties iterari potest. Glandulæ Cysticæ, Vasorumque Lymphaticorum Delineationem, vide *Figur. citat. 4.*

Peculiar-  
ia vasa  
Bilifera.

§. 30. Præter hæc vasa Arteriosa, Venosa, Nervosa & Lymphatica, *peculiariora* occurrunt vasa *Bilifera*, ex simâ Hepatis parte oriunda, quæ, bilem suam duplici, triplicive Ductu excretorio in hanc Vesiculam, membranam ejus, potissimum circa collum, perforantia, deponunt: major horum Ductuum, in interna Vesicæ parte, papillula quadam conspicuus est; simili fermè modò, quemadmodum ductus communis, in intestino apparet duodeno; quippe valvulæ officio funguntur hæ protuberantiæ, ne semel eructata Bilis eandem repetat viam, per

per quam erat egressa ; hæc autem vasa *Cystica Bilaria* distinctius occurrunt in brutis , potissimum in sub-  
jecto Bovino , quàm quidem Hu-  
mano.

§. 31. Nihil dicam *de Ductibus* Quid de Du-  
ctibus  
Cysto-  
Hepati-  
cis. *Cysto-hepaticis* , illis nimirum , qui Ductus componunt intermedios , inter Poros Bilarios , & Vasa hæc *Cystica Bilaria* , quandoquidem hæc vasa , non in quovis sub-  
jecto appareant , sæpius planè deficient , & in Humano Sub-  
jecto hætenus detecta non sint.

§. 32. *Dari* tamen aliquando , Expe-  
rimento  
proban-  
tur dari  
in Bru-  
tis. sed in *Brutis* , tales *Ductus Cysto-hepaticos* , sequenti constat expe-  
rimento , in Hepate Vitulino insti-  
tuendo. Primò ligatura injiciatur Ductui Cystico , dein Vesicæ Fun-  
do inciso , ut Ductuum horum ostia distinctius in conspectum prodeant , per tubulum Ductui Comuni alli-  
gatum ope syphonis , lac tepidum aut tinctura aliqua colorata injicia-  
tur , quo non tantum pori Bilarii  
b 5 lacte

lacte turgebunt ; sed portio aliqua per *Ductus hosce Cystohepaticos*, jucundo sane spectaculo , in Vesiculam Bilariam , jam ante vulnere læsam , stillabit ; uti oculari inspectione manifestum redditur.

Lymphæ  
Bilifque  
Secretio.

§. 33. *Lymphæ Bilifque Secretionem* in Hepate quod spectat, eam hoc modo fieri concipimus : sanguis per arteriam Hepaticam , & venam Portam Jecinori advectus , uti variis , & infinitis , sic etiam particulis Biliosis , & Lymphaticis gravidus , acinos Hepatis glandulosos subintrat , in quibus trium generum occurrunt pori , constituentes *primò* , Venarum in Cavam tendentium principia ; *secundò* Biliosorum Poros Bilarios , nec non ductus Biliferos Vesicæ Felleæ formantium ; *tertio* Lymphaticorum , Lympham transmittentium , pro varietate itaque horum pororum , & particularum diversitate dictos humores constituentium , necessarium Lympham Lymphatica , Bilem



lem Bilaria , sanguinem vero à secretione residuum ramificationes Venæ Cavæ subire ; cui negotio multum conferunt sanguinis motus tam intestinus , quam progressivus , partium circumjacentium , potissimum musculorum abdominis , continua pressio , & spirituosus sanguis arteriæ Hepaticæ ; nec non animales spiritus continuò ad has partes fluentes.

§. 34. Bilis secretionem breviter Duplex  
Bilis ,  
Cystica  
& He-  
patica. propositâ , ejus natura porrò investiganda restat : Estque *illa duplex* , *altera Hepatica* , *Cystica altera* ; *Hepatica* illa est , quæ continuò , & sine morâ affluit in duodenum intestinum , estque tenuior flava magis , & mobilis , nec adeo amaricat ; *Cystica* verò crassior est , obscurioris coloris , saporem præ se ferens magis amaricantem , & non nisi certis temporibus in intestinum affluens , scilicet quando folliculus modicè à Bile distentus , fibræ ejus motrices vellicatæ contrahantur ,

tur , & hoc modo materia intus contenta excludatur ; vel tempore chylicationis , quando ventriculo cibo potuve distento , Cystis hæc ab ejus mole premitur ; & per consequens contenta Bilis exprimitur.

Essentia  
Bilis.

§. 35. Quod *Bilis* spectat *essentiam* , analysi constat Chymica, ipsam in se includere Phlegma copiosum , Salis Volatilis multum , & particulas Oleosas cum Salibus Fixis , partibusque terrestrioribus unitas. Cùm itaque jam patet , ejusmodi particulas Oeconomix Animalis perquam utiles , Bilem in se includere Chyli Distributioni inservire , Motum Intestinorum augere , & Excrementorum promovere Exclusionem ; necessario hic concludendum venit , Succum hunc nullatenus excrementitium esse ; sed magnâ sui parte sanguini iterum admisceri , per motum quendam , quem vocamus *Motum Bilis Circularem* , qui autem hic fiat Circuitus , ex sequentibus manifestò constabit.

§. 36.

§. 36. Bilis in intestinum duode-  
 num delata, succo pancreatico mix-  
 ta, redditur fluidior atque tenuior,  
 quo intestina magis irritare, chylifi-  
 cationem promovere, & poros Va-  
 forum Venosorum subire possit, in  
 itinere suo per intestina in duas abit  
 partes, Terrestriores scilicet, at-  
 que Volatiliores; Terrestriores  
 fæcibus permixtæ, quibus colorem  
 flavum inducunt, unà cum iis ab  
 alvo deponuntur; Volatiliores vero  
 & magis mobiles poros subeunt Ve-  
 narum Meseraicarum, & cum san-  
 guine venoso associatæ pergunt in  
 Portam, ex hac in Hepar, in cujus  
 Glandulis particularum harum Bi-  
 liosarum fit sequestratio, eodem, quo  
 antea dictum fuit, modo; ex glan-  
 dulis verò in Poros Bilarios; ab his  
 per Ductum Cholidochum in Inte-  
 stina, in quibus de novo eodem,  
 ut ante, funguntur officio, & par-  
 ticulis Terrestrioribus relictis, ite-  
 rum Mesenterii Venas subintran-  
 t, ex quibus denuò in Hepar, ex He-  
 pate

Quo-  
 modo  
 fit Cir-  
 culatio  
 Bilis.

pate in Intestinum, & sic porrò moventur, atque in eo *Motum Bilis Circularem* consistere certò asserimus.

Proba-  
tur 1. ab  
Ampli-  
tudine  
Venarum  
Mese-  
raica-  
rum.

§. 37. Sed ne hypotheses novas, nullo fundamento innixas, hic proponere videamur; probandum erat, Bilem hunc in modum moveri. *Primum* itaque argumentum sumemus ab *amplitudine Venarum Meseraicarum*, quæ cæteris paribus hic duplò triplove conspiciuntur ampliores, quam in plerisque aliis corporis nostri partibus; quocirca merito concludere licet, hæc vasa, præter sanguinem arteriosum, ab intestinis refluum, alias insuper excipere particulas, quas Biliosas statuimus, ob rationes, in sequentibus proponendas. Si quis interea illum in se suscipere laborem velit, ut sanguinem ex Portæ Venâ, atque aliis vasis venosis extractum examinare cupit, Lymphamque hujus atque illius gustare, differentiam observaturus est, quæ hanc nostram opi-



opinionem confirmabit.

§. 38. *Alterum*, quod nostram sententiam adstruit, est *peculiaris* <sup>2. A</sup> *harum venarum Cursus*, & à reli- <sup>Vena- rum cur- su pecu- liari.</sup> quo sanguine venoso diversus; utpote non in venam cavam, sed in Hepar (Arteriæ in modum, uti supra pluribus ostensum) tendens, ibidemque particulas suas Biliosas deponens.

§. 39. *Tertio*, *Bilis Quantitas*, <sup>3. A</sup> *quæ*, singulis diebus in Hepate se- <sup>Bilis Quan- titate.</sup> questrata, ad intestinum fluit, tanta est, ut hæc sola facile superet omne illud, quod ab alvo naturaliter excernitur; absit verò, ut credamus, nihil nisi Bilem ab alvo deponi; cum præter illam, & à Salivâ deglutitâ, Lymphâ Gastricâ & Succo Pancreatico, Chylo ipso, nec non Liquore in Glandulis, per totum intestinalem tubum dispersis, sequestrato, partes separentur crassiores, quæ unitæ, & inter se associatæ ipsa excrementa constituunt; *tanta* itaque *Bilis copia* in inte-

intestina delata, nec tamen ab alvo excreta, aliò deferri debuit; hanc autem ab osculis Venarum excipi putamus, uti porrò clarius demonstrabitur; interim probandum erat, Quantitatem Bilis, quæ quotidie in Hepate sequestratur, inque Duodenum defertur, adeo notabilem esse, uti patet sequenti experimento.

Expe-  
rimentum  
Quantitatem  
probens.

§. 40. Die septimo decimo Mensis Decembris Anni elapsi 1691, Canis majoris *intestino duodeno* (per inflictum abdomini vulnus) *inciso*, Ductui Cholidochi tubulum alligavimus, tali modo constitutum, quali sanguinis transfusio felicissimo cum successu instituitur, alteram hujus tubuli extremitatem excipiebat vitrum oblongum, ut eò distinctius Bilis stillicidium nobis observari posset; vix omnia disposita erant, quin jucundo plane spectaculo observatum, Bilem alias in duodenum deferendam, jam stillicidando in vitrum nostrum delabi; sed quâ quantitate? præter expectationem

nem primis duabus horis Uncia Dimidia , tertiâ horâ iterum Dragmae Duæ , quartâ , quintâ , & sextâ horâ ferè eâdem Quantitate , sed paulò minore ; quod sanè mirum non est : eo enim tempore Canis jam languidior & sanguinis motus tardior necessario superveniens , hanc Bilis secretionem reddidit magis lentam. Si itaque singulis horis Dragmae Duæ intestinum subeant , ergo singulis octo horis Unciæ Duæ , & diei naturalis , id est , viginti quatuor horarum spatio , Unciæ Sex , sive Libra Dimidia.

§. 41. In homine verò , in quo In Homine major Bilis quantitas secer- nitur. experimentum illud instituere religio vetat ; omni dubio procul , tum propter corporis molem majorem , intestinorum longitudinem , & amplitudinem ; tum propter Vasa Biliaria numerosissima , & Hepatis magnitudinem adeo notabilem , *Bilis major quantitas secer nitur* , atque separatur ; imò si conjecturæ ( sed admodum probabili ) hic locus dan-  
c                    dus,

dus, ad minimum singulis horis ( si  
 non uncia dimidia ) saltem Bilis  
 dragmæ tres per Ductum Cholido-  
 chum intestinum citatum subire de-  
 bent ; & per consequens in Homi-  
 ne singulis diebus Libra integra  
 ( quæ est Medica ) vel secundum  
 nostrum calculum , Unciæ novem  
 excerni deberent ; verum , cum ne  
 tot excrementorum Unciæ , ab al-  
 vo in multis excernantur , nemo,  
 ut credimus , affirmabit , tantam Bi-  
 lis Copiam ab alvo deponi , sed ma-  
 ximam ejus partem aliorum move-  
 ri ; quocirca , præter alias jam an-  
 te propositas rationes , vel hoc uni-  
 cum circa Bilis Quantitatem expe-  
 rimentum suadet , & commendat  
*Motum ejus Circularem* ; quô-  
 que modô autem illud contingat ,  
 quamque sibi eligat viam , jam su-  
 pra propositum.

4. Ab  
 Embryo-  
 nis  
 Meconio.

§. 42. *Quartum* hoc loco adjun-  
 gendum erat argumentum satis va-  
 lidum *ab Embryonis Meconio* desu-  
 mendum : nemo negabit , Bilem ma-  
 ximam



ximam Meconii constituere partem ; sed quis nobiscum etiam non videt , longè majorem Bilis quantitatem ex Fœtus Hepate in intestinum deferri , quam quidem illud *Meconium* , in eodem intestino obvium ? Concipiamus modo , singulis diebus tantum Unciam dimidiam , in Hepate secretam , intestinum versus amandari , necessario sequetur , singulis mensibus uncias quindecim , & novem mensium spatio libras undecim cum unciis tribus intestinum subingredi ; cum tamen *Meconii* dicti totus intestinorum tractus , vix libram unam , aut alteram continere possit , hinc necessario iterum recurrendum ad *Circularem Bilis Motum* in Fœtu , æque ac in adultis obvium ; illâ tamen cum differentiâ , quod particulæ Bilis crassiores , in jam natis quotidie ab alvo cum excrementis deponantur : in Fœtu verò eâdem terrestres & crassiusculæ *Meconium* constituent ; dum magis mobiles

volatilesque , & cum poris Venarum Meseraicarum egregie convenientes , eosdem subintrant , & per Venam Portam in Hepatis acinos glandulosos delatæ , ab iisdem denuo poris Bilariis excipiuntur , tandemque in Intestinum Duodenum deferuntur.

§. A  
Proportione  
Bilis ferretur à  
sanguine.

§. 43. *Quintò* , Cum inter sanguinem , & humorem ab ipso separandum , quædam sit proportio (habita ratione ad alias glandulas) quis poterit concipere , tantam Bilis quantitatem , ab arteriâ adeo exiguâ (quemadmodum est Hepatica) posse sequestrari? Sileo tantam Lymphæ copiam , itidem ab ipsa separandam , quocirca meritò in auxilium vocandus sanguis Venæ Portæ , quod iterum probandum erat.

§. A  
diversitate Pororum.

§. 44. *Sextò* , Concipiamus totum corpus nostrum *porosum* , & *pervium* , ductibus , tam foràs intrò , quam intrò foràs , patentibus : hocque manifesto constat in corporis nostri effluviis , per insensibilem

lem transpirationem continuò exeuntibus ; nec non ex externè adhibitis , Balneis , Fomentationibus , Cataplasmatibus , Epicarpiis , Vesicatoriis potentioribus Litibusque Mercurialibus , à quibus notabiles in sanguine producuntur mutationes , ut easdem hic recensere longum nimis foret ; quid mirum itaque ? per Poros Venarum Meseraicarum intro foras spectantium Bilem nostram moveri , tamquam per vias , & propter calorem partium vicinarum , & motum intestinorum peristalticum , patentiores ; quam qui in cute nostrâ occurrunt.

Si autem hosce poros , ut vias Flatus ab intestino transit in Venas. satis patentes , distinctius quis examinare desideret , Flatum ope tubuli in Venam Meseraicam immittat , perget idem in intestina , illaque distendet ; quod semper verum in subiecto Canino , in Humano plerumque ; uti jam aliquoties vidimus.

7. Pennata non habent Vasa Lactea.

§. 45. *Septimo*, Pleraque *Animalia Pennata*, dum carent vasis lacteis, hinc chylus defertur per Venas Mesenterii; cur non item Bilis per eandem moveretur viam? præsertim si verum sit illud experimentum ab Anatomicis nonnullis propositum, de intestino Anserino; nimirum quod flatu distentum, idem liberè transeat in Mesenterii Venas. Sed dubium quis movere posset, cur eadem Bilis non æque subeat poros vasorum Lacteorum, utpotè patentiores; cui respondeamus, hocce unicè dependere à Varietate pororum tubulorumque, has particulas admittentium, alias verò excludentium.

Morbi Bilis principales.

§. 46. Structura Hepatis, Bilisque secretionem, nec non ejus Motu Circulari, usuque adeo necessario, tali modo propositis, & in naturali statu consideratis; *Morbos principales* saltem, eorumque Causas, Prognosin, & Curationem proponemus, idque eâ, quâ possimus, brevità-



vitae, ne hæcce nostra Dissertatio, ultra assuetas Lemmatis inauguralis limites crescat; & primò quidem locò, notandus erit Bilis Defectus. Secundò nimia ejus Quantitas. Tertiò Qualitas vitiosa; & Quartò quatenus Motu peccat.

§. 47. *Deficit Bilis*, quando <sup>Defectus</sup> massæ sanguineæ non, aut non sufficientes particulæ insunt Biliosæ, aut Pororum Bilariorum, in glandulis Hepaticis occurrentium, talis adest constitutio, ut Bilis partes eos subingredi nesciant, sed ante ostia quasi hæreant; vel quando particulæ hæ Biliosæ, aliis viscidis involutæ, non conveniunt cum Poris Bilariis, benè alioquin constitutis.

§. 48. *Contrâ, quantitate nimia* <sup>Quantitas nimia.</sup> peccabit Bilis, quoties sanguini plurimæ particulæ oleosæ, sulphureæ, &c. insunt; quæque à poris glandularum, seu acinorum Hepaticorum copiosius, quam par est, ex-  
c 4                    ceptæ,

ceptæ , versus intestinum amandantur.

Qualitas  
vitiosa.

§. 49. Eadem Bilis , *qualitate vitiosa* occurrit , quoties sanguis notabili intemperie laborat : qualis enim sanguis est , tales humores sunt à sanguine separati : nam fluidus si fuerit sanguis , & aquosus , talem etiam Bilem suppeditabit ; si volatilis , viscosus , glutinosus , acris , falsus , aut aliô modô male mixtus ; Bilis necessario volatilior , viscidior , glutinosior , acrior , falsior , &c. sequestrabitur.

Motus  
depravatus à  
Bile.

§. 50. *Motu Bilis peccare potest* , quando Circulatio ejus non rite procedit , & Bilis acrior in intestinum delata Duodenum , non Inferiora , sed Superiora versus fertur , & in Ventriculo varia incommoda , Ructus nimirum Biliosos , Ardorem , Vomitus Biliosorum , creat : vel quando Inferiora versus propulsa , sed Motu Citatiore Venarum Meseraicarum poros præterlabitur , & postquam varias in intestinis

stinis excitavit Tragoedias , Colicam Diarrhoeam , Dysenteriam , Tenesmum , &c. excernitur : Si eadem Bilis vitiosa Sursum pariter , atque Deorsum moveretur , Intestina & Ventriculum simul afficit , Choleram Morbum inducit ; & pro varia morbosæ hujus Bilis constitutione varia supervenientia symptomata , hos illosve morbos intestinorum , aut ventriculi indicantia.

§. 51. *Motus etiam depravatur , à vitiosa intestinorum constitutione* , pororum scilicet , in intestinis occurrentium nimia Constrictione , Flacciditate , Rigiditate ; vel etiam venarum Meseraicarum Compressione , quæ frequenter quidem fit à glandulis Mesenterii obstructis , in tumorem elevatis , vel materia calculosa obsessis , & vasa dicta suâ mole comprimentibus ; vel denique , quando per venam portam in Hepar delata Bilis in acinis ejus glandosis non seque-

Idem ab aliis causis.

c 5

stra-

stratur; sed à furculis venæ cavæ, per Hepar dispersis, vasisque Lymphaticis excipitur; hinc majori copiâ sanguini permixta, variis Morbis ansam præbet; uti Febribus continuis, Ardentibus, Ictero, Ephe-  
lidibus, aliisque Morbis Biliosis: tandem motu peccat Bilis, cum materia crassa, tenax, vel calculosa firmiter Pororum Biliariorum lateribus adhærendo, vias adeo angustas reddat, ut Bilis, alioquin per easdem deferenda, alias sibi eligat, & Oeconomiam Animalem mirum in modum turbet.

Calcu-  
losa  
materia  
in Ducti-  
bus  
Choli-  
dochis.

§. 52. Qui autem *Obstructiones* (ut reliqua præteream) à *materiâ calculosa in Ductibus Cholidochis*, & Calculi ipsi in Ductu Cystico contingant, hic enarrare debuimus. Inspecto cadavere, Hepatis pars concava, variis locis, duritie notabili renitens, postmodum factâ separatione, non tumores scirrhomatosos, uti primò suspicabamur; sed Poros Biliarios mirum in modum  
am-



ampliatos, & hinc illinc crusta calculosa obfessos exhibuit; ut difficile his in partibus aliqua potuerit fieri Bilis sequestratio; Pororum horum ex Hepate separatorum delineationem exhibet *Tab. II. Fig. 1.*

§. 53. Unicus est, ni fallimur, *Glissonius*, qui in *Doctissimo Tractatu*, de *Hepatis Anatome*, cap. VII. *similia observavit*, & in paucis tantum à nostris discrepantia, inter alia notatu dignissima, hæc Clarissimus Vir habet: Tempore circiter Quadragesimæ, aut Paschatis, imò antea, in Jecinoribus Bovinis, sæpe mihi visi tubuli calculosi, tantæ longitudinis, ut (si modo integri eximi potuissent) plurimas Pori Bilarii ramificationes, continuatâ lapideâ serie, coralli instar retulerint: vasis autem tam firmiter agglutinantur, ut citra rupturam eorum, aut lapidis (sunt enim ambo friabiles admodum) separari inde ægre queant. Sunt hi lapides iis, qui in Vesica Fellea reperiuntur,

Similis  
Obser-  
vat. ex  
Glissonio.

tur, planè congeneres, & figura solummodo discrepant; hucusque Glissonius. Nostri tamen Observatio in eo differt, quod Pori Biliarii, non ubivis, & continuatis tractibus, calculosis concretionibus essent obsessi; sed tantum quibusdam locis dilatati, & calculosa substantia versicolori oppleti: nam hac in parte cinerei, in alia albicantis, in tertia iterum nigricantis erant coloris, ubivis tamen calculorum vesicæ in modum, duritie notabili donati.

Boves  
Lapi-  
deam  
mate-  
riam  
ab alvo  
depo-  
nunt.

§. 54. Notandum præterea hoc loco venit, qui *Boves fragmenta lapidea*, quantitate nonnunquam notabili *ab alvo deponant*, dum ab assumpto alio alimenti genere, gramine scil. (hieme enim ejusmodi morbi oriuntur) fales, calculorum horum concretionem maximam partem constituentes, quodammodo dissolvuntur, per Ductum Cholidochum in intestinum propelluntur, & postmodum unà cum excrementis deponuntur.

§. 55.

§. 55. Quî verò mali causa, in Calculi octo in Vesicâ Felleâ. ipsa Vesicâ Felleâ, ejusve Collo, hæere possit, sequentes Historiæ testantur. Mulier triginta circiter Annorum, cæteroquin sana, in Febrem incidens intermittentem, de alvo non rarò queritur adstrictâ, excrementis licet ut plurimum naturali colore tinctis; post varia, sed incassum adhibita, remedia, ingravescentibus Symptomatibus, diem suum obiit. Cadavere inspecto, invenimus *Cystim Felleam, tactu duriusculam, & octo diversæ, sed notabilis magnitudinis, calculis refertam*, quorum delineationem videre licet *Tab. 11. Fig. 2.* Rarum erat, Calculos hosce ossium Carpi in modum, propemodùm esse formatos, & latera cum vicinorum lateribus haud malè quadrare; gratissimum insupèr referebant colorem, Lapidi Besoardico haud absimilem; nisi quod paulo magis ad colorem accederent flavum.

§. 56. Haud absimilem casum Centum hoc

quadra-  
ginta  
Calculi.

hoc Anno 1692. in Viro honestissimo Octogenario observare licuit , ex cujus Vesicâ Bilariâ ( præter calculos in Renibus & Vesica repertos Urinariâ ) *centum & quadraginta*, diversæ magnitudinis , & figuræ extraximus , cum Lapide Bezoardico , quod ad lævitatem , & colorem egregiè convenientes. Calculorum horum formam , & magnitudinem vide *Tab. II. Fig. 3.* quæ licet non omnes , principales tamen ob oculos ponit. In utroque hoc patiente observatum , Bilis modicam quantitatem subintrasse intestinum , tam à parte Pororum Bilariorum , quam Vesicæ Felleæ , cujus Ductus , Cysticus dictus , ab his Calculis non fuit penitus obstructus , quod tamen facili fieri potuissent negotio , dum ex tanto Calculorum cumulo , unus , aut alter ex minoribus Vesicæ Collum , mox Ductum ingreditur , ibidemque hærendo , omnem Bilis ex Cysti Felleâ , egressum impedit ; uti sequens



quens casus confirmabit.

§. 57. Puella viginti quatuor An-  
 norum Cachectica , Mensium la-  
 borans obstructione , alvum habens  
 ordinariò adstrictam , fæces , ob  
 Bilis defectum , deponit colore fla-  
 vo vix tinctas , tandem extingui-  
 tur ; & ut reliqua omittam , Ve-  
 sicam Bilariam , in magnitudinem  
 monstrosam , imò ad crepaturam  
 usque extensam invenimus ; & quid  
 mirum ? Calculus orbicularis figu-  
 ræ , superficie donatus tuberosa ,  
 albicantis Coloris , quem æque ac  
 reliquos , inter rariora mea asservo ,  
 uti cuivis curioso ostendere possem ,  
*ita obturaverat Vesicæ Collum , cum*  
*annexo Ductu Cystico* , ut ne Bilis  
 quidem guttula , è Cysti in Ductum  
 expelli potuerit ; hinc necessariò  
 Vesicula à Bile , per Ductus Late-  
 rales continuò affluente , ita debuit  
 extendi , & alvum segniorem pro-  
 ducere ; Calculi hujus naturalem  
 magnitudinem , Vesicæ collo fir-  
 miter impacti , delineationem vide  
 Tab.

Calcu-  
 lus hæ-  
 rens in  
 Collo.

*Tab. II. Fig. 4.* Si autem forte fortuna Calculus paulo ulterius propellatur , Ductumque communem subingrediatur ; duplex inde producit malum : ita enim non tantum Bili Vesiculari , sed & Hepaticæ omnis præcluditur exitus ; qualia autem inde incommoda , ex antecedentibus satis colligi potest ;

*Proba horum Calculorum* , id est , an revera Calculi ex Vesica Fellea sint , nec ne , est , quod hi Calculi igni admoti , flammam non tantum concipiant , sed & in Aquam projecti minime fundum petant , sed eisdem supernatent propter Bilis particulas oleosas hos Lapillos componentes ; quare non facile adducor , ut credam quod Petra del Porco , ex Vesica Fellea Aprinâ , utpote in Aquam projecta minime eidem supernatat , sed fundum petit ; notandum porro venit , quod hi Calculi , quo sint è Corpore Juniore , eo quoque esse remissioris , id est , pallidioris Coloris , & in Media ætate

Proba  
Calcu-  
lorum.

Diversi-  
tas Co-  
loris.

te

ta esse Coloris flavi, in provectiore autem obscurioris Coloris, imo nigricantis, sed quod magis est tunc aliquando splendentes particulas instar salium sibi admixtas habere.

§. 58. Bilis igitur morbis, eorumque causis breviter ita propositis, ad *Prognostica* properamus; sed cum à diversis causis morbi hi dependeant, *variā etiam esse Prognoseos speciem necesse erit*: interim ne eam planè omittere videamur, sequentia sunt. Ubi Deficit Bilis, periculo non caret, quod motu intestinorum peristaltico eo diminuto, ipsum chylicationis opus absolvi nequeat, & ita (præterquam quod alvi adstrictæ causa existat) ipsam Atrophiam inducat. Contrarium obtinet, quod tamen æque periculosum, quum à Nimiâ Bilis Copiâ, intestinum solito magis stimulatur, & alvus lubrica reddita, citò nimis excrementa, alimentis & chylo permixta, excludit, & ita corpus enervat. Nec minori caret

Pro-  
gnosis  
variat.

.d peri-

periculo , cum Qualitate Vitiosa existit , aut ex variis morbis supra citatis , evidenter constat. Denique Motu ubi peccat , non nisi varia mala , imo ipsam mortem inferre valet : quemadmodum varia damna , à variis itidem morbis oriunda , digito illud quasi demonstrant. Vide *Hippoc. Aph. 22. 23. & 42. Sect. iv. &c.*

Sic  
etiam  
Cura.

§. 59. Supereſt *ad Curam* nos accingamus , quæ pro cauſarum varietate varia iterum eſſe debuit : ubi enim Deficit Bilis , ibi Reparanda ; Qualitate ſi Vitioſa exiſtit , Corrigenda ; Motu ſi peccat , Reſtituenda eadem Bilis erit ; ſimileque iudicium eſto de reliquis Bilis Morbis.

Quid  
in de-  
fectu.

§. 60. Primò itaque Bilis defectum reparandum eſſe cenſemus Aromaticis , & potiſſimum Amari- cantibus ; cui ſcopo præter alia inſervire poterit ſequens Vinum Medicatum.

℞. Rad. Calam. Aromat. Angel.  
Irid. Florent. an. ʒj.

Cortic.



*Cortic. Arant. ʒij.*

*Lig. Saffaf.*

*Gariop. an. ʒj.*

*Herb. Mentb. Majoran.*

*Card. bened. an. pug. j.*

*Summit. Absint.*

*Centaur. Minor. an. Mʒ.*

*Sem. Cardam. min. ʒiʒ.*

*Concisis & contusis affunde Vin. alb. Gallic.*

*q. s.*

*F. Vin. Medicat. de quo patiens ter quaterve de die haustum sumat.*

§. 61. Si verò Bilis *Quantitate* peccet, illa est Evacuanda; & *Quantitas nimia.* speciatim si à plethora, V. S. commendamus, vel etiam Cathartica Chologoga.

℞. *Elect. Cholag. Hydrag. an. ʒij.*

*Cremor. Tart. ʒj.*

*Syr. Cichor. c. r. ʒij.*

*Aq. ejusdem q. s.*

*F. Haustus.*

Vel etiam Infusio sequens è Rhabarb. ex usu esse potest. V. G.

℞. *Rhab. elect. ʒij.*

*Tamarind. ʒiij.*

*Sal. Prunell. ʒij.*

*F. Infusio per noctem ex*

*Aq. Cichor. q. s. Colat. ʒiij. adde*

*d 2*

*Syr.*

Syr. Cichor. c. r. ℥iij.

Aq. Cinam. ℥j.

F. Haustus.

Volati-  
litas Bi-  
lis.

§. 62. *Bilis Fluiditas*, *Volatilitasque* curabitur medicamentis, vel etiam alimentis Austeris, sed prudenter adhibitis; uti sunt Mespil. Immat. Mal. Cydon. nec non eorum Caro. Omphac. &c.

Visci-  
ditas  
ejus-  
dem.

§. 63. *Viscidam & glutinosam Bilem* corrigunt Medicamenta Incidentia, & Attenuantia; qualia possunt esse Decoct. Mixtur. Tinct. Pulv. &c. quæ pro vario Medici Scopo & Ægri desiderio facile præscribi possunt. V. G.

℞. Aq. Cortic. Arant.

Fenic. an. ℥iij.

Spirit. Carminat. Sylv. ℥℥.

Sal. Armon. gt. xvj.

Sal. Volat. Succin. ℥℥.

Olei Garyophill. gt. iv.

Syr. Card. bened. q. s.

F. Mixtura Cochl. sumend.

Bilis  
acrimo-  
nia.

§. 64. *Bilis acrimoniam* temperant Medicam. Emollient. Oleos. & Ping. uti Decoct. Emuls. Condit. Tinct.

DE MOTU BILIS CIRCUL. 53  
Tinct. V. G. Opii &c. *Salsior* di-  
luenda hoc aut simili Medicamento.

℞. *Aq. Portul. Plantag. an.* ℥iiss.

*Diascord. Fracast.* 3j.

*Sp. Nitr. dulc. gt.* xx.

*Laud. Opiat. gr.* j.

*Syr. Borag.* 3vj.

*F. M.*

§. 65. *Pororum tubulorumque* Obstru-  
ctio  
*glandularum Hepaticarum obstru-* Glan-  
dula-  
rum.  
*ctio*, si in causa sit, cur Bilis seque-  
stratio non recte procedat, tollenda  
eadem per Medicamenta in Bilis  
glutinositate proposita; nec omit-  
tenda etiam externa Hypochondrio  
dextro applicanda, uti

℞. *Gum. Ammon. acet. sol.* ℥j.

*Tragacant.* 3iiss.

*Empl. de Mucilag.* ℥β.

*Sal. Ammon.* 3iiss.

*Ol. Succin. q. s.*

*m. F. S. A. Empl.*

§. 66. *Bilarii Pori, Ductus He-* Obstru-  
ctio à  
Calcu-  
lis.  
*paticus Cysticusve, vel etiam Cho-*  
*lidochus mediante materiâ Calcu-*  
*losâ obstructi, difficillimè resti-*  
*tuuntur. An Vomitoria hoc in casu*  
*aliquid valeant, quibus vehementi*  

d 3
vis-

viscerum agitatione pertinaces sæpe tolluntur obstructiones, de iis nihil certi asserere audeo, sed anceps esse remedii genus libenter fatemur.

Ardor  
Ventriculi.

§. 67. *Ventriculi ardor* quoties oriatur à Bile, illa est corrigenda, vel per Medicamenta Cholagoga, supra proposita, evacuanda; & in facile vomentibus, per blandiora Vomitoria, vel etiam Medicam. Nitrosa, ut Sal Prunell. Spirit. Nit. &c. ad aliquot guttul. ex Mixtura conveniente, potu ordinario aliquoties de die, exhiberi possunt.

Cholera  
Morbus.

§. 68. In *Cholera Morbo* conveniunt vel Medicamenta cre sumenda, præcipue sub forma Boli, vel Pulveris; vel etiam Enemata aliquoties injecta Vel

℞. Corall. rubr. præp.

Ocul. Canc. an. ℥ij.

Boli Armen.

Terr. Sigill. an. ℥j.

Santal. rub.

Cinam. an. ℥ß.

Misc. F. pulv. N°. viij.

de quibus æger singulis bihoriis  
Dosis



Dofin fumat, vel fi mavult Bolum,  
addatur Conf. Ros. Rubr. Myv.  
Cidon. vel etiam Diafcord. Fracast.  
vel Confect. Hyacinth. &c. q. f.  
Clyft. verò poteft effe talis. V. G.

℞. Rad. Alth. ʒvj.

Herb. Malv.

Bifmalv. an. Mß.

Flor. Chamom.

Verbafc. an. p. ij.

Sem. Lini,

Fænugr. an. ʒij.

Concifa & Contufa Coq. ex Lacte dulci  
Colat. ʒviiij. adde

Vitell. Ovor. No. j.

Theriac. ʒij.

Ol. Lil. albor. ʒvj.

F. Clyft.

Vel etiam simpliciffimus, quique  
femper ad manus eft, fiat ex Lact.  
Dulc. Vitell. Ovor. Ol. Rosac vel  
Lin. Butyr. Infulf. q. f. hocque pro  
rei neceffitate aliquoties iterari po-  
teft.

§. 69. *Dolorem Colicum* fedabunt <sup>Dolor</sup> <sup>Colicus.</sup>  
Medicamenta vel ore affumenda, vel  
ano injicienda.

℞. *Flaved. Cort. Arant.* ʒj.

*Macis* gr. xv.

*Castor.* gr. iv.

*Laud. Opiat.* gr. ij.

*Ol. Anis.* gt. iij.

*M. Fiant pulv.* N<sup>o</sup>. ij.

vel etiam sequens haustus

℞. *Ol. Amygd. dulc.* ʒvi.

*Vin. Malvat.* ʒß.

*Laud. opiat.* gr. j.

*Syr. Papav. alb.* ʒij.

*M.*

Diar-  
rhœa  
Biliosa.

§. 70. *Diarrhœa Biliosa* curabitur Medicamentis & alimentis acrimoniam Bilis temperantibus, & humores vitiosos, in intestinis contentos, leniter purgantibus specificis, & lenem adstrictionem post se relinquentibus, quale est sequens, V. G.

℞. *Rhab. leniter tost.* ʒj.

*Nuc. mosc. tost.* gr. xv.

*Laud. opiat.* gr. j.

*Ol. Menth.* gr. ij.

*M. F. Pulv.* vel cum Conf.

vel *Syr.* convenienti Bolus; vel etiam pil. sequentes tali in casu maximè conducunt.

℞. *Extract. Rhab.* ʒß.

*Ol. Cinam.* gt j.

*M. F. Pil.* N<sup>o</sup>. vij.

Mate-

Materia peccante hoc Medicamento leniter educta, porro deveniendum ad magis adstringentia, V. G.

℞. Conf. Rosar. rub. ʒvj.

Diascord Fracast. ʒiij.

Terr. Sigillat. ʒij.

Bol. Armen. ʒj.

Corall. rubr. præp. ʒß.

Laud. Opiat. gr. ij.

Syr. Myrt. q. s.

F. Condit. de quo patiens aliquoties ad Nucis Moscat. magnitudinem sumat.

§. 71. *Dysenteriam* à Bile acriore & copiosiore, tollunt Medicamenta emollientia, detergentia, & consolidantia, Decocta vulneraria, Clysteres &c. vel etiam Conditum sequens, quod multis indicationibus simul satisfacit, & hujus illiusve ingredientis quantitas vel augeri, vel minui facile potest, prout hoc illudve intendimus. V. G.

℞. Conf. Ros. rub. ʒx.

Rad. Symph. condit. ʒvj.

Diascord. Fracast. ʒij.

Terr. Sigill. ʒij.

Sarcocoll. pulv. ʒß.

Ther. Venet. in Vitell. Ovor. solut. ʒij.

d 5

Bals.

*Bals. Peruv. 3ß.**Syr. Alth. Fernel. q. s.**M. F. condit.*

§. 72. In *Tenesmo*, præter interna, commendamus etiam externa, Linimenta scil. Suppositoria, Foment. ex oleos. pinguibus, terrestribus, acrimoniam temperantibus parata, uti Ung. Rosac. Popul. Ol. Amygd. Dulc. Papaveris &c. imò subinde ad Opiata confugiendum.

§. 73. *Pituitam* vero *crassam* & glutinosam intestinorum lateribus adhærentem, vasorumque poros opulentem, emendant & expellunt pilulæ seqq.

*℞. Chalyb. præp. ʒij.**Extract. Cathol.**Gum. Ammon. acet. solut. an. ʒj.**Tart. Vitriol. 3ß.**Ol. Cort. Arant. gt. vj.**M. F. pil. N°. LX.*

de quibus æger aliquando Dosis capiat.

§. 74. In *Febris* continuis ple-risque & Ardentibus, à Bile majori copia sanguini permixta, oriundis, magni usus est Decoct. Scorz. seq.

*℞ Rad.*

Tenes-mus.

Pituita Crassa.

Febris Conti-nua.



℞. Rad. Scorzon. ℥i℥.

Contra. j. ℥iij.

Herb. Meliss. Mj.

Flor. Calend. pug. ij.

Rasur. C. C. ℥vj.

Tamarind. ℥℥.

Coq. ex s. q. Aq. com. Colat. ℥xxiv. adde

Aq. Prophyl. ℥℥.

Syr. Limon. ℥x.

Papav. errat. ℥vj.

M. F. Apoz.

§. 75. *Icterus* autem si oriatur à *Icterus*.  
nimia sanguinis tenuitate, à Bile in-  
ducta, primò Medicamentis modo  
propositis sanguinis æstus tempe-  
randus, deinde Medicam. Aperient.  
& Perspirationem promoventibus  
particulæ Biliosæ in corporis ambi-  
tu hærentes sunt incidendæ, & at-  
tenuandæ, & per Diaphoret. elimi-  
nandæ. E. G.

℞. Aq. Card. bened. ℥iij℥.

Theriac. ℥iij.

Trochisc. de Viper. ℥j.

Lapid. Bezoard. gr. vij.

Syr. Card. bened. q. s.

F. Haust. aliquoties iterandus.

vel seq. Bolus sudoriferus.

℞. The-

℞. *Theriac.* ℥j.

*Sal. vol. C. C.* gr. xij.

*Croc. optim.* gr. vj.

*M. F. Bolus.*

Epheli-  
des.

§. 76. Ad *Ephelides* vero ex *Facie* delendas conducunt Medicam. Poros Cutaneos aperientia, & particulas Biliosas ibidem hærentes discutientia. Cui inservire potest propria Saliva sæpius de die illita, vel etiam Epithem. seq.

℞. *Aq. Flor. Sambuc.* ℥iij.

*Ol. Tart. per deliq.* ℥ß.

*Sp. Sal. Armon.* gt. xvj.

*M. & cum hoc liquore facies aliquoties abluatur.*

§. 77. Hic itaque, *Lector Benevole*, pedem figo, plura enim hoc tempore addere non licet. Si erratum alibi, hoc pro solito tuo candore æqui bonique consulas rogo, & hominem me esse cogites. Quod superest, Deum Optimum Maximum supplex oro, ut omnia hæc unice cedant in Nominis sui gloriam, & proximi salutem.

F I N I S.

Ta-



Fig. 1.





Fig. 2.







Tabulæ I. Figur. 1.

*Hepar convexum exhibet.*

- A. A. A. Sterni pars cum suis cartilaginibus.  
B. Mucronata cartilago.  
C. C. Hepar.  
D. Vesica Fellea.  
E. Vena Umbilicalis.  
F. Hepatis Ligamentum suspensorium.  
g. g. g. g. Lymphatica vasa dextri lateris, convexam Hepatis partem, & suspensorium perreptantia.  
h. h. Eadem Vasa resecta, ubi Diaphragma perforando ejus Lymphatica componunt.  
i. i. Lymphatica ex sinistra Hepatis parte prodeuntia, itidem suspensorium ejusdem lateris perreptantia.

Fig. 2.

*Hepar concavum monstrat.*

- A. A. Hepatis interna facies.  
B. Lobus Hepatis parvus.  
C. He-


## 62 FIGURARUM EXPLICATIO.

- C. Hepatis Fissura.
- D. Vena Umbilicalis.
- F. Arteria Hepatica.
- f. Arteria Cystica.
- G. Vena Porta.
- H. Nervi Hepatici.
- I. Vena Cava.
- K. Vesica Fellea.
- l. Ductus Cysticus.
- m. Ductus Hepaticus.
- n. Ductus Communis.
- o. Glandula Cystica.
- p. Glandula Major Portæ, aut Ductui Cystico, adsitā.
- q. Lymphatica Cystica.
- r. r. r. Lymphatica ex parte Hepatis concavā prodeuntia.


### Tabul. II. Fig. 1.

*Poros Biliaris Calculosos demonstrat.*

- A. A. A. Pori Biliarii.
- B. B. B. Expansiones Pororum.
- C. C. C. Pororum Membranæ incisæ & diductæ.
- D. D. D. Incrustationes Calculosæ.
- E. Du-









E. Ductus Communis.

F. Ductus Cysticus.

Figur. 2.

*Octo Calculos diversæ formæ, & magnitudinis ex Vesicâ Felleâ humanâ monstrat.*

Figur. 3.

*Calculorum ex Vesicâ Felleâ itidem extractorum acervum proponit; de quo consul §. 56.*

Figur. 4.

*Cystin Felleam & Calculum, ejus collum obturantem, repræsentat.*

A. A. Vesica Fellea.

B. Collum ejus.

C. Calculus Collum obturans.

d. Locus, ubi valvulæ occurrunt.

E. Vesicæ pars separata & pendula, ut Calculi situs dignosci posset.

F. Curvatura Ductus Cystici.

G. Ductus Hepaticus.

H. Du-

## 64 FIGURARUM EXPLICATIO.

H. Ductus Communis.

I. I. I. Lymphatica Cystica.

K. Glandula Cystica.

L.L. Lymphatica ex hac glandulâ tendentia in glandulam M. portæ adfitam; ex quâ in Chyli faccum se exonerant.

F I N I S.











